


28 v.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.3.4.6





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.3.4.6



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.3.4.6





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.3.4.6

Ato. 3/4



Ex Libris Joannis Nencini
1874






IN HOC VOLV MINE HAEC
CONTINENTVR.

AVRELII CORNELII CELSI MEDICINAE
LIBRI. VIII. QVAM EMENDATISSIMI,
GRAECIS ETIAM OMNIBVS
DICTIONIBVS RESTI-
TVTIS.

QVINTI SERENI LIBER DE MEDICINA
ET IPSE CASTIGATISS.

ACCEDIT INDEX IN CELSV M, ET SERE-
NV M SANE QVAM COPIOSVS.



¶ Venetorum decreto, ne quis aliquo in loco Venet. editionis
hos libros imprimat, impressos ne alibi
vendat, cautum est.

2067
1.21 Long

AMPLISSIMO, ET MERITISSIMO HERCV-
LI GONZAGAE .SS. ROMANAE SEDIS
CARDINALI IOANNES BAPTI-
STA EGNATIVS VENETVS.

Utmulta, et ampla sunt ea, quæ Principes viros, tuiq;
similes illustrare maxime solent: tum nihil maius aut
honestius, quàm cum bonarum artium studiosos homines
exornant: et bonas literas omni studio, atq; opera in lu-
cem prodire contendunt siue q; is semper literarum Genius fuit, ut
augustissimus merito iudicetur: siue q; si doctorum hominum discipli-
nam negligas: ueluti solem de cælo sustuleris, omnis hominum uita
in tenebris sit futura. Fecit hoc ipsum patrum nostrorum memoria
summa sua cum laude senior Alphonsus, qui cum propria uirtute re-
gnum Neapolitanum armis sibi quæsisset, ad pacis studia conuersus,
omnes eius ætatis viros, qui doctrinæ aliquod specimen præferret,
mirū in modum est complexus. Eandem propensionem literas fuen-
di secutus nō multo post Nicolaus Quintus Pont. Max. est. ut incredi-
bile dictu sit quātum breui licet eius Pōtificatu profecerint bonæ lite-
ræ: ut si uerū fateri uelis, huic uni plus debeamus Pōtifici, q̃ omnibus
alijs, qui aut multis ante illū floruerint annis: aut qui ad hūc diē uixe-
re in Barionæ sede Pontificibus. Cæterum obscurauit penē hanc cla-
rissimorum Principum beneficentiam Laurentius Medices perpetuus
Florentinæ Reip. dictator. qui uitam, paternamq; laudem æmula-
tus prouehendi ueteres disciplinas, et artes, magno studio, et im-
pensa primū bibliothecam copiosissimam comparandam iussit: quā
do sine mutis hisce magistris, qd̃ aiūt, aut parū, aut certe nihil profici-
mus: tum doctissimos viros quotquot tera Italia id tēpestatis alebat,
ad sese euocandos curauit. quos et premijs longe maximis inuitaret:
et ad ocium hoc literarium ita inflammaret, ut nihil omnino his
deesse pateretur. Et quoniam Principum, ac Regum exempla pluri-
mum in utraq; partem ualent: non defuit eadem tempestate Prin-
ceps bellicæ gloria clarissimus Fridericus Vrbīnās, qui Laurētij splē-
dore uicini, et amicissimi Principis cum exarsisset: eandem æmulatus
laudem, nō paruam librorum copiam, et præcipue qui ad sacrā rē
spectant, comparauit: et à sole, puluerēq; martio sæpe in spacia, atq;
ambulacra philosophorum diuerterit. Vt quicquid illi à bellicis arti-
bus erat ocij, id totum familiaribus doctorum hominum sermonibus
libenter impēderet. Sed enim nec Gonzagæ tui minus operæ semper
huic uni dedere rei, quàm bellicis rebus, quibus maxime florere. Nā

sub initia renaſcentium literarum, quæ ſexcentimum iacuerant
 annum in terra Italia, Victorinum Feltrẽſem ſibi adſciuerẽ. cuius
 doctrinam regiũ aduſcentes ueſtri iam tum à primis annis imbibe-
 rent. Tu uero ut uideo cum alijs artibus maiorum tuorum adæquas
 laudem: tum hac una literarũ, & doctorũ hominum exornãdi cura
 ſuperare contendis. qui ſummo ſtudio iam ab annis adoleſcentiæ do-
 ctiſſimum quenq; in familiam adſciuiſti tuam: magnisq; ſemper
 præmijs ornaſti. Nam ut omittam Furnium merito abs te ſemper ho-
 neſtatum: Romulum certe ſic complexus ab initio es, ut non prius
 deſiſteris, q̃ illum ſtudiorum tibi perpetuum aſciueris comitem. quæ
 laus eò maior eſt, q̃ & temporum hæc iniquitas etiam octoſiſſimos
 homines ab literis auocat: & Romulus cum honeſtiſſime Bononiæ pro-
 fiteretur, maluit tamen te ſequi: & tecum, ut cum optimo Principe,
 conqueſcere. non dubitans quin ingraueſcens eius ætas ſub te Prin-
 cipe uiro effloreſcere etiam poſſit. ſed quid ego dicam quanto ſtudio
 Franciſcum Aſulanum tibi addictiſſimum feceris? qui hæreditariam
 Aldi laudem ſecutus, nihil nõ egit ut bonæ literæ cum græcæ, tum la-
 tinæ in dies maiorem recipiant cultum. Et ille quidem cum noctes
 ac dies hanc curam animo coqueret: acceſſit mox authoritas, ampli-
 tudinq; tua: quæ currentem, quod aiunt, equum fortius ad curſum ex-
 citaret. Nam cum alia in tui unius gratiam ſuſcepit: tum Celfi Cor-
 nelij de medicina libros longe utiliſſimos, & elegantiſſimos inuulgân-
 dos recepit. quod eo libentius ſuſcepit, q̃ abs te imprimis codicẽ ſanẽ
 caſtigatũ ſtatim acceperit. id oneris ut ſcilicet Celfus q̃ emendatiſſimus
 publicum acceperet: non quod ego unus omnium doctiſſimus, ſed q̃
 Franciſco, & familiæ, & Aldi præſertim nomini maxime ſemper fa-
 ui: ſuſcepi non inuitus: idq; , uti ſpero, non atris auibus præſtiſſe me
 confido: ut docti etiam homines libenter hoſce Celfi libros legant: in-
 docti non aſpernentur. Quod opus tui unius auſpicijs in lucem cum
 prodeat, tuum patrociniũ merito expoſcit. huic addidimus. Q. Se-
 reni poëma non inutile: in quo uates ille non infeliçiſſimus et morbos
 aliquot, & morborum remedia complexus eſt. hoc ipſum cum legi-
 uix poſſet, legent hodie ni fallor, docti hoies & perlibenter, & iucun-
 de. Ego uero quicquid opellæ in Celſo emendando impendi, id ipſum
 tibi nuncupo: qui uirtutis tuæ ampliſicator, oẽm meam indiſtriã uni
 tibi ppetuo antea dicarã. Teſtatũ tamẽ apud te relinquens, q̃ ſi plus
 ocij datũ mihi eſſet, i magnis occupatĩbus proſitẽdi uerſanti, efficaſ-
 ſem ut Cornelius nõ dicã nitidior, certe amabilior oĩbus prodiret. quã
 do breues notulas uocabulorũ, ſenſum etiam obſcuriorũ, græcarum
 etiã dictionum interpretamẽta inſtituerã. Quin eẽ ex Galeno, Hip-

pocrateq; multa adtexere decreuerā: ut nostrates medici cum Hippo-
cratem intelligerent penē à Cornelio in linguam latinam uersum, li-
bentius multo illum legerent. Cornelij Celsi Fabius, quod sciam, ex
ueteribus tantum meminit, laudās hominis industriam, q̄ cum Lenato
rhetoricen multo q̄ ante illum alij accuratius explicarit. sed & idem
Sceptios imitatus, non parum multa summo cum nitore, & cultu scri-
psit. artē quoq; militarē, & disciplinas ferē græcas omnes ample-
xus, eas latine loqui docuit. & ex his medicinam omnium nostratum
princeps ita absoluit: ut æmulari potius multi, q̄ assequi parem laudē
possint. Bene, ac feliciter Vale.

busq; 50
 De faucium morbis, ac curationi-
 bus, et primum de angina, de-
 inde de difficultate spirandi,
 ultimo de tussi. 50
 De difficultate spirandi. 51
 De tussi. 51
 De stomachi morbis, & cura-
 tionibus. 52
 De laterum doloribus. 53
 De viscerum morbis: et primo de
 pulmone, deinde de iocinere, tum
 de liene, postremo de renibus. 54
 De iocineris morbo, & cura-
 tione. 55
 De lienis morbo, et curatione. 55
 De renum morbis, et curatio-
 nibus. 55
 De intestinorum morbis, &
 primo de cholera. 56
 De cœliaci uentriculi morbo. 56
 De tenuioris intestini morbo. 57
 De morbo intestini plenioris. 57
 De torminibus. i. dysenteria. 57
 De leuitate intestinorum. 58
 De lumbricis aluum occupan-
 tibus. 58
 De tenasmo intestinorū morbo. 58
 De uētris fluxu, et curatione. 59
 De uulue morbo, & curatio-
 nibus. 59
 De nimia profusione seminis
 ex naturalibus. 60
 De coxarum morbis, & cura-
 tionibus. 60
 De genuū doloribus, et cura. 60
 De articularum doloribus in
 manibus, pedibusq; 61

LIBER QVINTVS.

De simplicibus facultatibus qua-
 runq; rerum, ex quibus me-
 dicamēta fiunt: et primo de his,
 quæ sanguinē supprimunt. 62
 Quæ uulnus glutinant. 62
 Quæ cōcoquunt, et mouēt pus. 62
 Quæ aperiunt uulnera. 62
 Quæ purgant. 62
 Quæ rodunt. 62
 Quæ exedunt corpus. 63
 Quæ adurunt. 63
 Quæ crustas ulceribus inducūt.
 Quæ crustas ulceribus resoluūt.
 Quæ discutiant ea, quæ in ali-
 qua parte corporis coierunt. 63
 Quæ euocant, & educunt. 63
 Quæ exasperata leuent. 63
 Quæ carnem nutriunt, &
 ulcus implent. 63
 Quæ molliunt. 63
 Quæ autem purgant. 63
 De mixturis simplicium rerum,
 & de ratione ponderum, &
 quid malagma, & emplastrū,
 et pastillus inter se differāt. 63
 De malagmatis. 64
 Malagma ad materiam extra-
 hendam. 64
 Malagma ad iecur dolens. 64
 Malagma ad lienem. 64
 Malagma ad laterū dolores. 64
 Malagmata ad resoluenda quæ
 astricta sunt: et mollienda quæ
 dura sunt: et digerenda quæ
 coeunt. 65
 Aliud malagma ad eadem. 65
 Malagma moschi ad mollien-
 dum. 65

Malagma medi ad digerenda quæ coeunt. 65	malagma & strumam. 66
Malagma Panthemi ad ea- dem. 65	Malagma ad articulos. 67
Malagma ad strumas. 65	Malagma Aristonis aduersus po- dagras, et recentia phyma- ta, & omnis dolores. 67
Aliud malagma ad id ualens. 65	Theoni malagma ad pedum dolores. 67
Malagma ad strumam, & phymata. 65	Numenij malagma ad podagræ cæter. s; articulos indura- tos. 67
Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas. 65	Dexij malagma si quando callus in articulis increuit. 67
Malagma protarchi ad paroti- das, & faum, & mala ul- cera. 65	De emplastris. 67
Malagma aduersus panum, & phymata. 65	Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus uul- neribus iniicitur. 67
Malagma aduersus phyma- ta. 66	Coacon emplastrum nigrum ad idem ualens. 67
Malagma ad supprimendum omne quod abscedit. 66	Basilicon emplastrum nigrum ad idem. 67
Malagma ad sanguinem sup- primendū, & phymata. 66	Smaragdinum emplastrum ad idem. 67
Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda. 66	Emplastrum ruffum ad idē. 67
Malagma ad linorem faciei contuse. 66	Paracolleticum emplastrum ad idem. 67
Malagmata stomachica ad aperiendum. 66	Cephalicum emplastrum Phi- lotæ capiti conueniens. 68
Niconis malagma ad resolu- dum, aperiendumq; ac pur- gandum. 66	Emplastrum uiride ad idem ualens. 68
Malagma ad ossa, & nervos. 66	resapropianor emplastrum ad pus mouendum. 68
Malagma Euthylei ad articu- los, & ad omnem dolorē. 66	Enneapharmacum emplastrum ad pus mouendum, & ad purgandum ualens. 68
Malagma Sasogoræ ad dolo- res articulorum. 66	Attalum emplastrum ad uul- nera. 68
Chrysippi malagma ad idē ualens. 66	Iudæi emplastrum fracto ca- piti acomodatum. 68
Clesipontis malagma ad idem ualens, & ad parotidas, et phy- mata, & strumam. 66	Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum. 68
	Aliud

adulari;
in Corpore
lors

QVAE TOTO OPERE CONTINENTVR.

Proemium.	pagina.	I	De notis, quas aliquis in singu-	
Quemadmodū sanos agere			ly morborum generibus ha-	
conueniat.	5		bere possit.	15
Quæ stomacho imbecilli ser-			Quæ notæ in quoq; morbi gene-	
uanda sint.	6		re, uel spem, uel pericula o-	
Observationes quædā prout res			stendant.	17
nonne accidunt: Et prout corpo-			De morborum curationibus.	20
rum genera, Et sexus, Et æta-			De sanguinis detractiōe per	
tes, Et tempora anni sunt.	6		uenas.	20
De his, qui aliqua parte corporis			De sanguinis detractiōe per	
laborant: Et primum de his,			cucurbitulas.	21
quibus caput infirmum est.	9		De deiectione.	22
De his qui lippitudine, grauedi-			De uomitu.	22
ne, destillatione, tonsillisq; la-			De frictione.	22
borant.	9		De gestatione.	23
Ad solutam aluum remedia.	9		De abstinentia.	24
Remedia ad coli dolorem.	9		De sudore.	24
Quæ agenda sint stomacho			Qui cibi, potiones'ue, aut ualen-	
laborantibus.	10		tis, aut mediæ, aut imbecillæ	
Quid obseruandum sit dolore			materiæ sint.	25
neruorum laborantibus.	10		Quæ natura, ac proprietas cu-	
Observatio in pestilentia.	10		iusq; rei sit, qua uescimur.	26
			Quæ res boni sicut sint.	26
			Quæ res mali sicut sint.	26
			Quæ res lenes, quæ'ue acres	
			sint.	26
Quæ anni tempora, quæ tempe-			Quæ res crassiorem, quæ'ue te-	
statum genera, quæ partes æta-			miorem pituitam faciunt.	26
tis, qualia corpora uel tuta, uel			Quæ res stomacho idoneæ	
morbis opportuna sunt: Et qd			sunt.	26
ualetudinis genus in quoq; ti-			Quæ res alienæ stomacho	
meri possit.	11		sunt.	27
De notis aduersæ ualetudinis			Quæ inflant, aut inflationem	
future.	12		leuant.	27
Quæ bona in ægotantibus			Quæ res aut calefaciunt, aut	
signa sint.	13		refrigerant.	27
Mala signa ægotantium.	13		Quæ res intus facile uitiantur,	
De signis longæ ualetudinis.	14		uel minime corrumpuntur.	27
De indicij mortis.	14			

Quæ res aluum mouent.	17	Curatio tertianæ febris.	37
Quæ res aluum astringant.	17	Curatio quartanæ febris.	37
Quæ res urinam mouent.	18	Curatio duarũ quartanarũ.	37
Quæ res somnum mouet, aut sensus excitant.	18	Curatio cotidianæ febris, quæ ex quartana facta sit.	38
Quæ res corpus aut erodât, aut reprimant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent, aut emolliant.	18	De tribus insanix generibus: ex primo de eius curatione, quæ à græcis phrenitis dicitur.	38
		Cardiaci morbi curatio.	40

LIBER TERTIVS.

De morborum generibus.	29	dropico morbo.	41
Quomodo morbi cognoscantur.		De tabe, & eius speciebus, &	
& an incrementant, an consistant,		curationibus.	42
an minuantur: & qua ratione		De comitialis morbi curatio-	
ab initio qui languere incipit,		nibus.	44
curari debeat.	29	De regij morbi curatione.	44
De febrium generibus.	30	De elephantia curatione.	45
De curationum diuersis ge-		De attonitis, & eorum cura-	
neribus.	30	tionibus.	45
De febrium speciebus, & singu-		De resolutione nervorum: quæ apo-	
larum curationibus, & primo		plexia, uel paralysis dicitur.	45
quando ab eis febricitantibus			
dandus sit.	32		
Quando potiones febricitanti-			
bis dari expediat.	33		
Quando pestilentes febres cu-			
rari debeant.	34		
Curatio semitertianæ febris, quæ			
hemitritæos dicitur.	35		
Curatio lentarum febrium.	35		
Remedia in febribus ad capitis			
dolore, et præcordiorum infla-			
mationem, et ariditatem, &			
scabritiem linguae.	35		
Remedia contra frigus, quod			
febrem præcedit.	36		
Curatio horroris in febribus.	36		
Curatio cotidiane febris.	37		

LIBER QVARTVS.

De humani corporis interioribus sedibus. 47
De curationibus morborū, qui nascuntur à capite: Et primo de eius dolore: deinde de morbo, qui circa faciē nascitur: tum de linguae resolutione: postremo de destillatione, ac grauedine. 48
De morbo, qui circa faciē nascitur: quem græci cynicum spasmodum vocant. 48
De resolutione linguae. 49
De destillatione, ac grauedine. 49
De cerniis morbis, curationibus

De diuersis oculorū collirijs.	93	curationibus.	96
Philonis collirium.	93	Hermionis collirium.	96
Dionysij collirium.	93	De cataractibus oculorum, quæ ex	
Cleonis collirium.	93	ulceribus factæ sunt: & quomo	
Theodoti collirium, Archari-		do curari debeant: & de Aſcle	
ſtum apellatum.	93	pia, & Canopite, & Pyxino	
Cythion, uel tephriion colliriū.	93	collirijs.	96
Euelpidis collirium, trygodes		De alio genere inflammatio-	
nominatum.	93	nis oculorum,	96
Nilei collirium omnium opti-		Cæſarianum collirium.	97
mum.	94	Hieracis collirium.	97
De carbunculis oculorum, &		De Xerophthalmia.	97
eorum curatione.	94	Rhinion collirium.	97
De puſtulis oculorum, & cu-		Ad oculos ſcabros colliria.	97
ratione earum.	94	Ad caligationem oculorum, quæ	
πυλινθίου collirium ad pu-		propter lippitudinem oritur	
ſtulas oculorum.	95	remedia, & colliria.	97
De ulceribus oculorum, & eorū		διὰ κρόκου collirium.	97
curatione, & de διὰ βυλάνου		Ad caligationem oculorum, quæ	
collirio.	95	propter ſenectutem, aut aliā	
Curatio oculorum aliquo ca-		imbecillitatem fit.	98
ſu imminutorum.	95	De ſuffuſione oculorum.	98
De pediculis palpebrarū.	95	De reſolutione oculorum, quæ	
De oculorum grauioribus mor-		paralyſis dicitur.	98
bis, qui ex inflammationibus oriū		De mydriaſi oculorum.	98
tur: & ualidioribus medicamen-		De imbecillitate oculorum.	98
tis curantur, & de Andreae col-		Ad oculos qui extrinſecus offen-	
lirio, & de διὰ κρόκου.	95	duntur: cum ſanguine ſuffu-	
Memigmenon Euelpidis colli-		ſi ſunt.	98
rium.	95	De aurium morbis, & cura-	
De oculorum ulceribus ſupercre-		tionibus.	99
ſcentibus, ſordidis, cauis, ueteri-		Aduerſus aurium uermes.	100
bus, & de curationibus ſingu-		Ad compreſſa aurium fora-	
lorum.	96	mina.	100
σφαιρίον collirium.	96	Ad grauem auditum.	100
Phynon collirium Euelpidis.	96	Ad ſonitum aurium intra ſe	
Sphæriion collirium Euelpi-		ipſas.	100
dis.	96	Ad ea, quæ in aurem inciderunt	
Liquidum Euelpidis colliriū.	96	extrahenda.	100
De canis oculorum ulceribus, &		De narium morbis, & curatio-	

Handwritten note: Handwritten

Handwritten note: Handwritten

Aliud dicitur ad extra-
 hendū, & pus mouendum. 68
 Philocratis emplastrum ad ex-
 trahendum, & pus mouen-
 dum. 68
 iπρωτες emplastrum ad ex-
 trahendum. 68
 Emplastrum Hecatei ad ex-
 trahendum. 69
 Alexandrinum emplastrum
 uiride ad extrahendum. 69
 De emplastris exedentibus. 69
 Emplastrum quod exest corpus,
 & ossa resoluit: & super cre-
 scentem carnem coerct. 69
 Emplastra aduersus morsus, &
 alia recentiora uulnera. 69
 iμπιον emplastrum rubrum
 ad idem ualens. 69
 Aliud emplastrum ad idem
 ualens. 69
 αουκὰ emplastra non grauibz
 uulneribus accommodata, et
 maxime senilibz. 69
 Elephantinum emplastrū. 69
 Lenia emplastra. 69
 Emplastrum lene. 69
 Archagathi emplastrū lene. 69
 Emplastra eiusdē generis ad
 leniendum apta. 70
 De pastillis, & primo de hys, qui
 ad recentia uulnera glutinan-
 da, sanandaq; apti sunt. 70
 Alius pastillus ad glutinanda
 uulnera. 70
 De sphragide pastillo, quem Po-
 lybus confecit, ad glutinandū
 uulnus. 70
 Pastillus ad ulcera sordida, & ni-
 gritiem in auribus, naribus, ob-
 scenis partibus, inflammatio-
 nesq; eorum. 70
 Pastillus andronis ad uiam in-
 flammata, ad naturalia sordi-
 da etiā cancro laborantia. 70
 Pastillus ad fissā ani, uel ora ue-
 narum fundentia sanguinem,
 uel cancerum. 70
 Pastillus ad expellendum calcu-
 lum cum urina. 70
 De pessis. 70
 Ad sanguinem euocandum. 70
 Ad uulnam molliendam. 70
 Alia pessi compositio ad idem
 ualens. 71
 Ad inflammationes uulue
 Numenij, Pessus. 71
 Ad eijciendum ē uulua infan-
 tem mortuum. 71
 Simulier uitio locorū concidit,
 qua curatione utendū sit. 71
 De medicamentis quibus aridis u-
 timur, ad carnem supercre-
 scentem exedendam. 71
 Ad putrē carnem continendam
 ne ultra serpat: eamq; leniter
 exedendam plures compositi-
 ones. 71
 Hier e compositio. 71
 Iudei compositio. 71
 Iolæ compositio. 71
 Ad sanguinis proflumia, uel ex
 membrana cerebri, uel alijs lo-
 cis & ad cancerum, & ad indu-
 cendam cicatricem, & ad coer-
 cendam carnem crescentem. 71
 Timi compositio ad ignem sa-
 crum, uel cancerum. 71
 Ad sternutamenta excitanda. 71
 Gargariationes quibus fieri de-

beant.	72	quæ maxime per tela infe-	
De antidotis, & quibus malis		runtur.	74
opitulentur.	72	Quæ vulnèra isanabilia sint.	74
Compositio antidoti.	72	Quæ vulnèra difficilem ci-	
Aliud antidotum Ambrosiano		rationem habeant.	75
minatum, quod Popyrus Pto-		Quæ vulnèra tutiorem ci-	
lemæo regi composuit.	72	rationem habeant.	75
Antidotum Mithridatis.	72	Observationes quedam & æta-	
De acopis.	72	tis, & corporis, & uitæ, &	
Acopum & dō des nervis utile.	72	temporis in vulnèribus.	75
Et xpiæ ad ulcèra purganda,		Signa percussæ cordis.	75
& implenda.	73	Signa pulmonis icti.	75
Ad sacrum ignem.	73	Signa iocineris vulnèrati.	75
De catapotijs.	73	Signa percussorum renium.	75
Catapotiū ualentis ad somnū.	73	Signa vulnèrati lienis.	75
Catapotium ad plurimos dolores		Signa percussæ uulnæ.	75
per somnum leniendos.	73	Signa percussæ cerebri, uel mem-	
Catapotium aliud ad multa		branæ eius.	76
ualens.	73	Signa percussæ stomachi.	76
Catapotiū ad inducendū somnū:		Signa ieiuni intestini, & uentri-	
quod uulua dolens prohibuit.	73	culi vulnèrati, & aliorum	
Ad iecur sanandum.	73	intestinorum.	76
Ad finiendos dolores lateris.	73	Signa percussæ medullæ, quæ	
Ad thoracis dolores finiendos.	73	in spina est.	76
Catapotium Athenionis ad		Signa septi transversæ percussæ.	76
tussim.	74	Signa uesicæ vulnèrata.	76
Catapotium Heraclidis tarenti-		De sanguine, & sanie, & pure, et	
ni ad tussim, & somnū.	74	eorum speciebus quando ue me-	
Catapotium ad purganda ulcèra		liora, deteriora ue sint.	76
in faucibus tussientibus.	74	Curatio aduersus profusionem	
Collice cassij medica.	74	sanguinis in vulnèribus.	76
Ad infantem mortuum, aut se-		Curationes aduersus vulnèrum	
cundas expellendas.	74	inflammationem.	77
Laborantibus ex partu quid		De glutinatione vulnèrum.	77
dari debeat.	74	Quomodo vulnus ligari con-	
Ad adiuvandam uocem.	74	ueniat.	78
Aduersus difficultatē urinae.	74	De ratione uictus, & notis vul-	
Arteriaces cōpositio quō fiat.	74	nerū, curationibusq; eorū.	78
De quinq; generibus noxarū cor-		Curatiōes propriæ articulorū.	78
poris, & primo de vulnèribus,		Vulnus quomodo purgādū est.	79

nibus.	101	LIBER SEPTIMVS.
De dentium dolore, & cura- tionibus.	101	De chirurgis, & qui in ea cla- ruerint: & qualis esse chirurgi- cus debeat: & quid in hoc li- bro describatur.
De tonsillis, & earū cura.	102	108
De oris ulceribus, & curationi- bus, & quæ antheræ sint.	102	De luxatis.
De gingivarum ulceribus.	103	108
De unæ morbo, et curatione.	103	De his, quæ per se intumescunt quomodo excidenda, & curan- da sunt.
De cancro oris.	104	108
De parotibus, quæ sub auribus oriuntur.	104	De bonis, malis, & signis exulce- ratorum.
De umbilici prominentis cura- tione.	104	109
De obscenarum partium uicijs, et curationibus.	104	De fistulis.
De colis morbis, & curatio- nibus.	104	109
De canceri, qui in colle nasci- tur, curatione.	105	De ani fistulis.
De phagedænæ in cole nascenti- us curatione.	106	110
De carbunculo, qui in cole na- scitur.	106	De telis e corpore extrahendis
De testiculorū morbis, & eo- rum curatione.	106	110
De rhagadijs, & Condylomate, & hæmorrhoidibus, alijsq; ani morbis, & curationibus eorū, & primo de rhagadijs.	106	De ganglijs, & meliceride, & a- theromate, & steatomate capi- tis tuberculis.
De condylomate.	106	111
De hæmorrhoidibus.	107	De oculorum uicijs quæ scalpel- lo, & manu curantur.
Si anus, uel os uulue proddit, qua curatione utendū sit.	107	112
De ulcere fungo simili i ano.	107	De crithe tuberculo palpebra- rum.
De digitorum ulceribus.	107	112
		De chalazia palpebrarū.
		112
		De ungue oculorum, quod mæp- uor a græcis uocatur.
		112
		De enchanti tuberculo.
		113
		De ancyloblepharo oculorum uicio.
		113
		De agylopa fistula oculorū.
		113
		De pilis palpebrarum oculum irritantibus.
		113
		De lagophthalmo oculorum.
		114
		De ectropio.
		114
		De staphylomate oculi.
		114
		De clauis oculorum.
		115
		De natura oculorum, & eorum suffusione.
		115
		De pituita oculorum.
		116
		De aurium morbis, qui manu, et scalpello curantur.
		116

Curta in auribus, labrisq; ac na-	Et de calculo, curationibusq;	
ribus, quomodo sarari, & cura	eorum.	125
ri possint.	Que curatio calculosis adhi-	
De polypi curatione p ferru. 117	beatur.	126
De ozena. 117	Signa calculorum, uel harenoso-	
De ore uicijs, quæ manu, & fer-	rum, uel mollium.	127
ro curantur. 118	De calculis foeminarum. 127	
De dentibus. 118	Quæ curatio calculo emulso ha-	
De uua. 118	benda sit.	128
De lingua. 118	De cancro qui excisa uestigia nasci-	
De abscessu sub lingua. 119	tur, et qua cura uti deceat. 128	
De labris. 119	Si naturalia foeminarum concu-	
De cervicis uicijs, et curatiõe. 119	bitum non admittunt, quomo-	
De umbilici uicijs. 119	do curari conueniat. 129	
Quomodo aqua hydropicis	Qua curatione partus emortuus	
emittatur. 120	ex utero excutatur. 130	
De intestinorum uulneratorum	De ani uicijs, & eorum cura-	
curationibus. 120	tione. 130	
De interiore parte abdominis ru-	De condylomatum curatiõe. 131	
pta, & qua ratione curanda	De uaricum curatione. 131	
sit. 121	Curatio digitoru coherentiũ. 131	
De uariabus ueneris. 121	De angrenæ curatione. 132	
De testiculorum natura, & mor-		
bis eorum. 121	LIBER OCTAVVS.	
De testiculoru curatiõibus cõibus,	De positu, & figura totius huma-	
& primo de incisione, & cura	ni corporis. 132	
tione inguinis, uel scroti. 122	Ossa uiciata, & corrupta quibus	
De intestini curatione. 123	signis cognoscantur: & qua	
De omenti curatione. 124	ratione curentur. 134	
De ramcis curatione. 124	Quomodo os excidatur, et de mo-	
De carne, quæ iter tunicis testicu-	diolo, & terebra ferramentis	
lorum concreuit: & de neruo	ad id paratis. 135	
indurato. 125	De aluarie curatione. 136	
De ramice inguinis. 125	De narium fracturarum curatio-	
Ad tegendam glãdem colis si nu-	ne. 138	
da est. 125	De auriũ fracturũ curatiõe. 138	
Quomodo glans penis contacta	De maxillæ fracturæ curatione:	
aperiri possit. 125	deq; quibusdam ad omnia ossa	
Infibulandi ratio. 125	pertinentibus. 138	
De urinae reddendæ difficultate,		

De iuguli fracti curatione. 139

De costarum fractarum curatione. 139

De spine curatione. 140

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum, uel emulforum, communibus curationibus. 140

De fracti humeri curatione. 141

De brachij fracti curatione. 141

De crurum, femorumq; fractorum curatione. 142

De fracti digiti curatione. 142

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitorq; confractos pertinentia. 142

De luxatis ossibus. 143

De maxilla luxata curatione. 144

De capite luxato. 144

De spina luxata. 144

De humero luxato. 144

De cubiti luxati curatione. 145

De manu luxata. 145

De palma. 145

De digitis. 146

De femore. 146

De genu. 146

De talo. 146

De planta. 147

De digitis. 147

INDEX QUINTI SERENI.

Capiti medendo. 149

Hemocraneo medendo. 149

Porrigni depellendæ. 149

Capillo tingendo. 149

Phthiriasi arcendæ. 149

Prurigni, papulis, & scabiei arcendis. 150

Frenesi, ac capiti purgando. 150

Fluori capillorum, & maculis capitis tollendis. 150

Frigori sedando. 150

Elephantiasi propellendæ. 150

Cutis, & faciei uitij propellendis. 150

Aurium uitij succurrendis. 151

Oculorum dolori mitigando. 151

Dentium uitio, & oris foetori medendo. 152

Vulæ faucibus, & quæ mollienda sunt medendis. 152

De rigore ceruicis. 152

Tussi, & coleribus medendis. 152

Digestioni, & stomacho. 153

Felli uomitu, uel phthisi arcendis. 153

Mammis sanandis, uel stringendis. 153

Reiectioni cibi, aut sanguinis abstinendæ. 153

Iecoris, & lateris uitij medendis. 154

Spleni curando. 154

Præcordijs sanandis. 154

Lûbis, & renibus sanandis. 154

Ventris dolori mitigando. 155

Hydropisi depellendæ. 155

Ventri molliendo. 155

Doloris

mita

Solutioni uentris, & dysenteriae compescendae.	156	Comitiali morbo medendo.	162
Lumbricis, & tinea purgan- dis.	156	Regio morbo expellendo.	162
Colo sedando.	156	Dentibus, uel strigis inquietatis infantibus.	162
Vesicae, & calculo purgando: & urinae prouocandae.	156	Combusturis igne, uel frigore factis.	162
De conceptione, & partu.	157	Venenis prohibendis.	162
Proflusio cuiusq; sanguinis, & matrici.	157	Venenis datis.	162
Pilis quibuscunq; internecandis, quae oculos impediunt.	157	Vulneribus, & rei dubiae cu- randis.	163
Omnibus obscenis medendis.	157	Verrucis tollendis.	163
Scies, & articulari morbo.	158	Haemorrhoidis medendis.	163
Furunculo medendo.	158	Paralysi depellendae. primo die ita agendum.	163
Carboni medendo.	158	Secunda ita medendum est.	163
Pani, uomicae, & strumae depel- lendis.	158	Tertia die ita curandum est.	163
Igni sacro medendo.	159	Quid quarta die, & reliquis peragendum sit.	164
Podagrae depellendae.	159		
Vulneribus ferro, aut uerberi- bus factis.	159		
Vulneribus quibuscunq; casibus actis.	159		
Ab homine, uel simia morsus	159		
Serpentum morsibus, & uenenis pellendis.	159		
Istibus scorpj, & morsibus mu- ris caeci, uel aranei.	160		
Subitaneo dolori, feбри, atq; osth- opo.	160		
Ad Typum quartanae.	160		
Ad Typum tertianae.	161		
Ad Typum quotidianae.	161		
Hemitritaeo depellendo.	161		
Fracturis, & luxis sanandis.	161		
Neruis incisis, & dolentibus, atq; contractis.	161		
Aegris somno asciscendo.	161		
Letbargiae expellendae.	162		

I
AVRELII CORNELII CELSI ARTIVM
LIBER SEXTVS, IDEM MEDI-
CINAE LIBER PRIMVS.

T alimenta sanis corporibus agricultura, sic
sanitatem aegris medicina promittit. haec qui-
dem nusquam non est. siquidem etiam im-
peritissimae gentes herbas, aliaq; prompta in
auxilium vulnerym, morborumq; noverunt.
Veruntamen apud Graecos aliquanto magis,
quàm in ceteris nationibus exulta est. ac ne

apud hos quidem à prima origine, sed paucis ante nos seculis: ut po-
te cū uetustissimus author Aesculapius celebretur. qui quoniam adhuc
rudem, & uulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deo
rum numerum receptus est. huius deinde duo filij Podalirius, & Ma-
chaon bello troiano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrē opē
commilitonibus suis attulerunt. quos tamen Homerus non in pestilen-
tia, neq; in uarijs generibus morborum aliquid attulisse auxilij: sed
vulneribus tantūmodo ferro, & medicamentis mederi solitos esse pro-
posuit. ex quo apparet has partes medicinae solas ab his esse tentatas:
easq; esse uetustissimas. Eodemq; authore disci potest morbos tum ad
iram deorum immortalium relatos esse: & ab iisdem opem posci so-
litam. ueriq; simile est inter nonnulla auxilia aduersae ualitudinis,
plerumq; tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neq; dese-
dia, neq; luxuria tentant. si quidem haec duo, corpora prius in Grae-
cia, deinde apud nos affligerunt. Ideoq; multiplex ista medicina neq;
olim apud Graecos, neq; apud alias gentes necessaria, uix aliquos ex
bonis ad senectutis principia perducat. Ergo etiam post eos, de quibus
retuli, nonnulli clari uiri medicinam exercuerunt, donec maiore stu-
dio literarum disciplina agitari coepit. quae ut animo praecipue omnia
necessaria, sic corpori inimica est. Primoq; medendi scientia sapientiae
pars habebatur. ut & morborū curatio, & rerum naturae contem-
platio sub iisdem authoribus nata sit. scilicet his hanc maxime requi-
rentibus, qui corporū suorū roborā quietā cogitatione, nocturna q; ui-
gilia minuerant. Ideoq; multos ex sapientiae professoribus peritos, eius
fuisse accepimus. clarissimos uero ex his Pythagorā, et Empedoclem,
& Democritum. huius autem, ut quidā crediderunt, discipulus Hip-
pocrates Cōus. primus quidē ex omnibus memoria dignus, ab studio
sapientiae disciplinam hanc separauit: uir & arte, & facundia in-
signis. Post quem Diocles Carystus, deinde Praxagoras, et Chrysippus,

Aurelij Cor.

LIBER

3^a medicina in humore
in quo tempore fuerit
inueni

uiciorum sine ratione cognoscere
ne habent in pot

tum Herophilus, et Erasistratus sic artem hanc exercuerunt, ut etiā in diuersas curandi uias processerint. Iisdemq; temporibus in tres partes medicina diducta est, ut una esset quæ uictu, altera quæ medicamentis, tertia quæ manu mederetur. Primā διατητικὴν, secundā quæ uictu morbos curat longe clarissimi authores etiam altius quædam agitare conati, rerum quoq; naturæ sibi cognitionem uendicauerunt, tanquam sine ea trunca, et debilis medicina esset. Post quos Serapion primus omnium nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinā professus, in usu tantum, et experimentis eam posuit. quem Apollonius, et Glaucias, et aliquanto post Heraclides Tarentinus, et aliqui non mediocres uiri secuti, ex ipsa professione se ἐμπειροὺς appellauerunt. Sic in duas partes ea quoq; quæ uictu curat, medicina diuisa est: alijs rationalem artem, alijs usum tantum sibi uendicantibus. nullo uero quicq; post eos, qui supra comprehēsi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi rationē ex magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse quoq; quædam in senectute deflexit. Et per hos quidem maxime uiros salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus medicinæ partibus ut difficillima, sic etiam clarissima est ea, quæ morbis medetur: ante omnia de hac dicendum est. Et quia prima in ea dissensio est, quod alij sibi experimentorum tantummodo notitiā necessariam esse contendunt: alij nisi corporum, rerumq; ratione comperta, non satis potentem usum esse proponunt: indicandum est quæ maxime ex utraq; parte dicantur: quo facilius nostra quoq; opinio interponi possit. Igitur hi qui rationalem medicinā profitentur, hæc necessaria esse proponunt. abditarum, et morbos continentium causarū notitiā, deinde evidentium: post hæc etiam naturalium actionum nouissime partium interiorū. Abditas causas uocant in quibus requiritur ex quibus principijs nostra corpora sint: quid secundam, quid aduersam ualeitudinem faciat. Neq; enim credunt posse eum scire quomodo morbos curare conueniat, qui unde hi sint, ignoret. Neq; esse dubiū, quin alia curatione opus sit, si ex quatuor principijs uel superans aliquid, uel deficiens aduersam ualeitudinem creat: ut quidam ex sapientiae professoribus dixerunt. Alia si in humidis omne uitium est, ut Herophilo uisum est. alia si in spiritu, ut Hippocrati. alia si sanguis in eas uenas, quæ spiritui accommodatæ sunt, transfunditur: et inflammationem quam Græci φλεγμὴν nominant, excitat: eaq; inflammatio talem motum efficit, qualis in febre est: ut Erasistrato placuit. alia si mananti corpuscula per inuisibilia foramina subsisten-

Medicam
pro

serapion
mud.

causa

Protes

advis
evident

do iter claudunt: ut Aesclepiades contēdit. Eum uero recte curaturū, *Non*
 quem prima origo causae non fecerit. Neque uero inficiantur experi-
 menta quoque esse necessaria. sed ne ad haec quidē aditum fieri potuisse,
 nisi ab aliqua ratione contendunt. Non enim quidlibet et antiquiores viros
 aegris inuolasse: sed cogitasse quod maxime conueniret: et id usu explo-
 rasse, quod ante coniectura aliqua duxisset. neque interesse an initia ple-
 raque explorata sint, si à consilio tamen coeperunt. et id quidē in mul-
 tis ita se habere. Saepē uero et noua in adere genera morborū, in qui-
 bus nihil adhuc usus ostenderit. et ideo necessariū sit animaduertere
 unde ea coeperint, sine quo nemo mortaliū reperire possit, cur hoc,
 qui in illo potius utatur. et ob haec quidē in obscuro positas causas per-
 sequuntur. Euidētes uero has appellant, in quibus querunt initium mor-
 bi calor attulerit, an frigus. fames, an satietas. et quae similia sunt. Oc-
 cursum enim initio dicunt eum, qui originē non ignorarit. Naturales
 uero corporis actiones appellāt, per quas spiritū trahimus, et emitti-
 mus cibum: potionemque, et assumimus, et concoquimus. Necque per quas
 eadē haec in omnes membrorum partes digeruntur: tum requirunt et
 quare uenae nostrae modo submittant sese: modo attollant. quae ratio
 somni, quae uigiliae sit. sine quorum notitia neminem putant uel cau-
 rere, uel mederi morbis, inter haec nascentibus, posse. Ex quibus quia
 quā maxime pertinere ad rem concoctio uidetur. Huic potissimū in-
 stant: et duce alij Erasistrato atteri cibū in uentre contendunt. alij Di-
 ostrato Praxagorae discipulo putrescere. Alij credunt Hippocrati per
 calorem abos concoqui. Aceduntque Aesclepiadis amuli, quod omnia ista ua-
 na, et superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudā mate-
 riā, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et haec quidē inter eos
 parū constant. Illud uero cōuenit, alium dandū cibum laborātibus, si
 hoc: alium si illud uerū est. Nam si teritur intus, eum quarendū esse,
 qui facillime teri possit. Si putrescit, eū in quo hoc expeditissimū est.
 Si calor concoquit, eū qui maxime calorem moueat. At nihil ex his eē
 quarendū, si nihil concoquitur. Ea uero sumenda, quae maxime manēt,
 qualia assumpta sunt. Eadēque ratione cū spiritus grauis est, cū somnus
 aut uigilia urget, eū mederi posse arbitrantur: quod prius illa ipsa, quali-
 ter eueniant, peperit. Præter haec cū in interioribus partibus et dolores,
 et morborū uaria genera nascantur, neminē putant his adhibere posse
 remedia, quae ipse ignoret. Necessariū ergo esse in adere corpora mer-
 tuorum: eorumque uiscera, atque intestina scrutari. Longeque optime fecisse Hero-
 philū, et Erasistratū, quod nocētes homines à regibus ex carcere acceptos, Herophilus et Erasistratus
 uinos in aderint: cōsiderarintque et spiritu manente, ea quae natura an-
 te clausisset: eorumque positurā, colorem, figurā, magnitudinē, ordinem,
 et uinum recipiēdo hominibus
 et uinum recipiēdo
 et uinum recipiēdo
 et uinum recipiēdo

duritiem, molliem, leuorem, contactum: processus deinde singulorū,
 & recessus: & siue quid inferitur alteri: siue quid partē alterius in
 se recipit. Neq; enim cum dolor inus incidit, scire quid doleat eum,
 qui qua parte quodq; viscus intestinum'ue sit, non cognouerit. Neq; cu
 rari id quod aegru est, posse ab eo, qui quid sit, ignoret. Et cum p vul
 nus alicuius viscera patefacta sunt, eum, qui sanæ cuiusq; colorē par
 tis ignoret, nescire quid integrū, quid corruptum sit. Ita ne succurre
 re quidem posse corruptis. aptiusq; extrinsecus imponi remedia, cō
 pertis interiorum, & sedibus, & figuris. Cognitaq; eorū magnitudi
 ne, similesq; omnia, quæ posita sunt, rationes habere. Neq; esse crude
 le, sicut pleriq; proponunt, hominū nocentium: & horum quoq; pau
 corum supplicij remedia populus in nocentibus seculorum omnū quæ
 ri. Contra hi, qui se ἐμπειρὺς ab experientia nominant: euidenter
 quidē causas ut necessarias amplectuntur. Obscurarū uero causarum,
 & naturalium actionum quæstionem ideo supernam esse conten
 dunt, quoniam incōprehensibilis natura sit. non posse uero cōprehē
 di, patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia: cum de ista re,
 neq; inter sapiētiae professores, neq; inter ipsos medicos conuenit. Cur
 enim potius aliquis Hippocrati credat, q̄ Herophilo? Cur huic potius,
 q̄ Asclepiadi? si rationes sequi uelit, omnium posse uideri non impro
 bables. si curationes, ab omnibus his egros perductos esse ad sanitatē.
 Ita neq; disputationi, neq; auctoritati cuiusq; fidē derogari oportuisse.
 Etiam sapientiæ studiosos maximo: medicos esse, si ratio natio hoc fa
 ceret. nunc illis uerba superesse, deesse medendi scientiam. Differre
 quoq; pro natura locorū genera medicinæ: & aliud opus esse Romæ:
 aliud in Aegypto: aliud in Gallia. Quod si morbos eadem causæ face
 rent ubiq; remedia quoq; ubiq; eadē esse debuissent. sape ēt causas ap
 parere: ut puti lippitudinis, uulneris, neq; ex his patere medicinam.
 Quod si scientiā hanc non subiiciat euident causa, multo minus eam
 posse subijcere, quæ in dubio est. Cū igitur illa incerta incōprehēsi
 bilisq; sit, a certis potius, et exploratis petendū esse præsidium. i. his, quæ
 experiētia in ipsis curationibus docuerit, sicut in cæteris omnibus ar
 tibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed
 usu fieri. ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere. Eo quoq;
 disci, quod qui diuersa de his scripserint, ad eandē tamen sanitatē ho
 mines perduxerint id enim fecisse, q̄ nō ab obscuris causis, neq; a na
 turalibus actionibus, quæ apud eos diuersæ erant: sed ab experimen
 tis pro ut cuiq; responderant, medendi uias traxerint: ne inter initia
 quidem ab istis quæstionibus deductā esse medicinam, sed ab experi
 mentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erāt, alios propter auiditatē

Medicini solum uirtus

Empirici

primis diebus protinus cibum assumpsisse: alios propter fastidiū absti-
 nuisse: lenatunq; magis eorū morbum esse, qui abstinnerant. Itemq;
 alios in ipsa febre aliquid edisse: alios paulo ante ea: alios post remissio-
 nem eius. optime deinde his cessasse, qui post finē febris id fecerint. Ea
 deq; ratione alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore: alios
 exiguo: grauiorēq; eos factos, qui se impleverint. *Hæc similiaq; cū coti-* *Medicini ergo*
die inciderent, diligentes homines notasse, quæ plerunq; melius respon-
derent: deinde ægrotantibus ea præcipere cœpisse. sic medicinam ortā,
subinde aliorū salute, aliorū interitū: pernicioſa discernentē à salutaribus.
Repertis deinde medicine remedijs, hoies de rationibus corū disse-
rere cœpisse: nec post rationē medicinam esse inuentam, sed post inue-
tam medicinā rationē esse quasitam. Requiere et si ratio idē doceat
quod experientia, an aliud. Si idē, superuacua esse. si aliud, et con-
trariam. Primo tamen remedia explorāda summa cura fuisse. nunc
uero iam explorata esse: neq; ulla, aut noua genera morborū reperiri,
aut nouam desiderari medicinā. Quod si iā incidat mali genus ali-
quod ignotū: non ideo tamen fore medico de rebus cogitandū obscu-
ris: sed eū protinus uisurū, cui morbo id proximū sit: tentaturūq; re-
media similia illis, quæ uicino malo sæpe succurrerint: et per eius ſi-
militudinē opem reperturū. Neq; n. se dicere consilio medicū non ege-
re: et irrationale animal hanc artē posse præstare. sed has latentiu
rerū coniecturas ad rē non pertinere: quia non interſit, quid morbi
faciat, sed quid tollat. Neq; ad rē pertineat quomodo, sed qd optima
digeratur: siue hac de causa cōſectio incidat, siue de illa. et siue cō-
ſectio ſit illa, siue tantū digestio. Neq; quærēdū esse quomodo ſpiremus:
sed quid grauē, tardūq; ſpiritu expediat. neq; quid uenas moueat:
sed quid quæq; motus genera ſignificent. Hæc aut cognosci experimē-
tis, et in omnibus eiufmodi cogitationibus in utrāq; partē diſſeri poſ-
*ſe. Itaq; ingeniu et facundiam uincere: morbos aut non eloquentia, *Non**
ſed remedijs curari. Quæ si quis elinguis uſu discreta bene norit: hūc
aliquanto maiore medicum futurū: q̄ si ſine uſu linguā ſuā excolue-
rit. Atq; ea quidē, de quibus eſt dictū, ſuperuacua eſſe tantummodo.
Id uero quod reſtat et crudele: uiuorū hominum aliu, atq; præcor-
dia incidit: et ſalutis humanæ præſidē artē n. ſolū peſtem alicui,
ſed hanc et atrociffimam inferre: cū præſertim ex his, quæ tanta uio-
lencia quærantur, alia non poſſint omnino cognosci: alia poſſint et
ſine ſcelere. nā colorem, læuorē, mollitiem, duritiem, ſimiliaq; omnia
nō eſſe talia in ſo corpore, qualia integro fuerint. q̄ cū corporibus in
uiolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, laſſitudine, mille alijs
mediocribus affectibus ſæpe mutantur: multo magis ueriſimile eſt inte-

LIBER

viora, quibus maior mollities lux ipsa noua sit, sub grauissimis ulneribus et ipsa trucidatione mutari: neque quicquam esse stultius, quam quale quodque uiuo homine est, tale existimare esse moriente, immo iam mortuo.

Nam utrum quidem, qui minus ad rem pertineat, spirante homine posse diduci? simulatque uero ferrum ad praecordia accessit: et discissum transuersum septum est: quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit, (διασπαραζουσα graeci uocant) hominem protinus animam amittere. Ita demum mortui praecordia, et uiscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale mortui sit: non quale uiui fuit. Itaque consequi medicum ut hominem crudeliter iugulet: non ut sciat qualia uiui uiscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui subiiciatur, id saepe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in harena, uel militem in acie, uel uiatorem a latronibus exceptum, sic uulnerari: ut eius interior aliqua pars aperiatur: et in alio alia sita: sedem, positum, ordinem: figuram: similiaque alia cognoscere prudentem medicum non cadere, sed sanitatem molientem: idque per misericordiam discere, quod alij dira crudelitate cognouerint. Ob haec ne mortuorum quidem laceratione necessariam esse: quae et si non crudelis, tamen foeda sit: cum aliter pleraque in mortuis se habeant. Quatum uero in uiuis cognosci potest, ipsa curatio ostendat. Cum haec per multa uolumina, per quae magnae contentionis disputationes a medicis saepe tractata sint, atque tractentur: subiiciendum est, quae proxima uero uideri possint: ea neque addicta alterutri opinio ni sunt: neque ab utraque nimium abhorrentia, media quodammodo inter diuersas sententias. Quod in plurimis contentionibus deprehendere licet sine ambitione uerum scrutantibus: ut in hac ipsa re. Nam quae demum causae uel secundam ualitudinem praesent: uel morbos excitet: quomodo spiritus, aut cibus uel detrahatur, uel digeratur: ne sapientiae quidem professores scientia comprehendunt: sed coniectura persequuntur. cuius autem rei non est certa noticia, eius opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quamquam igitur multa sint ad ipsas artes proprie non pertinentia: tamen eas adiuvat excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturae rerum contemplatio quous non faciat medicum aptiorem, tamen medicinae reddit perfectum. Verumque simile est et Hippocrati, et Erasistrato, et quicumque alij non contenti febres et ulcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sint: non ideo quidem medicos fuisse: uerum ideo quoque maiores medicos extitisse. Ratione uero opus est ipsi medicinae, et si non inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, tamen saepe. Est enim haec ars coniecturalis: neque respondet ei plerumque non solum coniectura,

sed etiam experientia. et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Rarius, sed aliquando tamen morbus quoque ipse nouus est, quem non incidere, manifeste falsum est: cum aetate nostra quaedam ex naturalibus partibus carne prolapsa, et arente, intra paucas horas expirauerit: sic ut nobilissimi medici neque genus mali, neque remedium inuenerint: quos ego nihil ideo tentasse iudico: quia nemo in splendida persona periclitari coniectura sua uoluerit: ne occidisse, nisi seruasset, uideretur. Veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitare detracta tali uerecundia: et fortasse responsurum fuisse id quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinae genus neque semper similitudo aliquid confert: et si quando confert: tamen id ipsum rationale est inter multa similia genera et morborum, et remedium cogitare, quo potissimum medicamento sit utendum. Cum igitur talis res incidit: medicus aliquid oportet inueniat: quod non utique fortasse, sed saepius tamen etiam respondeat. Petet autem nouum quoque consilium non ab rebus latentibus (istae enim dubiae, et incertae sunt) sed ab his quae explorari possunt: id est euidentibus causis. Interest enim fatigatio morbum: an sitis, an frigus, an calor, an uigilia, an fames fecerit: an cibi, uinique abundantia: an intemperantia libidinis: neque ignorare hunc oportet, quae sit aegri natura, humidum magis, an magis siccum corpus eius sit: ualidi nerui, an infirmi: frequens aduersa uoletudo, an rara, ea, quae cum est, uehemens esse soleat: an leuis. breuis, an longa. Quod is uitae genus sit securus, laboriosum, an quietum, cum luxu, an cum frugalitate. ex his enim, similibusque saepe currendi noua ratio ducenda est. Quamuis ne haec quidem sic praeteriri debent, quasi nullam controuersiam recipiant. Nam et Erasistratus non ex his fieri morbos dixit: quoniam et alij, et ipse aliis post ista non febri citarent: et quidam medici saeculi nostri sub authore (ut ipsi uideri uolunt) Themisone contendunt nullius causae notitiam quicquam ad curationes pertinere: satisque esse quaedam commoda morborum intueri. si quidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere aegros, modo nimium: modo alia parte parum, alia nimium. Haec autem genera morborum modo acuta esse, modo longa: et modo incrementum, modo consistere: modo minui consueuerunt. Cognito igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse: si profluvio laborat, continendum. si mixtum uitium habet, currendum subinde uehementiori malo. et aliter acutis morbis medendum, aliter uehementibus. aliter incrementibus, aliter subsistentibus. aliter iam ad sanitatem inclinantibus. Horum observationem medicinam esse: quam ita finiunt, ut quasi uiam quandam quam metiodorus graeci nominant: eorumque quae in

*Causae huiusmodi
singulae.*

genera morborum

LIBER

morbis cōia sunt, contemplatricē esse contendunt: ac neq; rationalibus
 se, neq; experimēta tantum spectātibus annumerari uolunt: cū ab illis
 eo nomine dissentiant, quod in cōiectura rerū latentū nolunt esse me-
 dicinā: ab his eo quod parū artis esse in obseruatione experimentorū
 credunt. Quod ad Erasistratū pertinet, primū ipsa euidentia eius
 opinioni repugnat: q̄a raro nisi post horū aliquid morbus uenit. De-
 inde non sequitur, ut quod aliū non afficit, aut eundē aliās: id ne al-
 teri quidē, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quēdā subesse
 corpori, uel ex infirmitate eius, uel ex aliquo affectu: quæ uel i alio nō
 sunt: uel in hoc aliās nō fuerunt. eaq; p se non tanta ui concitant mor-
 bum: tamen obnoxiiū magis alijs iniurijs corpus efficiunt. Quod si cō-
 tēplationem rerū naturæ, quā temere medici sibi uendicant: satis cō-
 prehēdisset: et illud scīsser: nihil omnino ob unā causam fieri, sed id pro
 causa apprehendi: quod cōtulisse plurimū uidetur. Potest aut id dū so-
 lum est, nō mouere: quod iunctū alijs maxime mouet. Accedit ad hæc,
 quod ne ipse quidē Erasistratus, qui trāsffuso in arterias sanguine, fe-
 brem fieri dicit: idq; nimis repleto corpore incidere repperit: atq; ex
 duobus æque repletis, alter in morbū inciderit: alter omni periculo
 uacuit: quod cotidie fieri apparet, nō discreuerit. Ex quo disci pōt, ut
 uera sit illa trāsffusio, tamen illā non p se, cum plenū corpus est, fieri:
 sed cū horū aliquid accesserit. Themisonis uero æmuli, si ppetua quæ
 promittunt, habent: magis ē q̄ ulli rationales sunt. Neq; n. si quis nō
 omnia tenet, quæ rationalis alius probat: protinus alio nouo nomine
 artis indiget. Si modo, quod primū est: non memoriæ soli, sed rationi
 quoq; insit. Si quod uero propius est, uix ulla perpetua præcepta
 medicinalis ars recipit: ijdē sunt, quod hi, quos experimenta sola susti-
 nent. Eo magis qm si cōpresserit aliquē morbus, an fuderit: quilibet
 ē imperitissimus uidet. Quid aut cōpressum corpus resoluat: quid so-
 lutū teneat: si à ratione tractū est, rationalis est medicus. Si ut ei, qui
 se rationale negat, cōfiteri necesse est: ab experiētia empiricus est. Ita
 apud eū morbi cognitio extra artē, mediana intra usum ē. Neq; ad-
 iectum quicq; empiricorū professioni, sed demptum est: qm illi multa
 circūspiciunt: hi tantum facillima & non plusq; uulgaria. Nā & hi
 qui pecoribus ac iumentis medentur, cū propria cuiusq; ex multis ani-
 malibus nosse non possint: cōibus tantummodo insistant. Et exteræ gē-
 tes, cum subtilē medicinæ rationē non nouerint: cōia tantum uident.
 Et qui ample ualitudinarios nutriunt, quia singulis summa cura cō-
 sulere non sustinent: ad cōia ista configunt. Neq; Hercules istud, et
 antiqui medici nescierunt: sed his contenti non fuerunt. Ergo ēt uetu-
 sissimus author Hippocrates dixit mederi oportere & cōia, & pro-

pria inueniē. Ac ne isti quidē ipsi intra suam professionem consistere ullo modo possunt. si quidē & cōpressorum, & fluentium morborum genera diuersa sunt: faciliusq; id in his quæ fluunt, inspicī pōt. Aliud est. n. sanguine, aliud bilem, aliud cibū uomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri: aliud tabe cōsumi. Atq; in partes quoq; humor erumpit, ut in oculos, auresq;. quo pīculo nullum humanū membrum uacat: nihil aut horū sic, ut aliud curatur. Ita protinus in his à cōi fluentis morbi contēplatione ad propriam medicina descendit. Atq; in hac quoq; rursus alia proprietatis noticia sepe necessaria est: quia non eadē omnibus ē in similibus casibus opitulantiur. si quidē certæ quædā res sunt, quæ in pluribus uē trem aut astringunt, aut resolunt: inueniuntur tñ in quibus aliter, atq; in cæteris idem eueniat. In his ergo cōmunium inspectio contraria est: propriorū tantū salutaris: et causæ quoq; æstimatio sepe morbum soluit. Ergo ē ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper uidimus, Cassius febricitanti cuidam, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eū premi cœpisse cognosceret: aquam frigida ingressit: quæ ille epotæ, cum uini uim miscendo fregisset, protinus febrē, omno & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex causā, quæ ante præcesserat. Estq; etiam proprium aliquid & loci, & temporis istis quoq; authoribus: qui cum disputant quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt ut grauib; aut locis, aut temporibus magis uitetur frigus, æstus, sacietas, labor, libido: magisq; ut conquiescat hisdem aut locis aut temporibus, si quis grauitatem corporis sentit: ac neq; uomitu sto machum, neq; purgatione aluum sollicitet. Quæ uera quidem sunt: à communibus tamen ad quædam propria descendunt. nisi persuadere nobis uolunt, sanis quidem considerandum esse: quod cælum, quod tempus anni sit, ægris uero non esse: quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quin etiam morborum in hisdem hominibus aliæ, atq; aliæ proprietates sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est: contrarijs sepe restituitur. Plurimaq; in dando cibo discrimina reperiuntur: ex quibus contentus uno ero. nam famem facilius fert adulescens, quàm puer: facilius in densō cælo, quàm in tenui: facilius in hyeme, quàm in æstate: facilius uno cibo, quàm prandio quoq; assuetus: facilius in exercitatus, quàm exercitatus homo sustinet. Sæpe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus in diem tolerat. Ob quæ competit eum qui propria non nouit, communia tantum intueri debere: cumq; qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negli-

Cassius

M. 1. 2

gere, sed his quoque insistere. Ideoque cum par scientia sit, utilioremen medicum esse amicum, quam extraneum. Igitur ut ad propositum meum redeam, rationalem quidem puto medicinam esse debere: instrui uero ab euidentibus causis, obscuris omnibus non à cogitatione artificis, sed ab ipsa arte reiectis. Incidere autem uiuorum corpora, et crudele, et supernacuum est: mortuorum corpora discentibus necessarium. Nam positum, et ordinem nosse debent, quæ cadauera melius, quam uiuus et uulneratus homo representant: sed et cætera quæ modo in uiuis cognosci possunt, in ipsis curationibus uulneratorum paulo tardius, sed aliquando mitius usus ipse monstrauit. His propositis, primum dicam quemadmodum sanos agere conueniat: tum ad ea transibo, quæ ad morbos, curationesque eorum pertinebunt.

Caput primum quemadmodum sanos agere conueniat.

*S*anus homo qui et bene ualet, et suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet: ac neque medico, neque iatrolipta egere. Huc oportet uariū habere uitæ genus: modo ruri esse, modo in urbe: sæpiusque in agro nauigare, uenari, gescere interdum: sed frequentius se exercere. Siquidem ignauia corpus hebetat: labor firmat: illa maturam senectutem: hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis uti. modo ungi, modo id ipsum negligere. nullum cibi genus fugere, quo populus utatur. interdum in conuiuium esse: interdum ab eo se retrahere. modo plus iusto, modo non amplius assumere. bis die potius, quam semel cibum capere, et semper quam plurimum, dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis exercitationes, cibi que necessarii sunt, sic athletici supernacui: nam et intermissus propter ciuiles aliquas necessitates ordo exercitationis corpus affligit: et ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, celerrime, et senescunt, et ægrotant. Concubitus uero neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat: frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura: ratione ætatis et corporis: scire licet eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur. Idem interdum peior est, nocturnus tutior. ita tamen si neque illum abus, neque hunc cum uigilia labor statim sequitur. Hæc firmis seruanda sunt: cauendumque ne in secunda ualetudine aduersa præsidia consumantur.

Quæ stomacho imbecilli seruanda sint, Caput secundum.

Stomachus.

T imbecillis stomacho, quo in numero magna pars urbanorum, omnesq; penè cupidi literarum sunt: obseruatio maior necessaria est. ut quod uel corporis, uel loci, uel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur q; bene concoxit, mane tuto surget. qui parū, quiescere debet. Et si mane surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui nō concoxit, ex toto conquiescere: ac neq; labori se, neq; exercitationi, neq; negotio credere. Qui crudū sine præcordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquā frigidam bibere: Et se nihilominus continere. Habitare uero ædificio lucido per flatum æstiuum hibernum solem habente. cauere meridianum solem: matutinum, Et uespertinam frigus: itemq; auras fluminum, atq; stagnorum: minimeq; nubilo cœlo soli aperienti se committere: ne modo frigus, modo calor moueat. quæ res maxime grauedines, distillationesq; concitat. Magis uero grauib; locis ista seruanda sunt: in quibus est pestilentiam faciunt. Sane aut licet integrum corpus esse, cum cotidie mane urina alba, dein ruffa est. illud concoquere, hoc concoxisse significat. Vbi ex perrectus est aliquis, paulum intermittere: deinde nisi hyems est, fouere os multa aqua frigida debet, longis diebus meridiari potius ante cibum, sin minus, post eum. per hyemem potissimum totis noctibus conquiescere. sin lucubrandum est, nō post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdus uel domesticis, uel ciuilia officia tenuerunt: huic tempus aliquod seruandum curationi corporis sui est. prima autem eius curatio exercitatio est: quæ semper antecedere cibum debet: in eo qui minus laborauit, Et bene concoxit, amplior. in eo qui fatigatus est, Et minus concoxit, remissior. Commodè uero exercent clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio: atq; hæc non utiq; plana commodior est. siquidem melius ascensus quoq; Et descensus cum quadam uarietate corpus moueat: nisi tamen id perquam imbecillum est. melior autem est sub diuo, quàm in porticu. melior si caput patitur, in sole, quàm in umbra. melior in umbra, quam parietes, aut uiridaria efficiunt, quàm quæ tecto subest. melior recta, quàm flexuosa. exercitationis autem plerunq; finis esse debet sudor: aut certe lassitudo, quæ citra fationem sit: idq; ipsum modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne his quidem athletarum exemplo, uel certa esse lex, uel immodicus esse labor debet. Exercitationem recte sequitur modo unctio uel in sole, uel ad ignem: modo balneū, sed conclauī quam maxime, Et alto, Et lucido, Et spaciofo. Ex his uero neutrum sæpe fieri oportet: sed sæpius alterutrum

Exercitatio.
6 Epul. f. m

lib. 2^a
in liq. potu qua
cibo repleri.

Secunda mensa
qbus nouat.

potio aquae frigida
qñ faciunda.

Labor qñ uitandus

pro corporis natura. Post haec paulum conuiescere opus est. ubi ad cibum uentum est: nunquam utilis est nimia sacietas. saepe etiam inutilis nimia abstinentia. saepe si qua intemperantia subest: tutior est in potione quam in esca. Cibus à salsamentis, oleribus, similibusq; rebus melius incipit. Tum caro assumenda est, quæ assa optima, aut elixa est. Condita omnia duabus de causis inutilia sunt. quoniam et plus propter dulcedinem assumitur: et quod modo par est, tamen ægrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet: in imbecillo coarcescit. si quis itaq; hoc parum ualet, palmulas, pomaq; et similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quæ aliquantum sitim excesserunt, nihil edendū est. post sacietatem, nihil agendum. Vbi expletus est aliquis, facilius concoquit: si quicqd assumpsit, potione aquæ frigida includit: tum paulisper inuigilat: deinde bene dormit. Si quis interdum se implebit: post cibum neq; frigori, neq; aestui, neq; labori se debet committere. neq; enim tam facile hæc inani corpore, quā repleto nocet. Si quibus de causis futura inedia est: labor omnis uitandus est.

Observationes quædam prout res nouæ accidunt: et prout corporū genera, et sexus, et ætates, et tempora anni sunt. Caput tertium.



Atq; hæc quidem penè perpetua sunt. Quasdam aut observationes desiderant et nouæ res, et corporū genera, et sexus, et ætates, et tempora anni. Nam neq; ex salubri loco in grauem, neq; ex graui in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima hyeme, ex graui in eum, qui salubris est, prima æstate transire melius est. Neq; uero ex multa fame nimia sacietas: neq; ex nimia sacietate fames idonea est. Periclitaturq; et qui semel, et qui bis die cibum incontinenter contra consuetudinem assumit. Item neq; ex nimio labore subitum otium: neq; ex nimio otio subitus labor sine graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid uolet, paulatim debet assuescere. Omnem etiam laborem facilius uel puer, uel senex, quam insuetus homo sustinet. Atq; ideo quoq; nimis ociosa uita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laborauit, aut multo plus quam solet, etiam si qui assueuit, huic ieiunio dormiendum est: multo magis si etiam os amarum est: uel oculi caligant: aut uenter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiunio est, sed etiam in posterum diem permanendum: nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est: surgere oportet, et lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis

aliquis laborauit, tamen ingredi aliquid eodē modo debet. Cōmuni
 deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumpturus, ubi paulum
 ambulauerunt, si balneum nō est, calido loco uel in sole, uel ad ignem
 ungi: atq; sudare. si est, ante omnia intepidario residere. Deinde ubi
 paulum conquieuerunt, intrare, et descendere in solium. cum multo oleo
 ungi, leniterq; perfricari: iterum in solium descendere. Post hæc os
 aqua calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruens idoneū non
 est. Ergo si nimium alicui fatigato penē febris est, huic abunde est loco
 tepido denutrire se inguinibus tenus in aquam calidam, cui paulū olei
 adiectum: deinde totum quidē corpus, maxime tamen eas partes, quæ
 in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui uinum, et paulum con
 triti salis sit adiectum. Post hæc omnibus fatigatis, aptum est cibum
 sumere, eoq; humido uti. aqua, uel certe diluta potione esse contentos, ma
 ximeq; ea, quæ moueat urinam. Illud quoq; nosse oportet, quod ex la
 bore sudanti frigida potio perniciosissima est. atq; etiam cum sudor se
 remisit, itinere fatigatis inutilis. A balneo quoq; uenientibus Aselepi
 des inuilem eam indicauit. quod in his uerum est, quibus aliis fac
 le nec tuto resoluitur: quiq; facile inhorrescunt. perpetuū in omnibus
 non est, cum potius naturale sit potione ætuantem stomachum refri
 gerari: frigentem calefieri. quod ita præcipio, ut tamen fatear ne ex
 hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse. Solet etiā
 prodesse post uariū cibum, frequentesq; dilutas potiones, uomitus, &
 postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio
 urget, inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est: raroq; balneo
 utendum. Leuiterq; lassitudinem etiam laboris mutatio: cumq; quem
 nouum genus: eiusdem laboris pressit, id quod in consuetudine est, re
 ficit. Fatigato cotidianum cubile turissimū est: insolitum contra lassat.
 quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.
 proprie quædam ad eum pertinent, qui ambulando fatigatur. Hunc
 reficit in ipso quoq; itinere frequens frictio: post iter, primum sedile,
 deinde unctio: tum calida aqua in balneo magis superiores partes, q̄
 inferiores foueat. Si quis uero exustus in sole est, huic in balneum pro
 titus eundem est: persundendumq; oleo corpus, & caput: deinde in
 solium bene calidum descendendum est. tum multa aqua per caput in
 fundēda prius calida, deinde frigida. At ei qui perfruxit, opus est in
 balneo primū inuolutū sedere, donec insudet: tum ungi, deinde lau
 ri. cibum modicum, deinde potiones meracæ assumere. Is uero qui na
 uigauit, & nauis pressus est, si multam bilem euomuit, uel abstinere
 cibo debet: uel paulum aliquid assumere. Si pituitam acidam effu
 dit, utiq; sumere cibum: sed assueto leniorem. Si sine uomitu nauis

*Fatigatio &
 & Erasmo.*

LIBER

fuit, uel abstinere, uel post cibū uomere. Qui uero toto die, uel in uehi-
culo, uel in spectaculo sedet, huic nihil currendū, sed lente ambulam-
dum est. Lenta quoq; in balneo mora, dein coena exigua prodesse con-
sueuerunt. Si quis in balneo aestuat, reficiat hunc ore exceptum, & in
eo retentum acetum. si id non est, eodem modo frigida aqua assump-
pta. Ante omnia autem norit quisq; naturā sui corporis: quoniam alij
graciles, alij obesi sunt. alij calidi, alij frigidiores. alij humidi, alij sic-
ci. alios astricta, alios resoluta aluus exercet. raro quisquam non ali-
quam partem corporis imbecillam habet. Tenuis uero homo imple-
re se debet: plenus extenuare: calidus refrigerare: frigidus caleface-
re: madens siccare: siccus madefacere. itemq; aluum fir mare is, cui
fusa soluere is, cui astricta est. Suauiterrandumq; semper parti maxi-
me laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequen-
tior quies, unctio. & si post prandium est balneum, contracta aluus,
modicum frigus hyeme, somnus & plenus, & non nimis longus.
molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos, & potionis maxime
dulcia & pinguis cibis & frequentior, & quantius plenissimus po-
test concoqui. Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit,
magisq; si salsa est. in ieiunio balneū, inurēs sol, et omnis calor, cura,
uigilia, somnus nimium uel breuis, uel longus lectus per astatem ter-
ra, hyeme durum cubile. cursus, multa ambulatio, omnisq; uchemens
exercitatio, uomitus, deiectio, acida res et austera, & semel die assump-
pta epula, & uini non perfrigidi, ieiunio potio in consuetudinem ad-
ducta. Cum uero inter extenuantia posuerim uomitum, & deiectionem,
de his quoq; proprie quadam dicenda sunt. Eiectum esse ab
Asclepiade uomitum in eo uolumine, quod de tuenda sanitate am-
posuit, uideo. neq; reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui
cotidie eijciendo uorandi facultatem moliantur. paulo etiam longius
prociessit, idem purgationes quoq; eodem uolumine expulit. & sunt
hae perniciosae, si nimis ualentius medicamentis fiunt. sed haec tamen
subueniunda esse, non est perpetuum. quia corporum, temporumq; ra-
tio potest ea facere necessaria, dū & modo, & non nisi cum opus est,
adhibeantur. Ergo ille quoq; ipse, si quid iam corruptum esset, expelli
debere confessus est. Ita non ex toto res condemnanda est. sed esse eius
etiam plures causae possunt. estq; in ea quadam paulo subtilior obfer-
uatio adhibenda. Vomitus utilior est hyeme, quam aestate. Nam tum
& pituitae plus, & capitis grauitas maior subest. inutilis est gracilibus,
& imbecillum stomachum haec utilius. utilis est plenis & bili-
osis omnibus, si uel nimium se repleuerunt: uel parum concoxerunt.
nam siue plus est, quam quod concoqui possit, periclitari ne corruptum-

que corp' implet

que extenuant

de uomit' & de deiectione

pater, non oportet. Si uero corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua uia primum expelli potest, eijcere. Itaq; ubi amari ructus cum dolore, & grauitate prae cordiorum sunt, ad hunc protinus confugendum est. Itē prodest ei, cui pectus aestuat, & frequens salina uel nauſea est: aut cui sonant aures: aut madent oculi: aut os amarum est. Similiterq; ei, qui uel cælum, uel locum mutat: huq; quibus, si per plures dies non uomuerunt, dolor prae cordia infestat. Neq; ignoro inter hæc præcipi quietem. quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaq; istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. interdum ualitudinis causa recte fieri experimentis credo. Commoneo tamen ne quis, qui ualere et se- nescere uolet, hoc cotidianum habeat. Qui uomere post cibum uolet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere. si difficilius, aquæ, uel salis, uel mellis paulum adijcere. At qui mane uomiturus est, ante bibere mulsum, uel hyssopum, aut esse radicula debet. deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cætera quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post uomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi sed huius idonei, gustandum: et aquæ frigida cyathi tres bibendi sunt. Si autem uomitus fauces exasperauit, q uomuit, si mane id fecit, ambulare debet: tum ungi, deinde cenare. si post cenam, postero die lauare: & in balneo sudare: hinc proximus abusus, medio: rus utilior est: usq; esse debet cum pane hesterno, uino austero meraco, & carne assa, abisq; omnibus quam sicissimis. Qui uomere bis in mense uult, melius consulet, si biduo continuarit, quam si post quintum decimum diem uomuerit: nisi hæc mora grauitatem pectori faciat. deiectio autem medicamentum quoq; petenda est, ubi uenter suppressus parum reddit. ex eoq; inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaq; superioris partis mala crescunt. Quid enim inter hæc adiungere possunt quies, & inedia quæ per illas maxime eueniunt? Qui eijcere uolet, primum cibis, uinisq; utetur his, quæ hoc præstant. dehinc si parum illa proficiant, aloenumat. sed purgationes quoq; ut interdum necessariae sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assueſcit. n. non ali corpus: & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit. Calefacit autem unctio, aqua salſa, magisq; si attida est. omnia salſa, amara, carnoſa. si post cibum est balneum, uinum austerrum. Refrigerat in ieiunio & balneum, & somnus nisi nimis longus est: & omnia acida, aqua q̄ frigidissima, oleum si aquæ miscatur. Humidū autem corpus effiat labor maior q̄ ex consuetudine, frequens balneum, cibus plenior, multa potio, post hac ambulatio

Modum

Amulis

LIBER

et uigilia. Per se quoque ambulatio multa, et uehemens, et matutina exercitatio, et non protinus abies adiectus, ea genera escae quae ueniunt ex locis frigidis, et pluujs, et irriguis. Contra sicut modica exercitatio, fames, unctio sine aqua, calor, sol modicus, frigida aqua, abies exercitationi statim subiectus, et is ipse ex siccis, et aestuosis locis ueniens. Alium astringit labor, sedile, creta singularis corpori illita, abies imminutus, et is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet. exigua potio, neque adhibita nisi cum abies quis quantum assumpturus est, cepit. post abum quies. Contra soluit aucta ambulatio, atque esca post motus, qui post abum est. subinde potiones cibo immixtae. Illud quoque scire oportet, quod uenter uomitus solum comprimit: compressum soluit. Itemque comprimit is uomitus, qui statim post abum est: soluit is qui tarde superuenit. Quod ad aetates uero pertinet, in ediam facillime sustinent mediae aetates: minus iuuenes: minime pueri, et senectute confecti. quod minus fert facile quisque, eo saepius debet abum assumere: maximeque eo eget, qui in rescit. Calida lauatio et pueris, et senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius. neutri aetati quae inflationes mouent. Iuuenum minus quae assumant, et quomodo currentur, interest. quibus inuenibus fluxit aluus, plerumque in senectute contrahitur. Quibus in adolescentia fuit astricta, saepe in senectute soluitur. Melior est autem in iuene fusior: in sene astrictior. Tempus quoque anni considerare oportet. hyeme plus esse conuenit. minus, sed meracius bilere. multo pane uti. carne potius elixa. modice oleribus. semel die abum capere: nisi si nimis uenter astrictus est. si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, et ipsum siccum sine carne, sine portione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, uel calorem mouentibus. Venus tum non aequae perniciosa est. At uere paulum abo demendum, adiciendumque potioni: sed dilutius tamen bibendum est. magis carne utendum. magis oleribus. transeundum paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Aestate uero et portione, et abo corpus saepius eget. ideo prandere quoque conmodum est. Eo tempore aptissima sunt et caro, et olus. potio quamdiu lutissima, ut et sitim tollat: nec corpus incēdat. Frigida lauatio, caro assa, frigidi cibi, uel qui refrigerent. ut saepius autem abo utendum, sic exiguo est. Per autumnum propter caeli uarietatem periculum maximum est. Itaque neque sine ueste, neque sine calciamentis prodire oportet, praecipueque diebus frigidioribus. neque sub diuo nocte dormire: aut certe bene operiri. Cibo uero iam paulo pleniore uti licet. minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quae immodice toto die plerumque sic assumuntur, ne quid ex densiore abo remittatur. Ita non haec, sed

Abus. p. 121 a

lib. de uero p. 121 a
Tempus.

hæc, sed consumatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamē minusq̃ in his noxa est. Sed his uti non sæpius quā alio cibo conuenit. Deniq; aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neq; æstate uero, neq; autumnō utilis uenus est: tolerabilior tamen per autumnum: æstate uero & toto (si fieri potest) abstinentum.

De his, qui aliqua parte corporis laborant: et primum de his, quibus caput infirmum est. Caput. iij.

Proximū est ut de his dicā, qui partem aliquam corporis imbecillas habent, cui caput infirmum est: is si bene concoxerit, leniter perfricare id mane manibus suis debet. nūquam id, si fieri potest, ueste uelare: aut ad cutem tonderi. Vtileq; lunam uitare, maximeq; ante ipsum lunæ, solisq; concursum. sed nusquam post cibum progredi si cui capilli sunt, eos cotidie pectere: multum ambulare. sed si licet, neq; sub tecto, neq; in sole. Vbiq; autem uitare solis ardorem, maximeq; post cibum, & uinum. potius ungi, q̃ lauari. nunq̃ ad flammam ungi: interdum ad prunam. Si in balneum uenit: sub ueste primum paulum in tepidario insudare: ibi ungi: tum trāsire in calidarium: ubi sudabit, in solium non descendere: sed multa calida aqua per caput se totū perfundere: tum tepida uti, dein frigida: diutiusq; ea caput, quā cæteras partes perfundere: deinde id aliquādiu perfricare: nouissime detergere, & ungere. Capiti nihil æque prodest atq; aqua frigida. Itaq; is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali cotidie debet aliquandiu subijcere. Semper autem etiam si sine balneo unctus est, neq; totum corpus refrigerare sustinet: caput tamen aqua frigida perfundere. sed cum cæteras partes attingi nolit: demittere id ne ad ceruices aqua descendat: eamq; ne quid oculis, alijs uel partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regere. huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat. isq; si ie iunio caput læditur, assumendus etiam medio die est. si non læditur, semel potius bibere huic assidue uinum dilutum, leue, quā aquam magis expedit: ut cum caput grauius esse cœperit, sit quod confuget: eiq; ex toto neq; uinum, neq; aqua semper utilia sunt. medicamentum utrumq; est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, uoce contendere, huic opus non est utiq; post cœnam: post quam ne cogitatio quidem ei satis tuta est: maxime tamen uomitus alienus est.

Aurelij Cor.

b

Caput.

Fricatio

Capiti infirmo
quid noceat,

LIBER

De his q lippitudine, grauedine, destillatione, tonsillisq; laborat. Cap. V.

Destillatio.
Tonsillo.

n Eaq; uero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aquae frigidae prodest: sed his etiā, quos assidue lippitudines, grauedines, destillationes, tonsillaeq; male habent. his autem non caput tantum cotidie perfundendum est: sed os quoq; multa frigida aqua fouendum est. praecipueq; omnibus, quibus hoc utile auxilium est: eo utendum est, ubi grauius caelum Austri reddiderunt. cumq; omnibus inutilis sit post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tum his praecipue, qui uel capitis, uel arteriae dolores habere consuerunt, uel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiā grauedines, destillationesq; possunt: si quamminime eum, qui his oportunus est, aerem, uel loca, aquasq; mutet. si caput in sole protegit, ne incendatur: ne ue subitum ex repentino nubilo frigus id moueat. Si post concoctionem ieiunus caput radit. si post cibum neq; legit, neq; scribit.

Ad solutam aluum remedia.

Caput VI.

Alui p fluxum

cibus

Potus.

q Veni uero frequenter citata aluus exercet, huic opus est pila, similibusq; superiores partes exercere: dum ieiunus est, ambulare: uitare solis nimium ardorem, continua balnea, ungi citra sudorem: non uti cibis uariis, minimeq; iurulentis, aut leguminibus, oleribus ue his, quae celeriter descendunt: omnia deniq; fugere, quae tarde concoquantur. Venatio, durisq; pisces, & ex domesticis animalibus assa caro maxime iuuant. Nunquam uinum salsum bibere expedit: ne tenue quidem, aut dulce, sed austerum, & plenius, neq; id ipsum perueniet. Si mulso uti uolet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigidae portiones uentrem eius non turbant, his utendum potissimum est. Si quid offensa in coena sensit, uomere debet: idq; postero quoq; die facere. tertio modici ponderis panem ex uino esse, adiecta uina, uel olea, uel ex defruto, similibusq; alijs: deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conuiescere: ac neq; intendere animum: neq; ambulatione quamuis leui dimoueri.

Colij dolor.

Remedia ad coli dolorem. Caput VII.

a T si laxius intestinum dolere consuevit, quod uolov nominant: cum id nihil nisi genus inflationis sit: id agendum est, ut concoquat aliquis, ut lectione et alijs generibus exerceatur: utatur balneo calido: cibus quoq; & potionibus calidis: deniq; omnimodo frigus euitet. item dulcia omnia, leguminaq; & quicquid inflare consuevit.

Quæ agenda sint stomacho laborantibus.

Caput octauum.

I quis uero stomacho laborat, legere clare debet: post
lectionem ambulare, tum pila, uel armis, alio uero quo
genere, quo superior pars mouetur, exerceri. Non
aquam, sed uinum calidum bibere ieiunus. Tum ci-
bum bis die assumere: sic tamen ut facile concoquat.

Ut uino tenui, et austero: et post cibum frigidis potionibus potius.
Stomachum autem infirmum indicant pallor, macies, præcordiorum
dolor, nausea, et uolentium uomitus. In ieiunio dolor capitis: quæ in
quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum utique nostris est:
qui cum in aduersa ualetudine uinum, aut frigidam aquam concupie-
runt, deliciarum patrociniū in acausationem non merentis stomachi
habent. At qui tarde concoquunt, et quorum ideo præcordia inflan-
tur, quine propter ardorem aliquem noctu sitire consuerunt, antequam
conquiescant, duos tres uel cyathos per tenuem fistulā bibant. Prodest
et aduersus tardam concoctionem clare legere: deinde ambulare: tum
uel ungere, uel lauare assidue: uinum frigidū bibere: et post cibum ma-
gnam potionem, sed, ut supra dixi, per syphonem. deinde omnes po-
tiones aqua frigida includere. Cui uero cibus accit, is ante eum bibe-
re aqua egelidam debet, et uomere. At his, cui ex hoc frequēs deiectio
incidit, quotiens aluus ei consiterit, frigida potione potissimū utatur.

Quid obseruandū sit dolore nervorū laborantibus. Caput nonum.

I cui uero dolere nervi solent, quod in podagra, chi-
ragra uel esse consuevit, huic quantū fieri potest, exer-
cendum id est quod affectum est: obijciendumque labo-
ri, et frigori, nisi cum dolor increuit. Sub diuino quies
optima est. Venus semper inimica est. Concoctio, sicuti
in omnibus corporis affectibus, necessaria est. Cruditas enim id maxime
lædit: et quotiens offensum corpus est, uiciosa pars maxime sentit. Ut
concoctio autem omnibus uitijs occurrat: sic rursus alijs frigus, alijs
calor. Quæ sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicus
est seni, tenui, uulneri, præcordijs, intestinis, uescicæ, auribus, coxis, sat-
pulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, uulua, cerebro. Idē sum-
mam cutem facit pallidam, aridam, durā, nigram. ex hoc horrores,
tremoresque nascuntur. At prodest iuuenibus, et omnibus plenis. ere-
ctiorque mens est, et melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed at-
tenuetur. A qua uero frigida infusa præter quam capiti, etiam stomacho

stomachi
Laboris.

sig. sioude spj.
et sanj.

cui cibus accit.

Dolor nervorū

cap. 3. Frigus
cui inimicum.

fr. 3. sa
fr. 3. sa

frigus cui prodest

LIBER

prodest. Item articulis, doloribusq; qui sunt sine ulceribus. item rubi-
cundis nimis hominibus, si dolore uacant. Calor aut adiuvat omnia,
quæ frigus infestat. ite lippietes: si nec dolor, nec lachrymæ sunt. Ner-
uos quoq; q contrahuntur, præcipueq; ea ulcera, quæ ex frigore sunt.
Idem corporis colorem bonum facit: urinā mouet. si nimius est, corpus
effoeminat: nervos emollit: stomachum soluit. Minime uero aut frigus,
aut calor tuta sunt: ubi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolo-
res, aliq; uitia, frigida aqua strumas excitat. Calor cōctionem pro-
hibet: somnum aufert: sudorem digerit: obnoxium morbis pestilenti-
bus corpus effiat.

Observatio in pestilentia. caput. x.

St etiā observatio necessaria, qua quis in pestilentia
utatur adhuc integer: cum tñ securus esse non possit.
e Tum igitur oportet peregrinari: navigare. Vbi id nō
licet, gestari: ambulare sub diuo ante æstum leniter: co-
demq; modo ungi: & ut supra cōprehensum est, ui-
tare fætigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoq; ma-
gis se continere, si qua grauitas in corpore est. Tñ neq; mane surgen-
dum, neq; pedibus nudis ambulandum est. minimèq; post cibum aut
balneum. neq; ieiunio, neq; cœnato uomendum est. neq; mouenda alius:
atq; etiā si per se mota est, cōprimenda est. Abstinentum potius si
plenus corpus est. Itemq; uitandum balneum, sudor, meridianus som-
nus utiq; si cibus quoq; antecessit: qui tamen semel die tunc commodius
assumitur: insuper etiā modicus, ne cruditatem moueat. Alternis die-
bus inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est. quibus serua-
tis, ex reliqua uictus cōsuetudine quàm minimum mutari debet. Cum
uero hæc in omni pestilentia facienda sint: tum in ea maxime, quam
Austri excitariunt. Atq; etiā peregrinantibus eadem necessaria sunt,
ubi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus: uel ubi in graues
regiones uenerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit: utiq; abstinere
debebit. Atq; ita à uino ad aquam, ab hac ad uinum eo, qui supra
positus est modo, transitus ei esse.

LIBER SECVNDVS.

*N*stantis autem aduersæ ualitudinis signa complura sunt: in quibus explicandis non dubitabo authoritate antiquorum uirorum uti, maximeq; Hippocratis: cum recentiores quoq; medici, quamuis quædam in curationibus mutarint: tamen hæc illum optime præfagisse fateantur.

*S*ed antequam dico quibus præcedentibus morborum timor subit: non alienum uidetur exponere, quæ tempora anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora maxime tuta, uel periculis opportuna sint: quod genus aduersæ ualitudinis in quoq; timeri maxime possit. Non quo non omni tempore, in omni tempestatum genere, omnis ætatis, omnis habitus hominum per omnia genera morborum & ægrotent, & moriantur: sed quod frequentius, tamen quædam eueniant. Ideoq; utile est scire unūquēq; quid, & quando maxime caueat.

Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora uel tuta, uel morbis oportuna sunt: & quod ualitudinis genus in quoq; timeri possit. Caput. I.

*C*itur saluberrimum uer est: proxima deinde ab hoc hyems: periculosior æstas. autumnus longe periculossimus. Ex tempestatibus uero optimæ æquales sunt, siue frigida, siue calida: pessimæ, quæ uariant maxime. quo fit ut autumnus plurimos opprimat.

*N*am ferè meridianis temporibus calor: nocturnis atq; matutinis, simulq; etiam uestertinis frigus est. Corpus ergo & æstate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tempore id maxime fit: sic quodocunq; euenit, noxium est. Vbi æqualitas aut est: tamen saluberrimi sunt sereni dies: meliores pluuij, quam tantum nebulosi, aut nubili: optimiq; hyeme, q̄ omni uento uacant: æstate, quibus Fauonij perflant. Si genus aliud uentorū est, salubriores septentrionales, q̄ subsolani, uel austri sunt. sic tamē ut hæc interdum regionum sorte mutantur. Nam ferè uentus ubiq; à mediterraneis regionibus ueniens salubris, à mari grauis est. Neq; solū in bono tempestatum habitu certior ualitudo est: sed priores morbi quoq; si qui inciderunt, leuiores sunt: & promptius finiuntur. Pessimum ergo celiū est, q̄ ægrum fecit: adeo ut in id quoq; genus, quod natura peius est in

Aurelij Cor.

b iij

mt. 3 29.

mt. 3 28.

LIBER

hoc statu, salubris mutatio sit. At ætas media tutissima est: quæ neq;
 iuuentæ calore, neq; senectutis frigore infestatur. Longis morbis se=
 nectus, acutis adolescentia magis patet. Corpus autem habilissimum
 quadratum est, neq; gracile, neq; obesum. Nam longa statura ut in iu=
 uenta decora est: sic matura senectute conficiatur. gracile corpus,
 infirmum, obesum, hebes est. Vere tamen maxime quæcunq; humoris
 motu nouantur, in metu esse consuerunt. ergo tum lippitudines, pustu=
 læ, profusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀποσμήματα græci nomi=
 nant: bilis atra, quam μελανχολία appellat: insania, morbus comi=
 tialis, angina, grauedines, destillationes oriri solent. hi quoq; morbi, q;
 in articulis, nervisq; modo urgent, modo quiescunt: tum maxime et
 inchoantur, et repetunt. At æstus non quidem uacat plerisq; ab his
 morbis: sed adiicit febres, uel continuas, uel ardentes, uel tertianas, uo=
 mitus, alui deiectiones, auricularum dolores, ulcera oris, cancri, et in
 cæteris quidem partibus, sed maxime obscenis: et quicquid sudore
 hominem resoluit. uix quicquam ex his in autumnum non incidit:
 sed oriuntur eo quoq; tempore febres incertæ: lienis dolor, aqua in=
 tercutem, tabes, quam græci φθίσις nominant: urinæ difficultas, quam
 σπάρτυρις appellat: tenuioris intestini morbus, quem ἰλεός nomi=
 nant. Fit item lenitas intestinorum, quæ λειψτερία uocatur: coxæ dolo=
 res: morbi comitiales. Idemq; tempus, et diutinis malis fatigatos, et
 ab æstate tantum proxima pressos interimit: et alijs nouis morbis
 conficit: et quosdam longissimis implicat, maximeq; quartanis: quæ
 per hyemem quoq; exercent. Neq; aliud magis tempus pestilentie
 patet: cuiuscuq; ea generis est, quamuis uarijs rationibus nocet. Hyems
 autem capitis dolores, tussim, et quicquid in faucibus, in lateribus, in
 uisceribus mali contrahitur, irritat. Ex tempestatibus Aquilo tussim
 mouet: fauces exasperat: uentrem astringit: urinam supprimit: hor=
 rores excitat: item dolores lateris, et pectoris. Sanum tamen corpus
 spissat, et mobilius, atq; expeditius reddit. Auster aures hebetat: sen=
 sus tardat: capitis dolores mouet: aluum soluit: totum corpus efficit he=
 bes, humidum, languidum. Cæteri uenti quo uel huic, uel illi propio=
 res sunt: eo magis uicinos his, illis uel affectus faciunt. Deniq; omnis ca=
 lor, et iecur, et lienem inflammat: mentem hebetat: ut anima defi=
 ciat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus, modo nervorum distentio=
 nem, modo rigorem infert. Illud σπασμὸς, hoc τένταρος græce nomi=
 natur: nigritem in ulceribus, horrorem in febribus excitat. In siatit=
 tibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinæ difficultas, articulo=
 rum dolores oriuntur. Per imbres longæ febres, alui deiectiones,
 angina, cancri, morbi comitiales, resolutio nervorum, quam τρεπίλυ-

Tempus

Ald

consistit . *et* græci nominant . Neq; solum interest quales dies sint: sed etiam quales ante præcesserint . Si hyems sicut septentrionales uentos habuit, uer autem austros, & pluuias exhibet: ferè subeunt lippitudines, tormina, febres, maximeq; in mollioribus corporibus: ideoq; præcipue in mulieribus . Si uero Austri, pluuiæq; hyemem occuparunt: uer autem frigidum, & siccum est: grauidæ quidem foeminae, quibus tum adest partus, abortu periclitantur . hæ uero quæ gignunt, imbecillos, uixq; uitaes edunt . cæteros lippitudo arida, & si seniores sunt, grauedines, atq; destillationes male habent . At si à prima hyeme Austri ad ultimum uer continuarunt: laterum dolores, & insania febricitantium, quam *peritiv* appellant, quam celerime rapiunt . *Ubi* primo calor à primo uere orsus, æstatem quoq; similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi . At si siccæ æstas Aquilones habuit: autumno uero imbres, Austriq; sunt: tota hyeme, quæ proxima est, tæssis, destillatio, raucitas, in quibusdam etiam tabes oriuntur . *Sin* autem autumnus quoq; æq; siccus hisdem Aquilonibus perflatur: omnibus quidem mollioribus corporibus, inter quæ muliebria esse proposui: secunda ualetudo contingit . durioribus uero instare possunt & aridæ lippitudines, & febres partim acutæ, partim longæ, & hi morbi: qui ex atra bile nascuntur . Quod ad ætates uero pertinet: pueri, proximiq; his, uere optime ualent: & æstate prima tutissimi sunt . Senes æstate, & autumnus prima parte: iuuenes hyeme: quiq; inter iuuetam, senectutemq; sunt . inimicior senibus hyems: æstas adolescentibus est . Tum si qua imbecillitas oritur, proximum est ut infantes, tenerosq; adhuc pueros serpentia ulcera oris, quæ *apbas* græci nominant, uomitus, nocturnæ uigiliae, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerceant . Propria etiam dentientium, ganguarumq; exulcerationes, distentiones neuorum, febriculæ interdum, alui deiectiones, maxillæq; caninis dentibus orientibus male habent . quæ pericula plenissimi cuiq; sunt: & cui maxime uenter astrictus est . At ubi ætas paulum prociessit: glandulæ, & uertebrearum, quæ in spina sunt: aliquæ inclinationes, strumæ, uerrucarum quædam genera dolentia, (*αποχρησμός* græci appellant) & plura alia tubercula oriuntur . Incipiente uero iam pube ex hisdem multæ, & longæ febres: sanguinis ex naribus cursus . maximeq; omnis pueritia primum circa quadragesimum diem, deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur . Si qua etiam genera morborum in infantem inciderunt: ac neq; pubertate, neque primis coitibus, neq; in foemina pri-

f. 3211.

a 12

a 6

a 13

a 14

a 24

25.

26.

27

LIBER

mis menstruīs finita sunt: ferē longa sunt. Sæpius tamen morbi pueri-
 les, q̄ diutius manserunt: terminantur. Adolēcentia morbis acutis, itē
 comitialibus, tabiq̄ maxime obiecta est: ferēq̄ iuuenes sunt, qui sangui-
 nem expuunt. Post hanc ætatem laterum, & pulmonis dolores, lethar-
 gus, cholera, insania, sanguinis per quædam etiam uelut ora uena-
 rum (αἱμορροΐδας græci appellant) profusio. In senectute spiritus, &
 urinæ difficultas: grauedo articularum, & renum dolores: nervorum
 resolutiones: malus corporis habitus (καχεξία græci appellant): no-
 cturnæ uigiliæ: uitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præ-
 cipueq̄ soluta aliis: et quæ sequuntur hæc tormina: uel leuitas intesti-
 norum, cæteraq̄ fusi uetris mala. Præter hæc graciles: tabes, deiection-
 nes, destillationes, item uiscerū, & laterum dolores fatigant. Obesi ple-
 runq̄ acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur: subitoq̄
 sæpe moriuntur. quod in corpore tenuiore uix euenit.

De notis aduersæ ualetudinis futuræ. Caput. II.

Nte aduersam autem ualetudinē, ut supra dixi, quæ-
 dam notæ oriuntur, quarū omnium commune est, ali-
 ter se corpus habere, atq̄ consuevit: neq̄ in peius tan-
 tum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, &
 speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere
 bona sua debet. quæ quia neq̄ in eodem habitu subsistere, neq̄ ultra
 progredi possunt: ferē retro quasi ruina quadam reuoluntur. Peius
 tamen signum est ubi aliquis contra consuetudinem emacruit, & colo-
 rem, decoremq̄ amisit. quoniam in his quæ superant, est quod mor-
 bus demat: in his quæ desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præ-
 ter hæc protinus timeri debet, si grauiora membra sunt: si crebra
 ulcera oriuntur: si corpus supra consuetudinem incaluit: si grauior
 somnus pressit: si tumultuosa somnia fuerunt: si sæpius expergitur
 aliquis q̄ assuevit: deinde iterū soporatur. si corpus dormientis circa
 partes aliquas contra consuetudinē insudat: maximēq̄ circa pectus,
 aut ceruices, aut crura, uel genua, uel coxas. Itē si marcet animus: si lo-
 qui, & moueri piget. si corpus torpet: si dolor præcordiorū est, aut to-
 tius pectoris: aut qui in plurimis euenit capitis: si saliuæ plenum est
 os: si oculi cum dolore uertuntur: si tēpora astricta sunt: si membra
 inhorrescunt: si spiritus grauior est: si circa frontem intentæ uenæ mo-
 uentur: si frequentes oscitationes: si genua quasi fatigata sunt: totum uē
 corpus lassitudinē sentit. Ex quibus sæpe plura, nunq̄ non aliqua fe-

brem antecedunt. In primis tamen illud considerandū est, nunquid
sepius horum aliquid eueniat: ac ideo neq; corporis ulla difficultas
subsequatur. Sunt enim quædam proprietates hominum, sine quarū
notitia non facile quicquam in futurum præfagiri potest: Facile itaq;
securus est in his aliquis, quæ sæpe sine piculo euasit. Ille solitari de
bet, cui hæc noua sunt: aut q̄ ista nunq̄ sine custodia sui, tuta habuit.

Prognosticus long.

Quæ bona in ægrotantibus signa sint. Caput III.

Bi uero febris aliquem occupat: scire licet non peri-
clitari, si in latus, aut dextrum, aut sinistrum, ut ipse
uifum est, cubat: cruribus paulū reductis: qui ferè sanū
quoq; iacentis habitus est: si facile conuertitur: si nocte
dormit: si interdū uigilat: si ex facili spirat: si nō cō-
flictatur: si circa umbilicum, & pubem cutis plana est: si præcordia
eius sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraq; pte sunt. quod
si paulo tumidiora sunt: sed tamen digitis cedunt, & nō dolent: hæc
ualetudo, ut spaciū aliquod habebit: sic tuta erit. Corpus quoq; quod
æqualiter molle, & calidum est: quodq; æqualiter totum insudat: &
cuius febricula eo sudore finitur: securitatem pollicetur: quando iam
ad sanitatem uenit corpus. Sternutamentum etiā inter bona indicia est.
Et cupiditas cibi uel à primo seruata, uel etiam post fastidium orta.
neq; terrere debet ea febris, quæ eodem die finita est: ac ne ea quidē,
quæ quamuis longiore tempore euasit: tamen ante alterā accessio-
nem ex toto quieuit sic, ut & corpus integrum, quod æliupivēs græci
uocant, fieret. si quis aut incidit uomitus, mixtus esse et bile, & pitui-
ta debet: & in urina subsidere album: leue, æquale sic, ut etiam si
quæ quasi nubeculæ innatarint: in imum deferantur. At uenter ei qui
à periculo tutus est, reddit modo mollia figurata eodē ferè tempore,
quo secunda ualetudine assueuit: modo conuenientia his quæ assumun-
tur. peior citā alius est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet: si
matutinis temporibus coacta magis est: aut si procedente tempore pau-
latim contrahitur, & ruffa est: neq; foeditate odoris similem alium
sanī hominis excedit. Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine morbi de-
scendisse nihil nocet. si inflammatio in superioribus partibus dolorē,
tumoremq; fecit, bonum signum est. sonus uentris inde ad inferio-
res partes euolutus, magisq; etiam si sine difficultate cum stercore
excessit.

LIBER

Mala signa ægrotantium. Caput. IIII.

Contra grauius morbi periculum est: ubi supinus æger
 iacet porrectis manibus, & cruribus. ubi residere
 c nult in ipso acuti morbi impetu, præcipueq; pulmo
 nibus laborantibus. ubi nocturna uigilia premitur:
 etiam si interdum somnus accedit. Ex quo tamen peior
 est, qui inter quartam horam, & noctem: q̄ qui matutino tempore ad
 quartam. Pessimum tamen est si somnus neq; noctu, neq; interdum acce
 dit. id enim ferè sine continuo dolore esse non potest. Aeq; uero signū
 malum est etiam somno ultra debitum urgeri: peiusq; quo magis se
 sopor interdum, noctuq; continuat. Mali etiam morbi testimonium est
 uehementer, & crebro spirare: à sexto die cœpisse inhorrescere: plus
 expuere: uix excreare: dolorē habere continuū: difficulter ferre mor
 bum: iactare brachia, & crura: sine uoluntate lachrymare: habere
 humorem glutinosum dentibus inhaerentem: cutē circa umbilicum, et
 pubem macram: præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, inten
 ta: magisq; si hæc dextra parte, q̄ sinistra sunt: periculosissimum ta
 men est: si uenæ quoq; ibi uehementer agitantur. Mali et morbi signū
 est, nimis celeriter emacrescere: caput, et pedes, manusq; calidas habe
 re: uentre, & lateribus frigentibus, aut frigidis extremas partes ac
 to morbo urgente: aut post sudorem inhorrescere: aut post uomitū sin
 gultum esse: uel rubere oculos: aut post cupiditatē cibi, post uel longas fe
 bres hūc fastidire: aut multū sudare, maximeq; frigido sudore: aut ha
 bere sudores non per totum corpus æquales, quiq; febrem non fini
 ant: & cas febres, quæ cotidie tempore eodē reuertantur: quæ uel sem
 per per pares accessiones habeant: neq; tertio quoq; die leuentur, quæ uel
 continent, ut per accessiones increuant: per discessiones tantum mol
 liantur: nec unquam integrum corpus dimittant. Pessimum est si ne le
 uatur quidem febris: sed æque concitata continuat. Periculosum est
 etiam post arquatum morbū febrem oriri, utiq; si præcordia dextra
 parte dura manserunt: ac dolentibus his leua. Nulla acuta febris leui
 ter terrere nos debet. neq; unquam in acuta febre, aut à somno non
 est terribilis neruorum distentio timere et ex somno, mali morbi est.
 Itemq; in prima febre protinus mentem esse turbatam: membrum uel
 aliquod esse resolutum. ex quo casu quamuis uita redditur: tamen id
 ferè membrum debilitatur. Vomitus etiam periculosus est sinceræ pi
 tuitæ uel bilis: peiorq; si uiridis, aut niger est. At mala urina est, in
 qua subsidunt uel rubra, aut liuida, deterior, in qua quasi fila quædā
 tenuia, atq; alba. pessima ex his, si tanq̄ ex furfuribus factas nubeculæ

las representat. diluta quoq; atq; alba vitiosa ē: sed in phreniticis maxime. Alius aut mala est ex toto suppressa. Periculosa etiā quæ inter febres fluens, conuiescere hominem in cubili non patitur: utiq; si quod descendit est perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans. Præter hæc periculum ostendit id quod excernitur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idemq; subpallidum: uel si est aut liuidum, aut biliosum, aut cruentum, aut peioris odoris, quàm ex consuetudine. Malum est etiā, quod post longas febres sincerum est.

De signis longæ ualeitudinis. Caput. V.

Post hæc inditia notum est longum morbum fieri. sic enim neesse est: nisi occidit. Neq; ulla alia spes in malis magnis est: q̃ ut impetum morbi trahendo, aliquis effugiat: porrigaturq; in id tempus, quod curationi locum præstet. Propterea tñ signa quedam sunt: ex quibus colligere possumus morbum & si non interemerit: longus tñ tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non a ritas circa caput tantum, & ceruices oritur: aut ubi febre non quiescente corpus insudat: aut ubi corpus modo frigidum, modo calidum est, & color alius ex alio fit: aut ubi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatē nō peruenit: aut ubi æger pro spacio parum emacrescat. Itē si urina modo liquida, et pura est: modo habet quædā subsidētia: si leuia, atq; alba, rubraue sunt, quæ in ea subsident: aut si quasdā quasi maculas representat: aut si bullulas excitat.

De indicijs mortis. Caput. VI.

Sed inter hæc quidem proposito metu spes tamen superest. Ad ultima uero iam uentum esse, testantur nares acutæ, collapsa tempora, oculi conuulsi, frigida, languideq; aures, & in his partibus leniter uersæ: cutis circa frontem dura, et intentæ: color aut niger, aut per pallidus: multoq; magis si ita hæc sunt: ut neq; uigilia præesserit, neq; uentris resolutio, neq; inedia. Ex quibus causis interdum hæc species oritur: sed uno die finitur. Itaq; diutius durans, mortis index est. Si uero in morbo uetere iam triduo talis est: in propinquo mors est: magisq; si præter hæc oculi quoq; lumen refrigerant et illachrymant: quæq; in his alba esse debent, rubescunt: atq; in hisdem uenulæ pallent: pituitaq; in his innatas nouissime angulis indurescit: alterq; ex his maior est: hiq; aut uehementer subsederunt: aut facti tumidiore sunt.

perq; somnum palpebræ non cōmittuntur: sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet: neq; id fluens alius expressit: eademq; palpebræ pallent: & idem pallor labra, et nares decolorat. eademq; labra, & nares, oculiq; et palpebræ, et supercilia, aliqua'ne ex his peruertuntur: isq; propter imbecillitatem iam non audit: aut non uidet eadem: mors denuntiatur. Vbi ægri supini cubant: hisq; genua contra cta sunt: ubi deorsum ad pedes subinde delabitur: ubi brachia, & crura nudat, & inæquabiliter dispergit: neq; his calor subest: ubi hiat: ubi assidue dormit: ubi his qui mentis suæ non est: neq; id facere sanus solet: dentibus stridet: ubi ulcus quod aut ante, aut in ipso morbo natum est: aridum, & aut pallidum, aut liuidum factum est. Illa quoq; mortis indicia sunt: unguis, digitiq; pallidi: frigidus spiritus: aut si manibus quis in febre, & acuto morbo uel insania, pulmonis ue dolore, uel capitis, in ueste floccos legit: fimbrias'ue diducit: uel in adiuncto pariete si qua minuta eminent: carpit. Dolores etiam circa coxas, et inferiores partes orti, si ad uiscera transierunt: subitoq; desierunt: mortē subesse testantur: magisq; si alia quoq; signa accesserunt. Neq; is seruari potest, qui sine ullo tumore febricitans, subito stragulatur: aut deuorare salinam suam non potest. Cui'ue in eodem febris, corporisq; habitu ceruix conuertitur: sic ut deuorare æque nihil possit: aut cui simul & continua febris, & ultima corporis infirmitas est: aut cui febre non quiescente exterior pars friget: interior sic calet: ut etiam sitim faciat: aut qui febre æque non quiescente: simul & delirio, & spirandi difficultate uexatur: aut qui epoto ueratro exceptus distentione neruorum est: aut qui ebrius obmutuit: is enim febre, adiecta neruorum distentione consumitur: nisi aut febris accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solui debet, loqui cepit. Mulier quoq; grauida acuto morbo facile cōsumitur: & is, cui somnus dolorem auget: & cui protinus in recenti morbo bilis atra, uel infra, uel supra se ostendit: cui'ue alterutrum modo se prompsit: cum iam longo morbo corpus eius esset extenuatum, et affectum. sputum ēt bilicū, & purulentum, siue separatim ista, siue mixta proueniunt: interitus periculū ostendunt. Ac si circa septimum diē tale esse cōpit: proximū est ut is circa quartumdecimum diem deccdat: nisi alia signa meliora, peiora'ue accesserint. quæ quo leniora, grauiora'ue subsēcuta sunt: eo uel seriore mortem, uel maturiorem denunciant. Sudor quoq; frigidus in acuta febre pestiferus est. atq; in omni morbo uomitus: qui uariis, & multorum colorum est: præcipueq; si malus in hoc odor est. Ac sanguinē quoq; in febre uomuisse pestiferum est. Urina uero rubra, & tenuis in magna cruditate esse cōsuevit: & sæpe antequam spacio

mature scat, hominem rapit. Itaq; si talis diutius permanet, periculi mortis ostendit. Pessima tamen est, præcipueq; mortifera, nigra, crassa, mali odoris: atq; in uiris quidem, & mulieribus talis deterrima est. In pueris uero, quæ tenuis, & diluta est. Alius quoq; uaria pestifera est: quæ strigmentū, sanguinem, bilem uiridem, aliquid modo diuersis temporibus, modo simul: & in mixtura quadam discreta tamen re= presentat. Sed hæc quidem potest paulo diutius trahere. In præcipiti uero iam esse denunciat quæ liquida: eademq; uel nigra, uel pallida, uel pinguis est: utiq; si magna foeditas odoris accessit. Illud interrogari me posse ab aliquo scio, si certa futurae mortis indicia sunt: quomodo interdum deserti à medicis conualescant: quosdamq; fama proderit in ipsis funeribus reuixisse. Quinetiam uir iure magni nominis Democritus, ne finita quidē uitæ satis certas notas esse proposuit, quibus medici credidissent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa futurae mortis essent: aduersus quos, ne dicam illud quidem, quod in uicino sæpe quædam notæ positæ non bonos, sed imperitos medicos decipiunt: quod Asclepiades funeri obuius intellexit eum uiuere, qui efferebatur: ne protinus crimen artis esset, si quod professoris sit: illa tamen moderatius subiiciam. Coniecturalē artem esse medicinam, rationemq; coniecturæ talem esse: ut cum sæpius aliquando responde rit, interdum tñ fallat nos. Si quid itaq; uix in millesimo corpore ali quādo decipit: id notā nō habet, cum per innumerabiles homines re spondeat. Idq; non in his tantum, quæ pestifera sunt, dico: sed in his quoq; quæ salutaria. Si quidem etiam spes interdum frustratur: & moritur aliquis, de quo medicus securus primo fuit. Quæq; medendi causa reperta sunt, non nunquam in peius aliquid conuertunt. Neq; id evitare humana imbecillitas in tanta uarietate corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides, quæ multo sæpius, perq; multo plures ægros prodest. Neq; tamen ignorare oportet in acutis morbis fallaces magis notas esse & salutis, & mortis.

De notis, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit.
Caput sextum.

¶ Ed cum proposuerim signa quæ in omnia aduersa ua litudine cōia esse consuerunt: ea quoq; trāsibo, ut quas aliquis in singulis morborū generibus habere possit notas, indicē. Quædā aut sunt, quæ an febres, quæ dam, quæ inter eas quid aut intus sit, aut uenturum sit, ostendunt. Ante febres, si caput graue est: aut ex somno oculi cali-

gant: aut frequētia sternutamenta sunt: circa caput aliquis pituita im-
petus timeri potest. Si sanguis, aut calor abundat: proximum est, ut ali-
qua parte profluvium sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit:
ne in malum habitum corpus eius recidat, metus est. Si præcordia do-
lent: aut inflammatiō grauis est: aut non toto die concocta fertur urina:
cruditas esse manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio ma-
lus est: hi uel capitis doloribus cōsistuntur: uel terrā edunt. Qui diu
habent faciem pallidam, & tumidam: aut capite, aut uisceribus, aut
alio laborant. Si in cōtinua febre puero ueter nihil reddit, mutaturq;
ei color: nec somnus accedit: ploratq; is assidue: metuenda nervorū di-
stentio est. Frequens aut desillatio in corpore tenui, longq; tabem ti-
mendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non descendit aluus, docet
aut subitam deiectionē, aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, lon-
gæ deiectiones sunt. Vbi dolor in imo uentre et icōxis est, aqua inter-
cutis instat. sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem propositū
periculum est his, quibus uoluntas desidendi est: uenter nihil reddit,
nisi & ægre, & durū: tumor in pedibus est. idemq; modo dextra,
modo sinistra parte uentris inuicē oritur, atq; finitur. sed à icinore
id malum proficisci uidetur. eiusdem morbi nota est. Vbi circa um-
bilicum intestina torquentur (σπόρον græci nominant) coxæq; dolores
manent: eaq; neq; tempore, neq; remedijs soluantur. Dolor aut arti-
culorum, pro ut in pedibus, manibus'ue, aut alia qualibet parte sic
est, ut eo loco nervi contrahantur: aut si id membrum ex leui causa
fatigatum, æq; frigido, calidoq; offenditur: podagrā, chiram'ue, uel
eius articuli, in quo id sentitur, morbū futurum esse denuntiat. Qui-
bus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit: hi uel ca-
pitis doloribus cōsistentur necesse est: uel in articulis aliquas exulce-
rationes graues habeant: uel aliquo morbo etiam debilitentur. Qui-
bus fœminis menstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi
dolores sint: uel quelibet alia pars morbo infistetur. Eademq; his
pericula sunt, quibus articularum uicia dolores, tumoresq; sine poda-
gra, similibusq; morbis oriūtur, & desinunt. Vtiq; si sæpe tempora
hisdem dolent: noctuq; corpora insudant: si frons prurit, lippitudi-
nis metus est. Si mulier à partu uehementes dolores habet: neq; alia
præter ea signa mala sunt: circa uigesimum diem aut sanguis per na-
res erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicūq;
etiam dolorem ingentem circa tempora, & frontem habebit: is alte-
rutra ratione eum finiet, magisq; si iuuenis erit, per sanguinis pro-
fusionem: si senior, per suppurationem. Febris aut quæ subito sine ra-
tione sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine, et

interdum, & noctu replentur sic, ut neq; capitis dolores, neq; præcordiorum, neq; tussis, neq; uomitus, neq; febricula præcesserit: huius aut in naribus, aut in faucibus ulcus reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est: neq; causa apparet, ulcus in vulua est. Vrina autem crassa, ex qua quod desidet, album est: significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumq; morbi esse. Eadem viridis, aut viscerum dolorem, tumoremq; cum aliquo periculo subesse: aut certe corpus integrum non esse testatur. At si sanguis, aut pus in urina est: uel uesica, uel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa carunculas quasdam exiguis quasi capillos habet: aut si bullat, aut si male olet: & interdum quasi harenam, interdum quasi sanguinem trahit: dolent autem coxæ: quæq; inter has, superq; pubem sunt: & accedunt frequentes ructus: interdum uomitus biliosus, extremæq; partes frigesunt: urina crebra cupiditas, sed magna difficultas est: & quod inde excrementum est, aquæ simile uel rufum, uel pallidum est: paulum tamen in eo leuamenti est: alius uero cum multo spiritu redditur: utiq; in renibus uitium est. Aut si paulatim destillat: uel si sanguis per hanc editur, & in eo quedam cruenta concreta sunt, idq; ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem uesica uitium est. Calculosi uero his indicij cognoscuntur. Difficiliter urina redditur: paulatimq; interdum etiam sine uoluntate destillat. Eadem harenosa est: nonnunq; aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excrentur. Eamq; quidam promptius recti, quidam resupinati: maximeq; hi qui grandes calculos habent: quidam etiam inclinati reddunt: colemq; extendendo, dolorem leuant. Grauitatis quoq; cuiusdam in ea parte sensus est: atq; ea cursu, omniq; motu augentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis uicibus implicant. Fœminæ uero oras naturalium suorum manibus admotis scalpere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admoerunt, ubi uesicæ cernicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone uicium est. Mulieri grauidæ sine modo fusa alius elidere partu potest. Eidem si lac ex mæmbris profluit, imbecillum est, quod intus gerit. duræ mæmbræ sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit: uel distentio neruorum, uel rigor timeri potest. At si à priore parte id euenit: uel lateris acutus dolor, uel insana expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora uenarum sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt: aut aqua

LIBER

intercutis aut tabes sequitur: eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari nō potuit. At si longa tristitia cum longo timore, et uigilia est: atræ bilis morbus subest. Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet: aut capitis dolores sunt: quos sequitur, ut quædam ante oculos tanquam imagines obuerfentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivæ malæ sunt: et os olet: aut sanguis aliqua parte prorumpit. quorum si nihil evenit, necesse est in cruribus mala ulcera, et ex his nigra cicatrices fiant. Quibus causa doloris neq; sensus eius est, his mens labat. Si in uentre sanguis confluit: ibi in pus uertitur. Si à coxis, et ab inferioribus partibus dolor in pectus transit: neq; ullum signum malum accessit: supurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cū rubore, aut calore est: ibi aliquid suppurat. Vrina quoq; quæ in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationē esse denunciat. Hæc uero cum sine febre quoq; uel latentium, uel futurarum rerū notis habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit: atq; etiam aliorū morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est: ubi expeditior alicuius, q̃ sani fuit sermo est: subitaq; loquacitas orta est: et hæc ipsa solito audacior. aut ubi raro quis, et uehementer spirat: uenasq; concitatas habet, præcordiis duris, et tumentibus. Oculorū quoq; frequens motus, et in capitis dolore offusæ oculis tenebræ: uel nullo dolore substante somnus ereptus, continuataq; nocte, et die uigilia: uel prostratum contra consuetudinem corpus in uentrem sic, ut ipsius alui dolor id non coegerit. Item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor, insaniæ signa sunt. Siquid etiam abscessit: et anteq̃ suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculū affert primum furoris, deinde interitus: auris quoq; dolor acutus cū febre continua, uehementiq; sæpe mentem turbat: et ex eo casu iuniores interdum intra septimum diē moriuntur: seniores tardius. quoniam neq; æque magnas febres experiuntur: neq; æque insaniunt: ita sustinent, dum his affectus intus uersatur. Suffusæ quoq; sanguine mulieris mammæ, furorem uenturum esse testantur. Quibus autē longæ febres sunt: his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his neruorū distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit: idq; sæpe intra septimum diem occidit: quod nisi incadat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionē, tormina. Post hæc intestinorum leuitas oritur. Post nimias destillationes, tabes. post lateris dolores, uitia pulmonam. post hæc, insania. Post magnos feruores corporis, neruorum rigor, aut distentio. Vbi

distentio. ubi caput vulneratum est, delirium. ubi uigilia torset, nervorum distentio. ubi uehementer uenæ super ulcera mouentur: sanguinis profluvium erit. suppuratio uero pluribus morbis excitatur. Nā si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent: in aliquā partem id malum incumbit, in iunioribus tamen: nam in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante uigesimum diem hominē non sustulerunt: neq; sanguis ex naribus fluxit, maximeq; in adolescentibus. utiq; si inter principia aut oculorū caligo, aut capitis dolores fuerunt: sed cum inferioribus partibus aliquid abscessit. aut si præcordia tumorem mollem habent: neq; habere intra sexaginta dies desinunt: hæretq; per omne id tempus febris. Sed tum in superioribus partibus fit abscessus: ac si inter ipsa ulcera nō fuit: circa aures erumpit. Cumq; omnis longus tumor ad suppurationem ferè spectet: magis se tendit is, qui in præcordijs, q̄ is qui est in uentre: & is qui supra umbilicū, q̄ is qui infra est. si lassitudinis etiam sensus in febre est: uel in maxillis, uel in articulis aliquid abscedit. Interdum quoq; urina tenuis, et cruda sic diu fertur: ut alia salutaria signa sint. Ex quo eo casu plerunq; infra transuersum septum, quod διαφραγμα græci uocant, fit abscessus. Dolor autem pulmonis si neq; per sputa, neq; per cucurbitulas, neq; per sanguinis detractionem, neq; per uictus rationem finitus est, uomica aliquas intus excitat aut circa uigesimum diem, aut circa xxx: nonnunq; etiam circa sexagesimum. numerabimus autem ab eo die, quo primū febricitauit aliquis, aut inhorruit, aut grauitatem eius partis sensit. sed hæ uomicæ modo à pulmone, modo à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit: dolorem, inflātionemq; concitat, ipsum calidius est: et si in partem sanam aliquis decubuit: onerare eam ex pondere aliquo uidetur. Omnis etiā suppuratio quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest. si febris nō dimittit: eaq; interdum lenior est: noctu increscit: multus sudor oritur: cupiditas tussedi est: et penè nihil in tussi excreatur: oculi cæui sunt: malæ rubent: uenæ sub lingua inalescunt: in manibus fiunt adunci: ungues, digiti, maximeq; summi pallēt: in pedibus tumores sunt: spiritus difficiliter trahitur: abi fastidium est: pustulæ toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor & tussis fuit, & spiritus difficultas: uomica uel ante, uel circa uigesimum diem erumpet. si serius ista cœperint: necesse est quidem increscant. sed quo minus cito affecerint: eo tardius soluentur. Solent etiam in graui morbo pedes cum digitis, unguibusq; nigrescere. quod si non est mors consecuta, & reliquum corpus inualuit: pedes tamen decidunt.

Aurelij Cor.

c

Quæ notæ in quoq; morbi genere, uel spem, uel pericula ostendant.
Caput. VII.

Equitur ut in quoq; morbi genere proprias notæ expli-
cem: quæ uel spem, uel periculum ostendant. Ex uescia do-
lente si purulenta urina processit: inq; ea leue, & album
subsedit: metû detrahit. In pulmonis morbo si sputo ipse
leuatur dolor: quantum id purulentum est: tamen æger facile spirat: fa-
cile excreat: morbum ipsum non difficulter fert: potest ei secunda ua-
letudo contingere. Neq; inter initia terreri conuenit: si protinus sputum
mixtum est ruffo quodam, & sanguine, dummodo statim edatur. La-
terum dolores suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diē
purgata finiuntur. Si in iecinore uomica est, & ex ea fertur pus pu-
rum, & album: salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex sup-
purationibus uero hæ tolerabiles sunt: quæ in exteriorem partem fe-
runtur, et acuiuntur. Et ex his quæ intus procedunt, hæ leuior: quæ
contra se cutem non afficiunt: eamq; & sine dolore esse, & eiusdem
coloris, cuius reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoq; quacunq; par-
te erumpit: si est leue, album, & unius coloris, sine ullo metu est: &
quo effuso febris protinus conquieuit: desieruntq; urgere cibi fastidiū,
& potationis desiderium. si quando etiam suppuratio descendit in cru-
ra: sputumq; eiusdem factum pro ruffo purulentum est: periculi mi-
nus est. At in tabe eius, qui saluus futurus est: putum esse debet albū,
æquale totum: eiusdemq; coloris sine pituita: eiq; etiā simile esse opor-
tet si quid in nares à capite destillat. Longe optimum est febrem omni-
no non esse. secundum est tantulum esse: ut neq; cibum impediat, neq;
crebram sitim faciat. Alius in hac ualetudine ea tuta est: quæ cotidie
coacta: eaq; conuenientia his quæ assumuntur, reddit. Corq; us, id quod
minime tenue, maximeq; lati pectoris, atq; setosi est: cuiusq; cartilago
exigua, & carnosæ est. Super tabem si mulieri quoq; suppressa men-
strua fuerunt: et circa pectus, atq; scapulas dolor mansit: subitoq; san-
guis erupit: leuari morbus solet. Nā & tussis minuitur: et sitis atq; fe-
briculæ desinunt. sed ipsæ ferè nisi redit sanguis, uomica erumpit: quæ
quo cruentior, eo melior est. A qua autem inter cutem minime terribi-
lis est: quæ nullo antecedente morbo cœpit. deinde quæ longo morbo
superuenit. Vtiq; si firma uiscera sunt: si spiritus facilis: si nullus do-
lor: si sine calore corpus est: æqualiterq; in extremis partibus macrū
est: si uenter mollis: si nulla tussis: nulla sitis: si lingua ne per som-
num quidem inarescit: si cibi cupiditas est: si uenter medicamentis mo-
uetur: si per se excernit mollia, & figurata: si extenuatur: si urina &

Uescia

in Cru

pulmon

leues

Suppuratio

pus

tabes

lydæ

uini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & morbum facile sistinet. si quidē in quo omnia hæc sunt: is ex toto tutus ē: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum uero uitia ut podagræ, chiragræq; si iuuenes tentarunt: neq; callum induxerunt: solui possunt: maximeq; torminibus leniuntur: & ex quocunq; modo uenter fluit. Item morbus comitialis ante pubertatem ortus non ægre finitur: & in quo ab una parte corporis uenientis accessionis sensus incipit. optimum est à manibus, pedibusue initium fieri: deinde à lateribus: pessimum inter hæc à capite. Atq; in his quoq; ea maxime prosunt: quæ per deiectiones excernuntur. Ipsa autem deiectio sine ulla noxa est: quæ sine febre est: si celeriter desinit: si contracto uentre nullus motus eius sentitur: si extremam aluum spiritus sequitur. Acris tormina quidem periculosa non sunt: si sanguis, & strigmenta descendunt: dum febris, cæteræq; accessiones huius morbi absint: adeo ut etiam grauida mulier non solum reservari possit: sed etiam partum reservare. Prodestq; in hoc morbo si iam ætate aliquis processit. Contra intestinorū leuitas facilius à teneris ætatibus depellitur: utiq; si fieri urina, et aliabo corpus incipit. Eadem ætas prodest, & in coxæ dolore, & humerorum, et in omni resolutione neruorum. ex quibus coxa si sine torpore est: si leuiter friget: quantum magnos dolores habet: tamen & facile, & mature sanatur: resolutumq; membrū si nihilominus aliter fieri sanum potest: oris resolutio, etiam aluo cita finitur: omnisq; deiectio lippienti prodest. At uarix ortus, uel per ora uenarū subita profusio sanguinis, uel tormina insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas uel manus tendunt: uomitu atræ bilis soluntur. et quisquis dolor deorsum tendit: sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones supprimit uomitus. Mulier sanguinē uomens, profusis mēstruis liberatur. Quæ menstruis nō purgatur, si sanguinē, ex naribus fudit: omni periculo uacat. Quæ locis laborat: aut difficulter partū edit: sternutamento leuatur. Aestua quartana fere breuis est. cui calor, & tremor est: saluti delirium est. Lienosis bono tormina sunt. deniq; ipsa febris, quod maxime mirū uideri potest: sæpe præsidio est. nam & præcordiorum dolores si sine inflammatione sunt, finit: & in iecinoris dolore succurrit: & neruorū distentionem, rigoremq; si postea cœpit: ex toto tollit: & ex difficultate urinae morbu tenuioris intestini ortum, si urina per calorem mouet: leuat. At dolores capitis quibus oculorū caligo, et rubor cum quadā frontis prurigine accedunt: sanguinis profusione, uel fortuita, uel et petita summoventur. Si capitis, ac frontis dolores ex uento, uel frigore, aut aestu sunt: grauedine, et sternutamentis finiuntur.

c ij

arthralis

Epilepsia

Dinobis

Liquor

Liquor

Arterialis

Vas

Cephalalgia

Febrem autem ardentem, quam græci *καύσωνα* uocant: subitus horror exoluit. Si in febre aures obtusæ sunt: si sanguis e naribus fluxit: aut uenter resolutus est: illud malum desinit ex toto. Nihil plus aduersus surditatem, quam biliosa alius potest. Quibus in fistula urinæ uti mænuti apices, quos *οὐρά* græci uocant: esse cœperunt: ubi pus ea pte profluxit, sanitas redditur. ex qbus cum pleraq; per se proueniant: scire licet interea quoq; quæ ars adhibet: naturâ plurimū posse. Contra si caput febre continenti dolet: neq; quicquam reddi: malum atq; mortiferum est: maximeq; id periculum est pueris à septimo anno ad quartum decimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non fuit: deinde à septimo die cœpit, & ultra septimum mansit: periculosum est. Quantoq; magis mixtos, neq; inter se diductos colores habet: tanto deterius. et tamen nihil peius est, quam sincerum id edi: siue ruffum est, siue cruentum: siue album, siue glutinosum: siue pallidum, siue spumans. nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt tussis, destillatio, etiam quod aliâs salutare habetur, sternutamentum. Periculosissimumq; est si hæc secuta subita deiectio est. Ferè uero quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa, & asperiora esse consuerunt. Ex iecinore si pus cruentum exit: mortiferum est. At ex suppurationibus hæc pessimæ sunt: quæ intus tendunt sic, ut exteriorem quoq; cutem decolorent. Ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpunt, quæ maximæ: quæq; planissimæ sunt. Quod si ne rupta quidem uomica uel pure extrinsecus emissio febris quieuit: aut quamuis quierit: tamen repetit. item si sitis est: si cibi fastidium, si uenter liquidus, si pus est liuidum, & pallidum, si nihil æger excreat, nisi pituitam spumantem: periculum certum est. Atq; ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitant: ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores. At in tabe sputum mixtum, purulentum, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit: & siti affligit in corpore tenui: periculum subesse testatur. Si quis etiam in eo morbo diutius traxit: ubi capilli flumunt: ubi urina quædam araneis similia subsidentia ostendit: atq; in his odor foedus est: maximeq; ubi post hæc orta deiectio est: protinus moritur. Vtiq; si tempus autumnus est: quo ferè qui cætera parte anni traxerunt: resoluuntur. Itē pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo uomica, fistulaq; oriri: quæ non facile sanescunt: nisi si multa signa bonæ uoletudinis subsenta sunt. Ex reliquis uero minime facile sanantur uirgines, aut hæ mulieres: quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui uero sano subitus dolor capitis ortus est: dein somnus oppressit, sic ut stertat: neq;

tabes

neq; expergetur, intra septimum diem pereundū est: magis si cum alius cita non antecesserit. Si palpebrae dormientis non coeunt: si albus oculorum apparet. quos tamen ita mors sequitur: si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo cepit: ad sanitatem raro perducitur. utiq; si contraria his, quae supra posita sunt: subsequuntur. aequae in ea quoq; tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumq; erupit: & aqua medium corpus impleuit. Quibusdam etia in hoc morbo tumores oriuntur: deinde desinunt: deinde rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt: quam qui supra comprehensi sunt, si attenduntur. sed ferè fiducia secundae valetudinis opprimuntur. Illud iure aliquis mirabitur: quomodo quaedam simul & affligunt nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem impleuit: siue in magno abscessu multum puris coit: simul id omne effudisse aequae mortiferum est: ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli uero, qui sic dolent, ut super eos ex callo quaedam tubercula innata sint: nunquam liberantur. quaeq; eorum uicia uel in senectute ceperunt: uel in senectutem ab adolescentia peruenierunt, ut aliquando leniri possunt: sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoq; comitialis post annum quintum & uigesimum ortus aegre curatur: multoq; acrius is, qui post quadragesimum annum cepit, adeo ut in ea aetate aliquid in natura spei, uix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficitur: neq; ante in partibus aliquis uenientis mali sensus est: sed homo ex improviso concidit: cuiuscunq; is aetatis est: uix sanescit. Si uero aut mens laesa est: aut neruorum facta resolutio: medicinae locus non est. Deiectionibus quoq; si febris accessit: si inflammatio iocinoris, aut praecordiorum, aut uentris: si inmodica sitis, si longius tempus, si alius uaria, si cum dolore est: etiam mortis periculum subest. maximeq; si inter haec tormina uetera esse ceperunt. Isq; morbus maxime pueros absumit usq; ad annum decimum. ceterae aetates facilius sustinent. Mulier quoq; grauida eiusmodi casu rapi potest, atq; etiam si ipsa conuuluit, partum tamen perdit. Quin etia tormina ab atra bile orsa, mortifera sunt: aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra alius profluxit: aut intestinorum leuitas. Periculosior est si frequens deiectio est: si uenter omnibus horis, & cum somno, & sine hoc profluit: si similiter noctu, & interdum: si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum: & praeter id etiam leue, & mali odoris sit: si sitis urget: si post potionem urina non redditur: quod euenit quia tunc liquor omnis non in uesicam, sed in intestina descendit: si os exulceratur: si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distin-

Aurelij Cor.

c. iij

*Morbus arthriticus
si nodosa potugetur*

Eptia

Interdum

Tum

LIBER

guitur: si uenter est quasi fermentatus, pinguis, atq; rugosus: si & cibi cupiditas non est. Inter quæ cum euidentis mors sit, multo euidentior est: si iam longum quoq; id uitium est: maximeq; si etiã in corpore se nili est. Si uero in tenuiore intestino morbus est: uomitus, singultus, nervorum distentio, delirium: mala sunt. At in morbo arquato durũ fieri iecur perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt: deinde uersa sunt: uel in aquam inter cutem, uel intestinorum lenitatem uix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris, nisi resolutus est intra septimum diem, occidit. Mulier ex partu si cum febre uehementibus etiam, & assiduus capitis doloribus premittitur: in periculo mortis est. si dolor, atq; inflammatio est in his partibus, quibus uiscera continentur: frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est: & in ceruices, ac scapulas transit: rursusq; in caput reuertitur: aut à capite ad ceruices, scapulasq; peruenit: perniciosus est: nisi uomitam aliquam excitauit sic, ut pus extussiretur: aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit: aut nisi in capite multa prurigo, toto uero corpore pustulæ ortæ sunt. Aequè magnum malum est, ubi torpor, atq; prurigo perueniantur modo per totum caput, modo in parte: aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est: eaq; ad summam quoq; linguam perueniunt. Et cum in hisdem abscessibus auxilium sit: eo difficilior sanitas est: quo minus sæpe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ uero doloribus si uehemens torpor est: frigesctq; crus, & coxa: aliusq; nisi coacta non reddit: idq; quod excernitur, mucosum est: iamq; ætas eius hominis quadragesimum annum excessit: is morbus erit longissimus, minimeq; annuus: neq; finiiri poterit nisi aut uere, aut autumno. Difficilis æque curatio est in eadem ætate, ubi humerorum dolor uel ad manus peruenit: uel ad scapulas tendit: torporemq; & dolorem creat: neq; bilis uomitu leuatur. Quacumq; uero parte corporis membrum aliquod resolutum est: si neq; mouetur, & emacrescit: in pristinum habitum non reuertitur: eoq; minus quo uetustus id uitium est: & quo magis in corpore senili est. Omnisq; resolutioni nervorum ad medicinam non idonea tempora sunt hyemis, & autumnus. aliquid sperari potest uere, & æstate. Isq; morbus mediocris uix sanatur: uehemens sanari non potest. Omnis etiã dolor minus medicinæ pater: qui sursum procedit. Mulieri grauidæ, si subito mammæ emacruerunt: abortus periculum est. Quæ neq; peperit, neq; grauida est, si lac habet: à menstruis defecta est. Quartana æstima breuis: autumnalis ferè longa est: maximeq; quæ cœpit hyeme appropinquante. si sanguis profluxit: deinde secuta est dementia cum distensione nervorum: periculum mortis est. Itemq; si

medicamentis purgatum, & adhuc inanem, nervorum distentio oppres-
sit: aut si in magno dolore extremæ partes frigent: neq; is ad vitam
redit: qui ex suspendio spumante ore detractus est. Alius nigra san-
guini atro similis repentina siue cum febre, siue etiam sine hac, per-
niciosa est.

De morborum curationibus. Caput. VIII.

Ognitis inditijs, quæ nos uel spe consolentur: uel metu ter-
reant: ad curationes morborum transeundum est. Ex his
quædam cões sunt: quædam propriæ. cões, quæ pluri-
bus morbis opitulantur. propriæ, quæ singulis. ante de
communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed
sanos quoq; sustinent: quædam in aduersa tantum ualitudine adhiben-
tur. Omne uero auxilium corporis aut demit aliquam materiam:
aut adiut: aut euocat: aut reprimat: aut refrigerat: aut calefacit: si-
mulq; aut durat: aut mollit. Quædam non uno modo tantum, sed et
duobus inter se non contrarijs adiuuant. Demitur materia sanguinis
detractione, cucurbitula, deiectione, uomitu, frictiõ, gestatione, omniq;
exercitatione corporis, abstinentia, sudore: de quibus protinus dicam.

*Cogitatio Spæ
curationis. Gal.*

De sanguinis detractiõne per uenas. Caput. IX.

Anguinem incisa uena mitti nouum non est. sed nullum
pene morbum esse, in quo non mittatur: nouum est. Item
mitti iunioribus, & foeminis uterũ non gerentibus, uetus
est. In pueris uero idẽ experiri, & in senioribus, & in
gravidis quoq; mulieribus uetus non est: si quidẽ antiqui primam, ul-
timamq; ætatem sustinere non posse hoc auxiliij genus indicabant: per-
suaserantq; sibi mulierem gravidã, quæ ita curata esset: abortum esse
facturã. Postea uero usus ostendit nihil ex his esse perpetuum: aliasq;
potiores obseruationes adhibendas esse: ad quas dirigi curantis consi-
lium debeat. interest enim non quæ ætas sit: neq; qd in corpore in-
tus geratur: sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est: aut si mu-
lier, quæ gruida non est: parum ualet: male sanguis emittitur. Emo-
ritur enim uis, si quæ his supererat: et hoc modo erepta ẽ. At firmus
puer, & robustus senex, & gruida mulier ualens, tuto curantur. Ma-
xime tamen in his medicus imperitus falli põt: quia ferẽ minus robo-
ris illis ætatibus subest. Mulieriq; prægnãti post curationẽ quoq; uiri-
bus opus est nõ tantũ ad se, sed et ad partũ sustinendũ. Non qd aut

*Ad Mulieris pueri
in sanguine
in pueris
necesse.*

Ars mixta corporis

lib. 2 de febris

intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est: cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret: neque conceptionem solam uideat: sed vires æstimet: & ex eo colligat, possit nec ne superesse quod uel puerum, uel senem, uel in una muliere quod duo corpora simul sustineat. Interest enim inter ualens corpus, et obesum: inter tenue, & infirmum. Femtioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem eiusmodi sustinent: celeriusque ea, si nimium est pinguis: quis affligitur. Ideoque uis corporis melius ex uenis, quam ex ipsa specie æstimator. neque enim solum hæc considerata sunt, sed etiam morbi genus quod sit. utrum superans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia uel deest, uel integra est: istud alienum est. At si uel copia sui male habet, uel corrupta est: nullo modo melius succurritur. Ergo uehemens febris ubi rubet corpus, plenaeque uenæ tumene: sanguinis detractionem requirit. Item uiscerum, morbi, nervorumque resolutio, & rigor, & distentio, quicquid denique fauces difficultate spiritus strangulat: quicquid subito suppressit uocem: quisquis intolerabilis dolor est: & quacumque de causa ruptum aliquid intus, atque collisum est. Item malus corporis habitus, omnesque acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocet. fieri tamen potest, ut morbus quidem id desideret: corpus autem uix pati posse uideatur. Sed si nullum tamen appareat aliud auxilium: periturusque sit qui laborat, nisi temeraria quoque uia fuerit adiutus: in hoc statu boni medici est ostendere: quod nulla spes sine sanguinis detractione sit: fatentique quantum in hac ipsa re sit metus. & tum demum si exigetur, sanguinem mittere. de quo dubitari in eiusmodi re non oportet. satius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. idque maxime fieri debet ubi nervi resoluti sunt: ubi subito aliquis obmutuit: ubi angina strangulatur: ubi prioris febris accessio penè conficit, paremque subsequi uerisimile est, neque eandem uidentur sustinere ægri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus: tamen ne id quidem perpetuum est. neque enim semper concoctionem res expectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decidit: si contusus est: si ex aliquo subito casu sanguinem uomit, quamuis paulo ante sumpsit cibum: tamen protinus ei demenda materia est: ne si subsederit, corpus affligat. Idemque etiam in alijs casibus repentinis qui strangulabunt, dictum erit. At si morbi ratio patietur: tum demum nulla cruditudinis suspicionem remanente id fiet. Ideoque ei rei uidetur aptissimus aduersus ualitudinis dies secundus, aut tertius. sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est: sic nunquam utile post diem quartum est:

In casu or alio

tum est: cum iam spatio ipso materia & exhausta est, & corpus cor-
rumpit: ut detractio imbecillum id facere possit: non possit integrum.
Quod si uehemens febris urget: in ipso impetu eius sanguinem mitte-
re, hominem ingulare est. Expectanda ergo remissio est, si non decre-
scat: sed crescere desit: neq; speratur remissio, tunc quoq; quamuis pe-
ior: sola tamen occasio non omittenda est. Fere etiam ista mediana
ubi necessaria est: in biduum diuidenda est. satius est enim in primis
lenare ægrum: deinde perpurigare: quam simul omni ui effusa for-
tasse præcipitare. Quod si in cura quoq; aqua, quæ inter cutem est,
ista respondet: quanto magis necesse est in sanguine respondeat. miti
uero is debet, si totius corporis causa fit, ex brachio: si partis alicuius,
ex ea ipsa parte: aut certe quàm proxima. quia non ubiq; mitti potest,
sed in temporibus: in brachijs, iuxta talos. Neq; ignoro quosdam dice-
re quamlongissime sanguinem inde, ubi lædit, esse mittendum. sic enim
auerti materiae cursum: at illo modo in id ipsum quod grauat, euoca-
ri. sed id ipsum falsum est. Proximum enim locum primo exaruit.
Ex ulterioribus autem catenus sanguis sequitur, quatenus emittitur.
ubi is suppressus est: quia non trahitur, ne uenit quidem. Videtur ta-
men usus ipse docuisse: si caput fractum est, ex brachio potius sangui-
nem mittendum esse. Si quod in humero uicium est, ex altero brachio:
credo quia si quid parum cesserit, opportuniore hæ partes iniuriæ
sunt: q̃ quæ iam male habent. auertitur quoq; interdum sanguis, ubi
alia parte prorumpens: alia emittitur. Desinit enim fluere qua uolu-
mus: inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere. Mittere autem
sanguinem cum sit expeditissimum: usum habenti, tum ignaro diffi-
cillimum est. iuncta enim est uena arterijs, his nervi. ita si neruum
scalpellus attingit: sequitur neruorum distentio: eaq; hominem crudeli-
ter consumit. At arteria incisa neq; coit, neq; sanescit: interdum etiam
ut sanguis uehementer erumpat, effuat. Ipsius quoq; uenæ, si forte præ-
cisa est, capita comprimuntur: neq; sanguinem emittunt. At si timide
scalpellus demittitur: summam cutem lacerat: neq; uenam incidit. Nō
numquam etiam ea latet: neq; facile reperitur. ita multæ res id diffi-
cile inscio faciunt: quod perito facillimum est. Incidenda ad medium
uena est: ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumq; opor-
tet attendere. Nam si is crassus, & niger est, uitiosus est: ideoq; utiliter
effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. eaq; missio sanguinis adeo
nō prodest: ut etiā noceat protinusq; is suppressendus est. Sed id eue-
nire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mitten-
dus sit. Illud magis fieri solet, ut æquæ niger assidue ac primo die
profluat. quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit: suppressen-

Ex. f. n. n. n. feb.

*Emulatio op
quodammodo*

quod fang. ans.

duus est: semperq; ante finis faciendus est, q; anima deficiat. deligan-
dumq; brachiū super imposito expresso ex aqua frigida penicillo: et
postero die auerso medio digito, non aut scalpello, uena ferienda: ut re-
cens coitus eius resoluitur: iterumq; sanguinem fundat. Sine aut pri-
mo, siue secundo die sanguis, qui crassus, et niger initio fluxerat: et
rubere, et pellucere cepit: satis materiae detractum est: atq; quod
superest, sincerum est. Ideoq; protinus brachium deligandum: ha-
bendumq; ita est, donec ualens cicatrix sit: quæ celerime in uena
confirmatur.

De sanguinis detractioe per cucurbitulas. Caput. X.

Cucurbitularum uero duo genera sunt: aeneum, et cor-
neum. Aenea altera patet: altera clausa est. Cornea alte-
ra parte æque patens, altera foramen habet exiguum. In
aeneam linamentum ardēs coniungitur: ac sic os eius corpo-
ri aptatur: imprimiturq; donec inhaereat. Cornea per se corpori im-
ponitur: deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus ad-
ductus est: superq; cæra cauum id clausum est: æque inhaereat.
Vtraq; non ex his tantum materiae generibus, sed etiam ex quolibet
alio recte fit. At si cætera defecerūt: caliculus quoq; aut pultarius oris
compressioris ei rei commodè aptatur: ubi inhaesit: si concisa ante scal-
pello cutis est, sanguinem extrahit. si integra est, spiritum. Ergo ubi
materia quæ intus est, lædit: illo modo: ubi inflatio, hoc imponi solet.
V¹ usus autem cucurbitulae præcipuus est: ubi non in toto corpore, sed in
parte aliqua uitium est: quam exhauriri ad confirmandam ualetu-
dinem satis est. Idq; ipsum testimonium est: etiam scalpello sanguine,
ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte: quæ iam læsa est: esse
mittendum. q; nemo cucurbitulam diuersæ parti imponit: nisi cum
profusionem sanguinis eo auertit: sed ei ipsi quæ dolet: quæq; libera
da est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis: quanuis et
spacium aliquod accessit: siue corrupta materia, siue spiritu male ha-
bente. In acutis quoq; quibusdā si et leuari corpus debet: et ex uena
sanguinem mitti: uires non patiuntur. Idq; auxilium ut minus uehe-
mens, ita magis tutum. Neq; unquam periculosum est, et si in medio fe-
bris impetu et si in cruditate adhibetur. Ideoq; ubi sanguinem mitti
opus est: si incisa uena præceps periculum est: aut si in parte corpo-
ris etiam uitium est: huc potius confugiendum est. cū eo tamen ut scia-
mus, hic ut nullum periculum, ita lenius præsidium esse: nec posse ue-
hementi malo, nisi æque uehemens auxilium succurrere.

lib. 1. 26.

Deier Jco

d Eiectionem aut antiqui varijs medicamentis, crebraq; alui
ductione in omnibus ferè morbis moliebantur: dabantq;
aut nigrum ueratrū, aut filiculam, aut squamam æris,
quam λεπίδος χαλκός græci uocant: aut lactucæ marinæ
lac: cuius gutta panī adiecta, abunde purgat: aut lac uel asininum, uel
bubulum, uel caprinum: eiq; salis paulum adiciebant: decoquebantq;
id: et sublatis his, quæ coierant: quod quasi serum supererat: bibere
cogebant. Sed medicamenta stomachū ferè lædunt. ideoq; omnibus ca-
tharticis aloe miscenda est. Aluus si uehementius fluit: aut sæpius duc-
tur: hominem infirmit. Ergo nunquam in aduersa ualetudine medica-
mentum eius rei causa recte datur: nisi ubi is morbus sine febre est. Ut
cum ueratrū nigrum, aut atra bile uexatis, aut cum tristitia insaniē-
tibus, aut is quorū nerui parte aliqua resoluti sunt: datur. At ubi fe-
bres sunt: satius est eius rei causa abos, potionesq; assumere: qui simul
et alant: et uentrē molliant. Suntq; ualetudinis genera, quibus ex la-
cte purgatio conuenit. Plerumq; uero aluus potius ducenda est: quod ab
Asclepiade quoq; sic uituperatum, ut tamen seruatum sit: uideo ple-
rumq; sæculo nostro præteriri. Est autem ea moderatio, quam is seculi
uideretur: aptissima: ut neq; sæpe ea mediana tentetur: et tamen se-
mel sumptum uel bis, non omittatur. Si caput graue est: si oculi cali-
gant: si morbus maioris intestini est, quod græci πύλιν nominant: si in
imo uentre, aut in coxa dolores sunt: si in stomachū quædam biliosa
cōcurrunt: uel et pituita eò se, humor'ue aliquis aquæ similis confert:
si spiritus difficiliter redditur: si nihil per se uenter excernit. utiq; si
iuxta quoq; sterqus est, et intus remanet: aut si stercoreis odore nihil
deiciens, eger ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est quod excerni-
tur: aut si prima media febrē non sustulit: aut si sanguinem mitti, cū
opus sit: uires non patiuntur: tempus'ue eius rei præterijt. aut si mul-
tum ante morbū aliquis portauit: aut si is qui sæpe, uel sponte, uel casu
purgatus est: subito habet aluū suppressam. seruanda uero illa sunt, ne
ante diem tertiu ducatur: ne ulla cruditate substante, ne in corpore in-
firmo, diuq; aduersa ualetudine exhausto: ne'ue in eo, cui satis aluus
reddit cotidie, qui'ue eam liquidam habebit: ne in ipso accessionis im-
petu, q a quod tum infusum est, aluo continetur: regestumq; in caput
multo grauius piculū efficit. pridie uero abstinere debet eger: ut aptus
tali curationi sit. Eodē die ante aliquot horas aquā calidā bibere, ut
superiores eius ptes madescat: tum imittēda in aluū est: si leui medici-
na cōtēti sumus: pura aqua, si paulo ualētiori: mulsa, si leni, ex aqua in

Lac alui ducit

Aluus & ab alijs
officijs paretur.

Alui ducit
Alui ducit

Alui ducit

LIBER 32

qua foenum graecum uel ptisana uel malua decocta sit. si reprimen-
di causa: ex uerbis. acris autem est marina aqua uel alia, sale adie-
cto: atq; utraq; decocta commodior est. Acrior fit adiecto uel oleo elu-
nitro uel melle quoq; si acrior est: eo plus extrahit: sed minus faciel
sustinetur. Id quod infunditur: neq; frigidum esse oportet: neq; calidū:
ne alterutro modo laedat. Cum infusum est: quantum fieri potest con-
tinere se in lectulo debet aeger: nec primæ cupiditati deiectionis pro-
pinus cedere. ubi necesse est, tum demum residere. ferēq; eo modo
dempta materia superioribus partibus leuatis morbum ipsum mol-
lit. Cum uero, quoties res coegit, desidendo aliquis se exhaust: pau-
lisper debet conuiescere, et ne uires deficiant: utiq; eo die cibum assu-
mere. qui plenior an exiguus sit dandus: ex ratione eius accessionis,
quæ expectabitur, aut in metu non erit, aestimari oportebit.

De uomitu. Caput. XII.

Uomitus ut in secunda quoq; ualitudine sepe necessa-
rius biliosis est: sic ē in his morbis, quos bilis concitauit.
Ergo omnibus, qui ante febres horrore, et tremore uexā-
tur: omnibus, qui cholera laborant: omnibus ē cum qua-
dam hilaritate insanientibus, et comitiali quoq; morbo oppressis, ne-
cessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut in cholera: si febris est, ut
inter horrores: asperioribus medicamentis opus nō est: sicut in deiectioni-
bus quoq; supra dictum est. satisq; est ea uomitus causa sumi: quæ
sanis quoq; sumenda esse proposui. At ubi longi ualentesq; morbi sine
febre sunt, ut comitialis, aut insania: ueratro quoq; albo utendū est: id
neq; hyeme, neq; aestate recte datur: optime uere: tolerabiliter autumno.
quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humi-
dus sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod po-
tius datur, non semper aegris prodesse: semper sanis nocere.

De frictione. Caput. XIII.

E frictione uero, et gestatione adeo multa Asclepiades
tanquam inuentor eius posuit: quod in eo uolumine, quod
communium auxiliorum scripsit: cum trium tantum fa-
cere mentionem, uinis. s. et aque, et gestationis: tamen ma-
ximam partem in hoc consumpsit. Oportet autem neq; recentio-
res uiros in his fraudare: quæ uel repperunt: uel recte secuti sunt.
et tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt: autho-
ribus suis reddere. Neque dubitari potest quin latius quidem

Et dilucidius ubi, Et quomodo frictione utendū esset, A sclepiades præ-
 cepit: nihil tamen reppererit, quod non à uetustissimo auctore Hip-
 pocrate paucis uerbis cōprehensum sit: qui dixit. frictione, si uehementis
 sit, durari corpus: si lenis, moliri: si multa, minui: si modica, impleri. Se-
 quitur ergo ut tum utendum sit: cum aut astringendum corpus sit,
 quod fluēs est: aut moliendū quod induruit: aut digerendū in eo quod
 copia nocet. aut alendum id quod tenue: Et infirmum est. Quas tamen
 species si quis curiosius æstimet, quod iam ad medicum non pertinet: fa-
 cile intelliget omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam Et astrin-
 gitur aliqd eo dempto: quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat.
 Et molitur eo detracto, quod duriciæ creabat: Et impletur non ipsa
 frictione, sed eo cibo: qui postea usq; ad cutem digestionem quadam rela-
 xatam penetrat. Diuersarum uero rerū in modo causa est. Inter un-
 ctionem autem, Et frictionem multum interest. Vng. n. leniterq; per-
 tractari corpus ē in acutis, Et recentibus morbis oportet: in remissio-
 ne tamen, Et ante abum. Longa uero frictione uti neq; in acutis mor-
 bis, neq; in crescentibus conuenit: præter q̄ cum phreniticis somnus ea
 requiritur. Amat aut hoc auxiliū ualeudo longa, Et ē à primo im-
 petu inclinata. Neq; ignoro quosdā dicere omne auxiliū necessarium
 esse increscentibus morbis: non cum iam per se finiuntur. quod non
 ita se habet. Potest. n. morbus etiam qui per se finem habiturus est: ci-
 tius tamen adhibito auxilio tolli. quod duabus de causis necessarium
 est: ut Et q̄ primum bona ualeudo contingat: Et ne morbus qui re-
 manet, iterum quantuis leui de causa exasperetur. Potest. n. morbus mi-
 nus grauis esse q̄ fuerit: neq; ideo tamen solui: sed reliquiis quibusdā
 inhærere: quas admotum aliquod auxiliū discutit. Sed ut leuata quoq;
 aduersa ualeudine recte frictio adhibetur: sic nunq; adhibenda est fe-
 bre increscente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea uacabit:
 minus certe cum ea remisserit. Eodem autem modo in tutis corpori-
 bus esse debet: ut cum infirmus aliquis implendus modo est in par-
 tibus: aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit: aut quia
 alterius. Nam Et capitis longos dolores ipsius frictio leuat: non in
 impetu tamen doloris, Et membrum aliquod resolutum ipsius fri-
 ctione confirmatur. Longe tamen sepius aliud perfricandum est, cum
 aliud dolet: maximeq; cum à summis, aut à medijs partibus corporis
 euocare materiā uolumus: ideoq; extremas partes pfricamus. Neq;
 audiendi sunt, qui numero finiunt quoties aliquis perfricandus sit. Id
 enim ex uiribus hominis colligendum est. Et si is qui per infirmus est:
 potest satis esse, quinquages. si robustior pōt, ducenties esse faciendum.
 Inter utrunq; deinde prout uires sunt. Quo fit ut et minus sepe in

Inter frictiones

Inter

quorū

LIBER

muliere, quàm in uiro: minus sæpe in puero, uel sene, quàm in iuvene manus dimouendæ sint. Deniq; si certa membra perfricantur: multa, ualentiq; frictione opus est. Nam neq; totum corpus infirmari cito per partem pôt: & opus est quã plurimũ materiæ digerî: siue id ipsum membrum, siue per id aliud leuamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationẽ per totum id exigit: breuior esse debet, & lenior: ut tantummodo summam cutem emolliat: quo facilius capax ex recẽti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam ægrum esse testatur: ubi exterior pars corporis friget: interior cum siti calet: ut supra posui. Sed tunc quoq; unicum in frictione præsidium est: quæ si calore in cutem euocat: potest alicui medicinæ locum facere.

De gestatione. Caput. XIII.

g Estatio quoq; longis etiam, & inclinatis morbis aptissima est. utilisq; est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent: sed adhuc exerceri per se nõ possunt: & his quibus lentæ morborũ reliquæ remanent: neq; aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, uehementiq; febre, præcipueq; ardente, ad discutiedam eam, gestatione dixit utendum esse. sed id periculose fit: meliusq; quiete eiusmodi impetus sistitur. si quis tamen experiri uolet: sic experiatur. si lingua non erit aspera: si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor uisceribus, aut capiti, aut præcordijs suberit. et ex toto nunquã gestari corpus dolens debet: siue id in toto, siue in parte est: nisi tamen solis nervis dolentibus, neq; unquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt et pro uiribus cuiusq; & pro opibus: ne aut imbecillum hominem nimis digerant: aut humili obsint. Gestationum lenissima est navi, uel in portu, uel in flumine. uehementior in alto mari navi, uel lectica, aut scanno: acrior uehiculo. Atq; hæc ipsa & intendi, & leniri possunt. si nihil horum est, suspendi lectus debet: & moueri. si ne id quidem est: at certe uni pedi lecti subiiciendus funiculus est: atq; ita lectus huc, & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis infirmissimis conueniunt. Valentiora uero his qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his qui grauium morborum initia sic sentiunt: ut adhuc febre uacent. Quod & in tæbe, et in stomachi uitijs, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit: aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania ẽ sine febre, quauis diu manent. In quibus affectibus ea quoq; genera exercitationum necessaria sunt, quæ cõprehendimus eo loco: quo quemadmodum sani, neq; firmi homines se gererent: præcepimus.

De abstinentia. Caput. XV.

Abstinentiæ uero duo genera sunt: alterum ubi nihil assumit æger: alterum ubi non nisi quod oportet. Initia morborum primum famem, sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem: ut neq; aliud quàm expedit: neq; eius ipsius nimium sumatur. Neq; enim conuenit iuxta mediam protinus sacietatem esse. Quod si sanis quoq; corporibus inutile est: ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore et ægro? Neq; ulla res magis adiuvat laborantem, q̄ tempestiua abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt: sibi ipsis modum uē dicant. Liberaliter agere se credunt qui cætera illorum arbitrio relinquunt: in genere cibi liberi sunt: quasi quærat^{ur} qd medico liceat: non quid ægro salutare sit: cui uehement^{er} nocet, quotiens in eius quod assumitur uel tempore, uel modo, uel genere peccatur.

De sudore. Caput. XVI.

Vdor etiam duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & harenæ calidæ, & læoni cū, & clibanij, et quarundam naturalium sudationes. ubi è terra profusus calidus uapor edificio includitur: sicut sup̄ aras in myrtetis habemus. Præter hæc sole quoq; et exercitatio^{ne} is mouetur. Vtiliaq; hæc genera sunt quoties humor intus nocet: usq; digerendus est. Ac neruorum quoq; quedam uitia sic optime curantur: sed cætera infirmis possunt conuenire. solet exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, uel initio morbi, uel et grauius morbis tenentur. Cauendum autem est nequid horū uel in febre, uel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. nam modo discussis febribus initium cibi plenioris, uiniq; firmiteris ualetudini facit: modo febre ipsam tollit: fereq; adhibetur, ubi summam uitæ relaxari, euacuariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. antiqui timidius eo utebantur. Aselepiades audacius. Neq; terrere autem ea res, si tempestiua est: debet. & ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est: simulatq; ea uno die non accessit: eo, qui proximus est, post tēpus accessionis, tuto lauari potest. At si circuitum habet: ea febris solita est, sic, ut tertio, quarto uel die reuertatur: quandoq; non accessit: balneum tutum est. Manentibus uero adhuc febribus, si hæc sunt lentæ, lienesq; iam diu male habent: recte mediana ista tentatur: cum eo tamen ne præcordia dura sint:

Cuiusmodi

Balneum

ne'ue ea tumeant: ne'ue lingua aspera sit: ne'ue aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit: ne'ue tum febris increseat. At in his quidem febris, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt: alterum ante horrorem, alterum febre finita. In his uero, qui lentis febriculis diu detinentur: cum aut ex toto recessit accessio: aut si id non solet, certe lenita est: iamq; corpus tam integrum est: quam maxime esse in eo genere ualitudinis solet: imbecillus homo iturus in balneum uitare debet: ne ante frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum uenit, paulisper resistere: expeririq; num tempora astringantur: & an sudor aliquis oriatur. Illud si incidit, hoc non secutum est: inutile eo die balneum est: perungendus est is leniter, & auferendus est: uitandumq; omnimodo frigus: & abstinentia utendum. At si temporibus integris primum ibi, deinde alibi sudor incipit: fouendum os aqua calida: tunc in solio desidendum est: atq; ibi quoq; uidendum, num sub primo contactu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat: quod uix tamen fieri potest, si priora recte cesserunt. certum id autem signum inutile balnei est. Ante uero, an posteaquam in aquam calidam se demittat: aliquis perungi debeat: ex ratione ualitudinis suæ cognoscat. Fere tamen, nisi ubi nominatim, ut postea fiat, id præcipitur: moto sudore leniter corpus perungendum: deinde in aquam calidam demittendum est. atq; hic quoq; habenda uirium ratio est. Neq; committendum ut per æstus anima deficiat: sed maturius is auferendus: curiosq; in uestimentis inuoluendus est. ut neq; ad eum frigus aspires: & ibi quoq; antequam aliquid assumat: insudet. Fomenta quoq; calida sunt miliu, sal, harena, quodlibet eorum calefactum, et in linteum coniectum. Si minore ui opus est: etiam solum linteum. At si maiore: extincti titiones, inuolutiq; panniculi, & sic circumdati. Quin etiam calido oleo replentur utriculi: & in uasa fictilia: ad similitudinem, quas lenticulas uocant: aqua coniungitur: & sal sicco linteo excipitur. demittiturq; in aquam bene calidam. tum super id membrum, quod fouendum est: collocatur: iuxtaq; igne ferramenta duo sunt capitulis paulo latioribus: alterumq; ex his demittitur in eum salem: & aqua super leniter aspergitur. ubi frigere coepit, ad ignem refertur: & idem in altero fit: deinde inuicem in utroq; inter quæ descendit salsus, & calidus suatus: qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est digerere id quod uel præcordia onerat: uel fauces strangulat: uel in aliquo membro nocet. Quando autem quoq; utendum sit, in ipsis morborum generibus dicitur.

Qui abi,

Qui cibi, potiones ue, aut ualentis, aut mediæ, aut imbecillæ materiæ sint. Caput. XVII.

Ubi de his dictum sit, quæ detrahendo inuant: ad ea
 c ueniendum est, quæ nos alunt: id est cibum, & potionem.
 hæc aut non omnium tantum morborum, sed et secundum
 diuersam ualitudinis cōia præsidia sunt. Pertinetq; ad rem
 omnium proprietates nosse. primum ut sani sciunt quomodo his utan-
 tur. deinde ut exsequentibus nobis morborum curationem, liceat species
 rerum, quæ assidue necessaria erunt: subijcere. neq; necesse est subinde
 singulas eas nominare. scire igitur oportet omnia legumina, quæq; ex
 frumentis panificia sunt, generis ualentissimi esse. Id ualentissimum
 uoco: in quo plurimum alimenti est: item omne animal quadrupes do-
 mesticum: omnem grandem feram, quales sunt caprea, ceruus, aper,
 onager, omnem grandem auem, quales sunt anser, & pavo & grus:
 omnes beluas marinas, ex quibus cetos est: quæq; his pares sunt. Item
 mel, & caseum quo minus mirum est, opus pistorium ualentissimum
 esse: quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat. In media uero mate-
 ria numerari ex oleribus debere ea: quorum radices uel bulbos assu-
 minus. Ex quadrupedibus leporem aues omnes à minimis ad phœ-
 nicopterum. item pisces omnes, qui salem non patiuntur: solidi uel sali-
 untur. Imbecillissimam uero materiam esse omne olus: & quicquid
 in cauliculo nascitur: qualis est cucurbita, & cucumis, & cappar, &
 omnia poma, oleas, co-leas, itemq; cōchilia. Sed quantum hæc ita discre-
 ta sunt: tamen et quæ sub eadem specie sunt: magna discrimina reci-
 piunt: aliæ res alia, uel ualentior est, uel infirmior. Si quidem plus
 alimenti est in carne, quàm in ullo alio. Firmitus est triticum, quàm mi-
 lium: id ipsum: quàm hordeum: et ex tritico firmissima siligo: deinde
 simila: deinde cui nihil ademptum est, quod αὐτόρυπον græci uocant:
 infirmior est. ex polline infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus
 uero ualentior faba, uel lenticula, quàm pisum. Ex oleribus ualentior
 rapa, napiq; & omnes bulbi: in quibus cepam quoq; & allium mi-
 nore: quàm pascinacæ, uel quæ specialiter radícula appellatur. Item
 firmitus brassica, et beta, & porrum: quàm lactuca, uel cucurbita, uel
 asparagus. At ex fructibus surculorum ualentiores uinæ, ficus, nuxes,
 palmulæ: quàm quæ poma proprie nominantur. Atq; ex his ipsis fir-
 miora, quæ succosa: quàm quæ fragilia sunt. Itemq; ex his auiibus, quæ
 in media specie sunt: ualentior ea quæ pedibus: quàm quæ uolatu ma-
 gis nititur: & ex his quæ uolatu fidunt: firmiores sunt quæ gradio-
 res aues: quàm quæ minutæ sunt, ut ficedula, et turdus: Atq; ea quoq;

Aurelij Cor.

d

at. ualentissimæ

quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præstant: quàm quæ natandi
 scientiam non habent. Inter domesticas uero quadrupedes leuissima
 suilla est: grauiissima bubula. Itemq; ex feris quo maius quodq; ani-
 mal, eo robustior ex eo cibus est. Pisciumq; eorum, qui ex media mate-
 ria sunt, quibus maxime utimur: tamen grauissimi sunt: ex quibus sal-
 samenta quoq; fieri possunt: qualis lacertus est. deinde qui quantus te-
 niores: tamen duri sunt, ut aurata, coruius, satrus, oculata, tum plani,
 post quos etiam leuiiores lupi, muli; , & post hos omnes saxatiles.
 Neq; uero in generibus rerum tantummodo discrimen est: sed etia in
 ipsis: quod & ætate fit, & membro, & solo, et cælo, et habitu. nã qua-
 drupes animal omne si lactans est, minus alimenti præstat. Item quo
 tenerior pullus, cohortalis est. In piscibus quoq; media ætas, quæ non
 dum summam magnitudinem impleuit. Deinde ex eodem sue ungu-
 læ, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hedo'ue cum pectolis totum
 caput aliquanto quàm cætera membra leuiora sunt, adeo ut in me-
 dia materia poni possint. Ex auibus pectora, colla, alæ'ue recte infir-
 mis annumerantur. Quod ad solum uero pertinet: frumentum quoq;
 ualentius est collinum, quàm campestre. leuior piscis inter saxa edi-
 tus, quàm in harena: leuior in harena, quàm in limo. Quo fit, ut ex
 stagno, uel lacu, uel flumine eadẽ genera grauiora sint. Leuiorq; qui
 in alto, quàm qui in uado uixit. Omne etiam ferum animal dome-
 stico leuius, & quodcunq; humido cælo, quàm quod siccò natum est.
 Deinde eadem omnia pinguis, quàm macra: recentia, quàm salsa,
 noua, quàm uetusta plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit
 iurulenta, quàm assa: magis assa, quàm elixa. Ouum durum ualen-
 tissimæ materiæ est: molle, uel sorbile, imbecillissimæ. Cum quæ panifi-
 cia omnia firmissima sint: elota tamen quædam genera frumenti, ut
 alica, oriza, ptisana, uel ex hisdẽ facta sorbitio, uel pulticula. Et aqua
 quoq; madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potioni-
 bus uero quæcunq; ex frumento facta est: itemq; lac mulsu, defru-
 tum, passum, uinum aut dulce, aut uehemens, aut mustum, aut magnæ
 uetustatis, ualentissimi generis est. At acetum, & id uinum: quod pau-
 corum annorum, uel austerum, uel lene est: in media materia est.
 Ideoq; infirmis nunquam generis alterius dari debet. A qua omniũ
 imbecillissima est. firmiorq; ex frumento potio est, quo firmitus fuit
 ipsum frumentum. firmior ex eo uino, quod bono solo, quàm quod
 tenui: quodq; temperato cælo, quàm quod aut nimis humido, aut ni-
 mis siccò: nimumq; aut frigido, aut calido natum est. Mulsu quo
 plus mellis habet: defrutum quo magis incoctum est: passum quo ex
 sicciorẽ uia est: eo ualentius est. A qua leuissima pluuialis est: deinde

fontana: tum ex flumine, tum ex puteo: post hæc ex niue, aut glacie. grauior his ex lacu: grauiissima ex palude. Facilis etiam et necessaria cognitio est naturam eius requirentibus. nam leuis pondere apta paret: et ex his quæ pondere pares sunt, eo melior quæq; est: quo celerius et calefit, et frigescat: quoq; celerius ex ea legumina percoquantur. ferè uero sequitur ut quo ualentior quæq; materia est: eo minus facile concoquatur: sed si concocta est, plus aliat. Itaq; utendum est materiæ genere pro uiribus: modusq; omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus rebus infirmis opus est. mediocriter firmos media materia optime sustinet. et robustis apta, ualidissima est. Plus deinde aliq; assumere ex leuioribus potest, magis in his quæ ualentissima sunt, temperare sibi debet.

Quæ natura, ac proprietas cuiusq; rei sit, quæ uescimur.

Caput. XVIII.

Eq; hæc solo discrimina sunt: sed etiã aliæ res boni succi: aliæ mali sunt: quas ὀχύλας, uel κακοχύλας græci uocant. Aliæ lenes, aliæ acres: aliæ crassiorem pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiore: aliæ idoneæ sunt stomacho: aliæ alienæ sunt. Itemq; aliæ instant: aliæ ab hoc absunt. aliæ calefaciunt: aliæ refrigerant: aliæ facile in stomacho accedunt: aliæ non facile intus corrumuntur. aliæ mouent aluum: aliæ supprimunt. aliæ citant urinam: aliæ tardant. Quædam somnum mouent: quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniã aliud aliter, uel corpori, uel ualitudini conuenit.

Quæ res boni succi sint. Caput. XIX.

Oni succi sunt triticum, siligo, alia, oriza, amilū. Itē et lenes sunt, et stomacho aptæ: et calefaciunt tragum, ptisanam, lac, caseus mollis, omnis uenatio, omnes aues, quæ ex media materia sunt. Ex maioribus quoq; hæc, quas supra nominauimus. Mediū inter teneros, durosq; pisces, ut mulus, et lupus, uerna, lactuca, urtica, malua, cucumis, cucurbita, ouū sorbile, portulaca, cochlea, palmula. ex pomis quodcunq; neq; acerbum, neq; acidū est. Vinum dulce uel lene, passum, de frutum: olea quæ ex his duobus in alterutro seruata sunt: uulua, rostra, trunculiq; In summa omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne iecur.

d ij

LIBER

Quæ res mali succi sint. Caput. XX.

m Ali uero succi sunt milium, panicum, hordeum, legumi-
na, caro domestica permacra, omnisq; caro salsa, omne
falsamentum, garum: uetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi,
bulbi, brassica: magisq; et cyma eius, asparagus, beta, cu-
cumis, porrum, eruca, nasturcium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum,
ruta, anethum, feniculum, cuminum, anesum, lapatium, sinapi, et
allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunq; acidum, uel acer-
bum est: acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum: pisces quoq; saxa-
tiles, omnesq; qui ex tenerrimo genere sunt: aut hi qui rursus nimium
duri: uirosiq; sunt: ut ferè quos stagna, lacus, limosi uel riuus ferunt:
qui uel in nimiam magnitudinem excesserunt.

Quæ res lenes: quæ uel acres sint. Caput. XXI.

l Enes autem sunt sorbitiones, pulticula, laganum, amilum,
ptisana, pinguis caro, et quæcunq; glutinosa est. Quod
ferè quidem in omni quæ domestica fit: præcipue tamen
in ungulis, trunculisq; suum: in pectiolis, capitulisq; he-
dorum, et uitulorum, et agnorum: omnibusq; cerebellis. Item si qui
proprie bulbi nominantur: lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acria
sunt omnia nimis austera: omnia acida, omnia salsa, et mel quidem
quo melius est: eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturcium, cu-
cumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocyumum, la-
ctuca, maximaq; olerum pars.

Quæ res crassiorè, quæ uel tenuiorem pituitam faciunt. Caput. XXII.

c Crassiorè autem pituitam faciunt omnia sorbilia, alia, ori-
za, amilum, ptisana, lac, bulbi, omniaq; ferè glutinosa.
Externant eandem omnia salsa, atq; acria, et acida.

Quæ res stomacho idoneæ sunt. Caput. XXIII.

s Stomacho autem aptissima sunt quæcunq; austera sunt:
et quæ acida sunt: quæq; contacta sale modico sunt. Item
panis sine fermento, et elota alia, uel oriza, uel ptisana:
omnis auis, omnis uenatio, atq; utraq; uel assa, uel elixa.
Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex cæteris sumitur, macrum
potius,

potius, quàm pingue. Ex sue ungulae, rostra, aures, uulue, sterilesq;. Ex oleribus intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, si fer. Ex pomis cerasium, morum, sorbum, pirũ fragile, quale crustuminiũ uel neauianum est. Item pira quæ reponuntur tarëtina, atq; signina. Malum orbiculatum, aut scudianum, uel amerinum, uel cotoneũ, uel punicum absinthium. Vuae ex olla, molle ouum, palmulae, nuclei pinei, olea alba ex dura muria, eadem aceto intincta, uel nigrae, quæ in arbore bene permaturuerũt: uel quæ in passo, defrutone seruatae sunt. Vinum austerum, licet iam asperum sit: item resinatum. Duri ex media materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpurae, cochleae, cabi, potionesq; uel frigidae, uel feruentes, absinthium.

Quæ res alienæ stomacho sunt. Caput. XXIII.

Liena uero stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, omnia iurulenta, prædulcia, omnia pingua, sorbitio, panis, itemq; uel ex milio, uel ex hordeo, oleum, radices olerũ, et quodcunq; olus ex oleo, garo uel estur: mel, mulsum, defutum, passum, lac, omnis caseus, una recens, ficus & uiridis, & arida, legumina omnia, quæq; inflare consueuerunt. item thymum, nepeta, satureia, hyssopum, nasturtium, lapatium, lapsanum, iuglandes. Ex his autem intelligi potest non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse.

Quæ inflant, aut inflationem leuant. Caput. XXV.

Inflant autem omnia ferè legumina, omnia pingua, omnia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atq; etiam id uinũ, cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus alium, cepa, brassica, omnesq; radices excepto sifere & pastinaca: bulbi, ficus etiam arida, sed magis uirides: unae recentes, nuxes omnes exceptis nucleis pineis: lac, omnisq; caseus, quicquid deinde subcrudũ aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex uenatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchilijs, ouis uel mollibus, uel sorbilibus, uino uetere. Fœniculum uero, & anetum inflationes etiam leuant.

Quæ res aut calefaciunt, aut refrigerant. Caput. XXVI.

T calefaciunt piper, sal, caro omnis iurulenta, alliũ, cepa, ficus arida, salsamentum, uinum, & quo meracius est, eo
Aurelij Cor. d iij

LIBER

magis. refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca. Item coriandrū, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasia, mala austerā, pira fragilia, caro elixa, præcipueq; acetū, sine cibis ex eo, sine potio assumitur.

Quæ res intus facile uitiuntur, uel minime corrumpuntur.

Caput. XXVII.

Açile autem intus corrumpuntur panis fermentatus, & f quisquis alius, quàm ex tritico est: lac, mel, ideoq; lactantia, atq; omne pistoriū opus, teneri pisces, ostrea, olera, ca seu & recens, & uetus, crassa uel tenera caro, uinū dulce, mulsum, defrutum, passum, quicquid deinde uel iurulentum est, uel nimis dulce, uel nimis tenue. At minime intus uitiuntur, panis sine fermento, aues, et eæ potius duriores, aurati pisces, neq; solū aurata pira, aut scarus, sed etiā lolligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisq; dura caro, eademq; aptior est si macra, si salsa est. omniaq; salsamenta, cochleæ, murices, purpuræ, uinum austerum, uel resinatum.

Quæ res aluum mouent. Caput. XXVIII.

T aluum mouent panis fermentatus, magisq; si cibarius, a uel hordeaceus est. brassica, si subcruda est lactuca, anethum, nasturcium, ocymum, urtica, portulaca, radica, capparis, allium, cepa, malua, lapatium, beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, uua, omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis uiridis, uua recentes pingues, minutæ aues, cochleæ, garum, salsamenta, ostrea, pelorides, echini, muscoli, & omnes fere conchule, maximeq; ius earū, saxatiles, & omnes teneri pisces, sepiarū atramentum: si qua caro assumitur pinguis, eadem uel iurulenta, uel elixa: aues quæ natant, mel crudū, lac, lactantia omnia, mulsum, uinum dulce, uel salsum, aqua, tenera omnia tepida, dulcia, pinguis, elixa iurulenta, salsa, diluta.

Quæ res aluum astringant. Caput. XXIX.

Contra astringunt panis ex siliigne, uel ex simila, magis c si sine fermento est: magis etiam si ustus est: intenditurq; uis eius et si bis coquitur. pulticula uel ex halica, uel ex panico, uel ex milio. itaq; ex hisdem sorbitio, & magis

si hæc ante fricta sunt. lenticula, cui uel beta, uel intubus, uel ambubeia, uel plantago adiecta est, magisq; et si illa ante fricta est: per se etiam intubus uel ex plantagine, uel ambubeia fricta: minuta olera, brassica bis decocta, dura oua, magisq; si assa sunt: minuta aues, merula, palumbus, magisq; si in posca decoctus est: graues quoq; aues, quæ magis currunt, quam uolant: lepus, caprea, iecur ex his, quæ seui habent, maximeq; bubulum, ac seuum ipsum, asseus: qui uehementior uetustate fit, uel ea mutatione quam in caseo transmarino uidemus: aut si recens est ex melle, mulso uel decoctus. Item mel coctum, pira immatura, sorba, magisq; ea: quæ torminalia uocantur, mala cydonia, et punica, oleæ uel albæ, uel permaturæ, myrta, palmulæ purpureæ, murices, uinum resinatum uel asperum: item meracum, acetum mulsum quod inferbuit: item defrutum, passum, aqua uel tepida, uel præfrigida dura, idest ea quæ tarde putrescit, ideoq; pluuia potissimum: omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, et in eadē carne: assa potius, quam elixa.

omni ad argenti

Quæ res urinam mouent. Caput. XXX.

Urinam aut mouent quæcunq; in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocymum, menta, hyssopum, anisum, coriandrum, nasturtium, crucca, foeniculum. Præter hæc asparagus, capparitis, nepeta, thymum, satureia, lapsanum, pastinaca, magisq; agrestis, radícula, sifer, cepa. Ex uenatione maxime lepus, uinum tenue, piper et rotundum, et longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei.

Quæ res somnum mouent, aut sensus excitant. Caput. XXXI.

Somno uero aptum est papauer, lactuca, maximeq; aestiua, cuius cauliculus iam lacte repletus est: morum, porrum. Sensus excitat nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueq; pulegium, ruta, et cepa.

Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent, aut emolliant. Caput. XXXII.

Vocare uero materiam multa admodum possunt. sed ea quæ ex peregrinis medicamentis maxime constant: alijsq; magis, quam quibus ratione uictus si accurritur, opitulatur: in præsentia differam. Ponam ea uero quæ præopta, et his morbis de quibus protinus dicturus sum, apta: corpus erodunt:

d iij

Ephraim.

Et sic eo quod mali est, extrahunt. Habent autē hanc facultatem se-
 mina eruce, nasturcij, radiculæ præcipue tamē omnium sinapi. Salis
 quoq; Et fici eadem vis est. leniter uero simul Et reprimunt, Et
 molliunt lana succida uel aceto, uel uino: quo oleum adiectum est.
 contrita palmulæ: surfures in salsa aqua, uel aceto decoctæ. At si-
 mul reprimunt Et refrigerant herba muralis, parthenium uel perdi-
 cium appellant: serpillum, puleium, ocymum, herba sanguinalis, quam
 græci πολυρόριον uocant: portulaca, papaueris folia, capreoliq; uitiū,
 coriandri folia, hyoscyamū, muscus, sisēr, apiū, solanum, quā σπύλρον
 græci uocant: brassicæ folia, intubus, plantago, fœniculi semen, contrita
 pira uel mala, præcipueq; cydonia, lenticula, aqua frigida maximeq;
 pluuialis, uinum, acetum, Et ex horum aliquo magis, madens uel pa-
 nis, uel farina, uel spongia, uel cinis, uel lana succida, uel etiam linteo-
 lum, creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum,
 uerbenarū confusa cum teneris caulibus folia: cuius generis sunt olea,
 cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, he-
 dera, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt coctæ mala cy-
 donia, malicoriū, aqua calida, in qua uerbenæ coctæ sunt, quas supra
 proposui: puluis uel ex fecē uini, uel ex myrti folijs, amaræ nucs. Ca-
 lesfacit uero ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex far-
 ris, siue hordei, siue erui, uel lolij, uel milij, uel panici, uel lenticulæ, uel
 fabæ, uel lupini, uel lini, uel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaq; im-
 posita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quā ex
 aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iun-
 cta oleo, magisq; si uetus est: sal nigrum, gut, piper, quinq; folium, fe-
 req; quæ uehementer Et reprimunt, Et refrigerant. Durant quæ ca-
 lesfaciunt, Et digerunt, Et emolliunt. Præcipueq; ad emolliendum po-
 test cataplasma ex lini, uel fœni græci semine. His autem omnibus Et
 simplicibus, Et permixtis uarie medici utuntur: ut magis quid quisq;
 persuaferit sibi appareat: quā quid euidenter compererit.

De morborum generibus. Caput. I.

Rouis omnibus, quæ pertinent ad uniuersa genera morborum, ad singulorū curationes ueniam. Hos autem in duas species græci diuiserunt: aliosq; ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Idq; quoniam nō semper eodem modo respondebant: eosdem aliū inter acutos, aliū inter longos retulerunt. Ex quo plura eorū genera esse manifestum est. Quidam enim breues utiq; sunt, qui cito uel tollunt hominem: uel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub quibus neq; sanitas in propinquo, neq; exitium est. Tertiumq; genus eorum est, quū modo acuti, modo longi sunt. idq; non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est: sed in alijs quoq; fit. Atq; etiam præter hos quartum est, quod neq; acutum dici potest, quia non perimit: neq; utiq; longum, quia si occurrat, facile sanatur. Ego cum de singulis dicam: qui cuiusq; generis sit indicabo. diuidam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere uidentur: et eos qui oriuntur in partibus. incipiam à prioribus pauca præfatus de omnibus. In nullo quidē morbo minus fortuna sibi uendicare: quam ars potest: ut pote cum repugnante fortuna nihil medicina proficiat. magis tamen ignoscendū medico est parum proficienti in acutis morbis, quam in longis. Hic enim breue spatium est: intra quod, si quod auxilium non profuit: æger extinguitur. ibi et deliberationi, et mutationi remediorū tempus patet: adeo ut raro, si inter initia medicus accessit: obsequens æger sine illius uitio pereat. Longus tamen morbus cū penitus insedit: quod ad difficultatem pertinet: acuto par est. et acutus quidē quo uetustior est: longus autem quo recentior: eo facilius curatur. Alterū illud ignorari non oportet: quod non omnibus ægris eadem auxilia conueniunt. ex quo incidit, ut alia, atq; alia summi authores quasi sola uendicarent: prout cuiq; æsserant. Oportet itaq; ubi aliquid non respondit, non tanti putare authorē, quanti ægrū: et experiri aliud, atq; aliud: sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus ut facit, sic etiam soluit: non statim condemnatur, si quid non statim profuit. minus uero remoueatur, si quid paulum saltem iuuat: quia profectus tempore expletur.

Altera dicitur
1

As et fortuna.
gal. 1. et 2. et 3.

LIBER

Quomodo morbi cognoscantur: Et an increscant, an consistant, an minuantur: Et qua ratione ab initio qui languere incipit, curari debeat, Caput. II.

Rotinus at inter initia scire facile est, quod acutus morbus, quis longus sit: non in his solis, in quibus semper ita se habet: sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones, et dolores graues urgent: acutus morbus est. Vbi lenti dolores, lentaeue febres sunt: et spatia inter accessiones porriguntur: acceduntque ea signa, quae in priore volumine exposita sunt: longum hunc futurum esse manifestum est. Videndum est est morbus an increscat, an consistat, an minuat: quia quaedam remedia increscentibus morbis, plura inclinantibus conueniunt. eaque quae decrescentibus apta sunt, ubi acutus increscens urget: in remissionibus potius experienda sunt. Increscit autem morbus dum grauioribus dolores, accessionesque ueniunt: haecque et antequam proxime reuertantur: et postea desinunt. Atque in longis quoque morbis etiam tales notas non habentibus, scire licet increscere: si somnus incertus est, si deterior concoctio, si foediores deiectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus, aut calor, si idem magis pallet. ea uero quae contraria his sunt: decedentis eius notae sunt. Praeter haec in acutis morbis serius ager alendus est: nec nisi iam inclinatis, ut primo dempta materia, impetum frangat. in longis maturius, ut sustinere spatium aduenturi mali possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte est: magis tamen ad rem pertinet uim totius corporis molliri, quam proprie partes egre sanentur. Multum etiam interest ab initio, quis recte curatus sit, an perperam. quia curatio minus his prodest: in quibus assidue frustra fuit. si quis temere habitus adhuc integris uiribus uiuit: admota curatione momento restituitur. sed cum ab his coeperim, quae notas quasdam futurae aduersae ualitudinis exhibent: curationum quoque principium ab animaduersione eiusdem temporis faciam. Igitur si quid ex his, quae proposita sunt in cedit: omnium optima sunt quies, et abstinentia. si quid bibendum, aqua idque interdum uno die fieri satis est. Interdum si terrentia manent, bi-duo, proximique abstinentiam sumendus est cibus exiguus: bibenda aqua: postera die etiam uinum. deinde inuicem alternis diebus, modo aqua, modo uinum, donec omnis causae metus finiatur. Per haec. n. saepe instans grauis morbus discutitur: plurimique falluntur, dum se primo die protinus sublaturus languore aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut uomitu, aut sudationibus, aut uino sperant. non quo non

Morbus acutus est

Morbus longus

Nutritus in morbo

interdum id incidat, aut non decipiat: sed quo sepius fallat, solâq; abstinentia sine ullo periculo medeatur. cū præsertim et pro modo terro-
 roris moderari liceat, et si leuiores inditia fuerint: satis sit à uino
 tātum abstinere: quod subtractū plusquam, si cibo quid dematur: ad-
 imat. si paulo grauiora, satis sit non aquam tantū bibere, sed etiā
 cibo carnem subtrahere. interdū panis quoq; minus, quā pro consue-
 tudine assumere: humidoq; cibo esse contentum, et olere potissimum. sa-
 tisq; sit, tum ex toto à cibo, à uino, ab omni motu corporis abstinere: cū
 uehementer notæ terruerunt. Neq; dubium est, quin uix quisquam, qui
 non dissimulauit, sed per hæc mature morbo occurrat: egrotet.

De febrium generibus, Caput. III.

Tq; hæc quidem sanis faciendæ sunt tantū causam me-
 tuentibus. sequitur uero curatio febriū: quod et in toto
 corpore, et uulgare maxime morbi genus est. Ex his una
 cotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum
 etiam longiore circuitu quædā redeunt. sed id raro euenit. In prio-
 ribus et morbi sunt, et medicinæ. At quartanæ quidē simplici-
 ores sunt: incipiunt ferè ab horrore, deinde calor erumpit: finitaq; febre
 biduum integrum est. ita quarto die reuertitur. Tertianarū uero duo
 genera sunt: alterū eodem modo, quo quartana et incipiens, et desi-
 nens, illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat in-
 tegrum: tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem
 die reuertitur: ex octo autem, et quadraginta horis ferè, sex, et tri-
 ginta per accessionem occupat: interdum etiā uel minus, uel plus. neq;
 ex toto in remissione desistit: sed tantum leuius est. id genus pleriq; mo-
 dici in *putrida* uel appellant. cotidiana uero uariæ sunt, et multiplices.
 Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horro-
 re. Frigus uero ubi extremæ partes mēbrorū malgescunt: horrore ubi
 totū corpus intremit. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur in-
 tegritas. aliæ sic, ut aliquantū quidem minuat ex febre: nihilomi-
 nus tamen quædā reliquiæ remaneant, donec altera accessio accedat:
 ac sepe aliæ uix quicquā aut nihil remittant: sed ita ut continuent.
 Deinde aliæ feruorē ingentem habent, aliæ tollerabilem: aliæ cotidie
 pares fiunt, aliæ impares. atq; inuicem altero die leniores, altero ue-
 hementiores: aliæ tempore eodem postridie reuertuntur. aliæ uel se-
 rius, uel celerius: aliæ diem, noctemq; accessionem, et decessionem
 implent: aliæ minus, aliæ plus: aliæ cum decedunt sudorem mo-
 ment: aliæ non mouent. atque aliās per sudorem ad integritatem

Abstinētia

Feb. quartana

Tertiana

Quotidiana

uenitur: aliis corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam modo singula singulis diebus fiunt: modo binæ, plures uel concurrunt. ex quo sæpe euenit ut cotidie plures accessiones, remissionesq; sint: sic tamen ut una quæq; alicui priori respondeat. Interdum uero accessiones quoq; confunduntur sic, ut neq; notari tempora earum, neq; spacia possint. Neq; uerum est quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex uomitâ, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. facilius enim semper curatio foret: si hoc uerum esset. Sed quod euidentes causæ faciunt: facere etiam abditæ possunt. neq; de re, sed de uerbo controuersiam mouent. qui cum aliter, aliterq; in eodem morbo febres accedant: non easdē inordinate redire: sed alias, aliasq; subinde oriri dicunt. quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret: etiā si uere diceretur. Tempora quoq; remissionum modo liberalia, modo uix ulla sunt.

De curationum diuersis generibus, Caput. IIII.

T februm quidem ratio maxime talis est. Curationum uero diuersa genera sunt: prout authores aliqui habent. Asclepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut iocunde curet. id notum est: sed ferè periculosa esse nimum et festinatio, et uoluptas solet. qua uero moderatione utendū sit: ut quantum fieri potest, omnia ista contingant: prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandū erit. et ante omnia queritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur: eo quod cruditatē maxime horrebant, deinde eam materiam, quæ lædere uidebatur: ducendo sæpius aluum subtrahabant. Asclepiades medicamentā sustulit: aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. febre uero ipsa præcipue se ad eius remediū uti professus est. Conuellēdas enim uires ægri putauit, luce, uigilia, siti ingenti, sic, ut ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis fallūtur qui per omnia iocundam eius disciplinam esse contendunt: et is enim ulterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit: primis uero tororis uicem exhibuit. Ego autem medicamentorū dari potiones, et aluū duci non nisi raro debere concedo. et id non ideo tamen agendum, ut ægri uires conuellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. minui ergo tantum materiam superantem oportet, quæ naturaliter digeritur: ubi nihil noui accedit. Itaq; abstinentus à cibo primis diebus est: in luce habendus æger, nisi infirmus interdū est. quo-

niam corpus ista quoque digerit: usque cubare quam maximo conclavi debet. Quod ad sitim uero somnumque pertinet: moderandum est, ut interdum uigilet: noctu, si potest, conquiescat. ac neque potest: neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi et si autem est, et ipsi fauces. quauis id tempus aptum potioni non est. Commodumque Erasistratus dixit saepe inferiore parte humorem non requirente, os, et fauces requirere: neque ad rem male haberi aegrum pertinere. Ac primo quidem sic tenendus est. Optimum uero medicamentum est, opportune cibibus datus: qui quando primum dari debeat: queritur. Plerique ex antiquis tarde dabant: saepe quinto die, saepe sexto. Et id fortasse uel in Asia, uel in Aegypto caeli ratio patitur. Asclepiades ubi aegrum tri-duo per omnia fatigarat: quarto die cibo destinabat. At Themison nusper non quando coepisset febris: sed quando desisset, aut certe leuata esset, considerabat: et ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris, statim: si accesserat, ubi ea uel desierat: uel si assidue inhaerebat: si certe se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus datus esse: potest secundo: potest tertio: potest non nisi quarto: aut quinto: potest post unam accessionem: potest post duas: potest post plures. Refert enim qualis morbus sit: quale corpus: quale coelum: quae aetas: quod tempus anni. minimeque in rebus multum inter se differetibus quod intermit-tendum non est. perpetuum esse preceptum temporis potest. In morbo, qui plus uirium aufert: celerius cibus dandus est. itemque eo caelo, quo magis digerit. Ob quam causam in Africa nullo die aeger abstinere recte uidetur. Maturius est puero, quam iuueni: aestate, quam hyeme dari debet. Vnum illud est, quod semper ubique seruandum est: ut aegri uires subinde assidens medicus inspiciat: et quandiu supererunt, abstinentia pugnet: si imbecillitatem uereri coeperit, cibo subue-niat. Id enim eius officium est, ut aegrum neque supernuacua materia one-ret: neque imbecillitatem fami prodat. Idque apud Erasistratum quoque inuenio: qui quauis parum docuit quando uenter, quando corpus ip-sum exinaniretur, dicendo tamen haec esse uisenda: et tum cibum dan-dum, cum corpori deberetur: satis ostendit dum uires superessent, dari non oportere: ne deficerent: consulendum esse. Ex his autem intelligi po-
test ab uno medico multos non posse curari: cumque, si artifex est: idon-
neum esse, qui non multum ab aegro recedit, sed qui quaestui serui-
unt, quoniam is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea prae-
cepta: quae sedulitatem non exigunt: ut in hac ipsa re. Facile est enim
dies uel accessiones numerare his quoque, qui aegrum raro uident. ille
assideat necesse est: qui, quod solum opus est, uisurus est: quando nimis

typs abung

Art 1/2

LIBER

Sect. 2/24
De signis huiusmodi
in gubnatis.

imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur: eosque, tanquam tunc de ægris iudicaretur, ut ipso uovs nominabant. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, quartusdecimus, uigessimus primus: ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni et uigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebant: ut dierum imparium accessiones expectarent. deinde postea cibum quasi leuioribus accessionibus instantibus darent: adeo ut Hippocrates si alio die febris desisset: recidivam timere sit solitus. Id Asclepiades in re uanum repudiavit. neque in ullo die ga par, imparue esset: his uel maius, uel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares fiunt: et oportunius post eorum accessiones cibum datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur: sitque grauior, qui remissior esse consueuerat. atque ipse quartusdecimus par est: in quo esse magnam antiqui fatebantur. Qui cum octauum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet: ipsi sibi repugnabant non octauum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendum, quasi potentiorē. Plus enim tribuebant nono, et undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione: ab undecimo non ad tertium decimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem ei, quem septimus dies liberaturus sit: quartum esse grauiissimum. Ita illo quoque authore in die pari et grauior febris esse potest: et certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum queng; diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit: id est quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimum septimum, in quo et ab impari ad paris rationem transit. et ne hoc quidem propositum conseruauit, cum a septimo die undecimus non quartus sed quintus sit. adeo apparet quacumque ratione ad numerum respeximus: nihil rationis sub illo quidem authore reperiri. Verum in his quidem antiquos tunc celebres ad modum pythagorici numeri fefellerunt: cum hic quoque medicus non numerare dies debeat: sed ipsas accessiones intueri: et ex his coniectare quando dandus cibum sit. Illud autem magis ad rem pertinet scire: num oporteat dari cum iam bene uenae conueniunt: aut etiam num manentibus reliquis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimētum offerebant. Asclepiades inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inherente. in quo unam rationem secutus est: non quo non sit interdum maturius cibum dandus, si mature timetur altera accessio: sed quo scilicet quam sanissimo dari debeat. Minus enim corrumpitur quod integro corpori infertur. Neque tamen uanum est

In 3 feb. ab eo

quod Themisoni videbatur, si duabus horis integer futurus esset aeger: satius esse tunc dare: ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset: id esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non praeter: satius esse principia cibi a decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. ita si longius tempus secundum est, quam integerrimo datus est: si breue, etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco uero integritas est, eodem est remissio: si qua maxime in febre continua potest esse. Atque hic quoque queritur utrum tot horae expectandae sint, quot febrem habuerunt: an satis sit primam partem earum praeteriri, ut aegris iocundius insidat, quibus interdum non ualet. Tutissimum est autem ante totius accessionis tempus praeterire. quauis ubi longa febris fuit: potest indulgeri aegro maturius: dum tamen ante minime pars dimidia praetereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est: sed in omnibus ita seruandum est.

De febrium speciebus, et singularum curationibus, et primo quando abus febricitantibus dandus sit. Caput. V.

Aec magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit: eaque uel ex inguine, uel ex lassitudine, uel ex aestu, aliaue simili re fuit sic, ut interior nulla causa metum fecerit: postero die cum tempus accessionis ita transijt, ut nihil mouerit: abus dari potest. At si ex alto calor uenit: et grauitas uel capitis, uel praecordiorum secuta est: neque apparet quid corpus confuderit, quauis unam accessionem secuta integritas est: tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: et ubi accessionis tempus praeterijt, abus dandus est, sed exiguus, quia quartana quoque timeri potest. Et die quarto demum: si corpus integrum est: eo cum fiducia utendum. Si uero postero, tertio uel, aut quarto die secuta febris est: scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum certus circuitus est: et finis integer: et quia liberaliter quieta tempora sunt: expeditior ratio est. De quibus suo loco dicam. Nunc uero eas explicabo, quae cotidie urgent. Igitur tertio quoque die abus aegro commodissime datur: ut alter febrem minuat: alter uiribus subueniat. sed his dari debet si quotidiana febris est, quae ex toto desinat: simul atque corpus integrum factum est: si, quauis non accessiones, febres tamen iunguntur: et cotidie quidem increscunt: sed sine integritate tamen remittunt: cum corpus ita se habet, ut maior

feb. et ea r. h. m. d.

LIBER

remissio non expectetur. Si altero die grauior: altero leuior accessio est post grauiorem. ferè uero grauiorem accessionem leuior nox sequitur. quo fit ut grauiorem accessionem nox quoq; tristior antecedit. At si continuatur febris: neq; leuior unquam fit: & dari cibum necesse est: quando dari debeat, magna quidem dissensio est. Quidam, quia ferè remissius matutinum tempus ægris est: tunc putant dandū. quod si respondet, non quia mane est: sed quia remissior est æger: dari dabet. Si uero ne tunc quidem ulla requies ægris est: hoc ipso peius id tempus est: quod cum sua natura melius esse debeat: morbi uitio non est. simulq; insequitur tempus meridianū: à quo cum omnis æger ferè peior fiat: timeri potest ne ille magis etiam quàm ex consuetudine urgeatur. Igitur alij uespere tali ægro cibum dari. sed cum eo tempore ferè pessimi sint, qui ægrotant: uerendum est, ne si quid tunc mouerimus: fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem decurro: id est finito iam grauissimo tempore, eodemq; longissime distante: secuturus uero ante lucanis horis, quibus omnes ferè maxime dormiunt: deinde matutino tempore, quod natura sua leuissimum est. Si uero febres uagæ sunt: quia uerendum est: ne cibum statim subsequantur: quandoq; quis ex accessione leuatus est: hunc debet assu mere. At si plures accessiones eodem die ueniunt: considerare oportet, pares ne per omnia sint: quod uix fieri potest: an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem cibus dari debet: quæ non inter meridiem, & uesperum desinit. Si impares sunt: considerandum est quo distent. Nam si altera grauior, altera leuior est: post grauiorem dari debet. si altera longior, altera breuior: post longiorem. si altera grauior, altera longior est: considerandum est utra magis affligat: illa ui, an hæc tempore: & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest: quantæ: qualesq; inter eas remissiones sint. Nā si post alteram febrem motio manet: post alteram integrum corpus est: integro corpore cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet: sed alterum tamen longius tempus remissionis est: id potius eligendum est: adeo ut ubi accessiones continuantur, protinus inclinata priore datus cibus sit. Et enim perpetuū est, ad quod omne cōsiliū dirigi potest: cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere: & hoc saluo dare quàm integerrimo corpori. quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. sed cū sit aptissimū tertio quoq; die cibum dare: tamē si corpus infirmum est, cotidie dandus est: multoq; magis si continentes febres sine remissione sunt: quanto magis corpus affligunt: aut si duæ, pluresue accessiones eodē die ueniunt. Quæ res effiat, ut & à primo die protinus

ipsa uisum
mandatum
uaple
Nocturnum

huc a

die protinus cibus dari cotidie debeat. Si protinus uenæ considerunt: & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde uis corpori deest. Illud tamen in his seruandū est: ut post eas febres minus cibi datur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum uero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiat: scire licet optimum cibo tempus esse febre finita. deinde cum decessio eius consistit. tertium si necesse est, quandoque decedit, cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistere iam incremento febris aliquid offerre: quàm increscente. Satius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque hercule satis est ipsas tantum febres medicum intueri: sed etiam totius corporis habitum: & ad eum dirigere curationem, seu supersunt uires, seu desunt: seu quidā mali affectus interueniunt. Cum uero semper agros securos agere conueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcipue ubi cibum sumpserunt. Itaque si qua sunt quæ exasperatura eorum animos sunt: optimum est eadem agrotantium noticiæ subtrahere. si id fieri non potest: sustinere tamen post cibum usque somni tempus, & cum experfecti sunt, tunc exponere.

Qua febris

Quando potiones febricitantibus dari expediat. Caput. VI.

Ed de cibo facilior quidem cum aëris ratio est: quorum sæpe stomachus hunc respuit: et si mens concupiscit. De potione uero ingens pugna est: eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit: & tum maxime aqua exigit, cū illa periculosissima est. Sed docendus æger est ubi febris conuiuenerit, protinus sitim quoque quieturam: longioremque accessione fore, si quod ei datum fuerit alimentum. ita celerius eum desinere sitire qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani famem, quàm sitim sustinent: tanto magis ægri in potione, quàm in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito sic uenæ considerunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo uero, cæterisque etiam quibus cibus non dabitur: tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidē ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret: ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet: expedire quoque per modicas potiones misceri nouam materiam corruptæ. illud uidendum est, ut qualia tempora cibo leguntur: talia potioni quoque, ubi sine illo datur, delignantur: aut cum ægrum dormire cupimus. quod ferè sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus

Aurelij Cor.

e

nimius humor alienus sit: tum præcipue esse foeminis, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cū tempora cibo, potioniq; febris et remissio- nis ratio det: non est expeditissimū scire, quādo æger febricitet: quan- do melior sit: quando deficiat: sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei: quia sæpe istæ lenio- res, celerioresue sunt & ætate, & sexu, & corporū natura. Et ple- runq; satis sano corpore si stomachus infirmus est: nonnunquam et incipiente febre subeunt, & quiescunt: ut imbecillus is uideri possit, cui facile laturo grauis instat accessio. Contra sæpe eas concitat, & re- soluit sol, balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi affectus: adeo ut cum primum medicus uenit, sollicitudo ægri dubitantis quomodo ille se habere uideatur: eas moueat. ob quam cau- sam periti medici est, non protinus ut uenit apprehendere manu bra- chium. sed primum residere hilari uultu: percontariq; quemadmo- dum se habeat: & si quis eius metus est, eum probabili sermone leni- re. tum deinde eius corpori manum admoouere. quas uenas autem cōspectus medici mouet: quā facile mille res turbant. Altera res est, cui credimus: calor æque fallax. nā hic quoq; excitatur æstu, labore, somno, metu, sollicitudine. igitur intueri quidē omnia etiam ista opor- tet. sed his non omnia credere: ac protinus quidem scire non febricitare eum, cuius uenæ naturaliter ordinatæ sunt: teporq; talis est, qua- lis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore, motuq; febrem se se concipere: sed ita si summa quoq; arida inæqualiter cutis est: si calor & in fronte est: & ex imis præcordijs oritur. si spiritus ex naribus cum feruore prorumpit: si color aut rubore, aut pallore nouo muta- tus est: si oculi graues, & aut persici, aut subhumidi sunt: si sudor cū fit, inæqualis est: si uenæ non æquis interuallis mouentur. Ob quam causam medicus neq; in tenebris, neq; à capite ægri debet residere: sed illustri loco aduersus eum, ut omneis notus ex uultu quoq; cubantis perspiciat. Vbi uero febris fuit, atq; decreuit: expectari oportet num tempora, partesue corporis aliæ paulum madescant: quæ sudorē uen- turum esse testentur. ac si qua nota est, tunc demum dare potui cali- dam aquam: cuius salubris effectus est, si sudorē per omnia membra diffundit. Huius autem rei causa continere æger sub ueste satis multa manus debet: eademq; crura, pedesq; contigere: qua male pleriq; ægros in ipso impetu febris, pessimeq; ubi ardens ea est, male habent. si sudare corpus cœpit, linteum tepescere oportet: paulatimq; singu- la membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est: aut si is non ue- nit: ubi quā maxime potuit: idoneus esse cibo æger uidetur: sub ueste leniter unguendus est: tum detergendus: deinde ei cibus dandus. Cibus

ad quædam huius
deputat medicus

autem febricitantius humidus est aptissimus, aut humori certe q̄ proximus: utiq; ex materia quā leuissima, maximeq; sorbitio. eaq; si magnæ febres fuerunt, quā tenuissima esse debet. Mel quoq; despumatum huic recte adiatur: quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, superuacuum est: sicut ipsa quoq; sorbitio. Dari uero in uicem eius potest, uel intrita ex aqua calida, uel alia elota. Si firmus est stomachus, & compressa alius: ex aqua mulsā. si uel ille languet, uel hæc profluit, ex posca. Et primo quidē cibo id satis est. secundo uero aliquid adijci potest: ex eodem tamen genere materie, uel olus, uel conchilium, uel pomum. Et dum febres quidē crescunt, hic solus idoneus cibus est. Vbi uero aut desinunt, aut leuantur: semper quidē incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adijciendū uero aliquid ex media, ratione habita subinde & uirium hominis, & morbi. Ponendi uero ægro uarij cibi sicut Asclepiades præcepit: tum demum sunt, ubi fastidio urgetur: neq; satis uires sufficiunt, ut paulum ex singulis degustando famē uitet. At si neq; uis, neq; cupiditas deest, nulla uarietate sollicitandus æger est: ne plus assumat, quā concoquat. Neq; uerum est, quod ab eo dicitur: facilius concoqui cibos uarios. edūtur enim facilius. ad concoctionem aut materie genus, & modus pertinent. Neq; inter magnos dolores, ut neq; crescente morbo tutū est, ægrū cibo impleri: sed ubi inclinata iam in melius ualeitudo est. sunt aliæ quoq; obseruationes in febribus necessariae. atq; id quoq; uidendū est, quod quidam solum præcipiunt: an astrictum corpus sit: an profluet. quorum alterum strangulat quod continet: alterum digerit. nam si astrictum est, ducenda alius est: mouenda urina, eliciendus omni modo sudor. in hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse uehementibus gestationibus, corpus in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, uigiliam prodest. vtile est etiam ducere in balneum: prius demittere in solium: tum ungere: iterum ad solium redire: multaq; aqua fouere inguina: interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere: uti cibo rariius, & serius tenui, simplicia, molli, calido, exiguo, maximeq; oleribus, qualia sunt, lapatium, urtica, malua, uel iure etiam concharum, musculorum ue, aut locustarum: neq; danda caro nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis & ante cibum, & post hunc: & cum hoc ultra quā sitis coget. Poteritq; à balneo et pinguius, aut dulcius dari uinum. poterit semel, aut bis interponi græcum salsum. Contra uero si corpus profluet, sudor coercendus: quies adhibenda erit tenebris: somnoq; quandoq; uolet, utendum. non nisi leni gestatione corpus agitandum: & pro genere mali subueniendum. Nam si uenter fluit: aut si stomachus non continet, ubi febris

prolus febricitant

*fastidius rariius
abundantius*

decreuit, liberaliter oportet aquam tepidā potui dare, & uomere co-
gere: nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet: aut uetus morbus
est. Si uero sudor exercet, duranda cutis est uel nitro, uel sale: quæ cū
oleo miscentur. At si lenius id uitium est, oleo corpus ungendum est: si
uehementius, rosa, uel melino, uel myrteo: cui uinum austerum sit adie-
ctum. Quisquis autem fluore æger est: cum uenit in balneum, prius
ungendus: deinde in solium demittendus est. Si in cute uitium est: fri-
gida quoq; quā calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum uentum
est: dari debet is ualens, frigidus, siccus simplex, qui quam minime
corrumpi possit: panis tostus, caro assa, uinum asperum, uel certe subau-
sterum: si uenter profluit, calidum: si sudores nocent, uomitusq; sunt,
frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant. Caput. VII.

Esiderat etiam propriam animaduersionem in febribus
d pestilentie casus. In hac minime utile est, aut fame, aut me-
dicamentis uti: aut ducere aluum. Si uires sinunt, sangui-
nem mittere optimum est: præcipueq; si cum dolore fe-
bris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut lenata
est: uomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quā in alijs mor-
bis ducere in balneum opus est: uinum calidum, & meracius dare,
& omnia glutinosa. inter quæ quoq; carnem generis eiusdem. Nam
quo celerius eiusmodi tempestates corripunt: eo maturius auxilia, etiā
cum quadam temeritate rapienda sunt. Quod si puer est, qui labo-
rat: neq; tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit: siti ei utendum
est: ducenda aluus, uel aqua, uel ptisanæ cremore: tum demum is leui-
bus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri ut uiri curari debent.
Ergo, ut in alio quoq; genere morborum parcius in his agendum est.
Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare
uigilia, fame uel, aut nimia siti, conuenit. Vomitus post febrem elicien-
dus est: deinde dandus cibus ex leuissimis: tum is dormiat: postero
quoq; die si febris manet, abstineatur. Tertio ad similem cibum re-
deat. Dandaq; opera est quantum fieri potest, ut inter oportunam ab-
stinentiam cibosq; oportunos, omissis cæteris, nutriatur. Si uero ardens
febris extorrei: nulla medicamenti danda potio est: sed in ipsis acce-
sionibus oleo, & aqua refrigerandus est: quæ misenda manu sunt, do-
nec albesant: & conclauī tenendus, quo multum, & purum aërem
trahere possit: neq; multis uestimentis strangulandus, sed admodum le-
uibus tantum uelandus est. Possunt etiam super stomachum imponi
folia uitæ

folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. alendus maturius est: id est à die tertio, & ante cibū. isdē perungendus. Si pituita in stomacho coijt: inclinata iam accessione uomere cogendus est: & tunc dandum frigidum olus: aut pomum ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus, protinus uel ptisanæ, uel alicæ, uel orizæ cremor dandus est: cū quo recens adeps coctus sit. Cum uero in summo incremento morbus est: utiq; non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat et ultra satietatem: & cū iam uenter, & præcordia ultra modū repleta, satisq; refrigerata sunt: uomere debet. Quidā ne uomitū quidem exigunt: sed ipsa aqua frigida, tantū ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Vbi utrunlibet factum est: multa ueste operiendus est: & colloandus ut dormiat. Fereq; post longam sitim, & uigiliā, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus uenit, per quem ingens sudor effunditur. idq; præsentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus præter ardorem nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibēs uel in thorace, uel in pulmone, uel in faucibus, non ulcus, non deiectio, non profluium alui fuit. Si quis autem in eiusmodi febre leuiter tussit, is neq; uehementi siti conflictatur: neq; bibere aquam frigidam debet: sed eo modo curandus est quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semitertianæ febris quæ hemitritæos dicitur. Caput. VIII.

T ubi id genus tertianæ est, quod à ueteriorū medici appellant: magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunq; frequentiores accessiones, deaccessionesq; ut aliud morbi genus uideri possit: porrigitq; febris inter horas uiginti quatuor et triginta sex, ut quod idem est: non idem esse uideatur. Et magnopere necessarium est, neq; dari cibum, nisi in ea remissione, quæ uera est: & ubi ea uenit, protinus dari: plurimiq; sub alterutro curantis errore subito moriuntur. ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet: tum dari cibum, qui neq; incitet febre: & tamen longum eius spatium sustineat.

Curatio lentarum febrium. Caput. IX.

N onnunquam etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent: ac neq; cibo, neq; ulli remedio locus est. In hoc casu medicū cura esse debet, ut morbū mutet. Fortasse enim curationi

Aurelij Cor.

e iij

oportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectū, corpus eius per tractandū est. quoniam interdum sic euenit, ut horror oriatur: et fiat initium quoddam noui motus: exq; eo cum magis corpus incaluit: sequatur et remissio. In his frictio quoq; ex oleo, et sale salubris uidetur. at si diu frigus est et torpor, et iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres, aut quatuor cyathos: uel cum cibo uinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris, et maior ortus calor, simul et priora mala tolli: et spem remissionis in ea curatione ostendit. Neq; hercule ista curatione noua est: qua nunc quidam traditos sibi ægros, qui sub cautiore medicis trahebantur: interdum contrarijs remedijs sanant. si quidem apud antiquos quoq; ante Erophilum, et Erasistratum, maximeq; post Hippocratem fuit Petro quidam qui febricitantem hominem ubi acceperat, multis uestimentis operiebat: ut simul calorem ingentem, sitimq; excitaret. Deinde ubi paulum remitti acceperat febris, aquam frigida potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se ægrum indicabat. si non mouerat, plus etiam aque frigide ingerebat: et tum uomere cogebat. si alterutro modo febre liberauerat: protinus suilla assam, et uinum homini dabat. si non liberauerat: decoquebat aquam sale adiecto, eamq; bibere cogebat, ut mouendo uentrem purgaret. et intra hæc omnis eius medicina erat. eaq; non minus grata fuit his: quos Hippocratis successores non refecerant: quam nunc est his, quos Erophi, uel Erasistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neq; ideo temen non est temeraria ista medicina: quia plures, si protinus a principijs excipit: intereunt. Sed cum eadē omnibus conuenire non possint: fere quos ratio nō restituit: temeritas adiunat. Ideoq; eiusmodi medicini melius alienos ægros, quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoq; hominis et nouare interdū: et augere morbi: et febres accendere: ga curationē, ubi id quod est, nō recipit: potest recipere id, quod futurū est.

Remedia in febris ad capitis dolorem, et præcordiorum inflammationem, et ariditatem, et sabritiem lingue. Caput. X.

Dolor Capitis.

Considerandum etiam est febres ne solæ sint: an alia his quoq; mala accedant. id est num caput doleat: num lingua aspera: nū præcordia intēta sint. si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, et in id ingerere: deinde habere duo pittacia, quæ latitudine frontis, longitudineq; æquet. Ex his inuicem alterū in aceto et rosa habere, alterum in fronte: aut intinctam hisdem lanam succidam imponere. si acetū offendit, pura

rosa utendum est. Si rosa ipsa laedit, oleo acerbo. si ista parum inuani-
teri pōt uel iris arida, uel nuxes amaræ, uel quælibet herba ex refri-
gerantibus. Quorū quidlibet ex aceto impositum dolorē minuit: sed
magis aliud in alio. Inuat et panis cum papauere iniectus, uel cum
rosa, cerussa, spuma uel argenti. Olfacere quoq; uel serpillum, uel ane-
thum non alienum est. At si in præcordijs inflammatio, et dolor est:
primo super imponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidio-
ra fuerint: plus eō materia concurrat. Deinde ubi prima inflamma-
tio se remisit: tunc demum ad calida, et humida ueniendū est: ut ea
quæ remanserint, discutiant. Notæ uero inflammationis sunt quatuor,
rubor, et tumor cum calore, et dolore. Quo magis errauit Eras-
stratus, qui febrē nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflamma-
tione dolor est: nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris
soluit. At si neq; inflammatio, neq; febris, sed tantum præcordiorum
dolor est: protinus calidis, et siccis fomentis uti licet. Si uero lingua
siccā est, et scabra: detergenda primum penicillo est ex aqua calida.
deinde ungenda mixtis inter se rosa, et melle. Mel purgat: rosa repri-
mit: simulq; siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi
penicillo detergā est: ungi rosa debet: cui ceræ sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem præcedit. Caput. XI.

Olet et ante febres esse frigus, idq; uel molestissimū mor-
bi genus est. Vbi id expectatur, omni potione prohiben-
dus æger est. hæc enim paulo ante data multum mali
adijcit. Item maturius ueste multa tegendus est. admonen-
da partibus his, pro quibus metumus, sicca et calida fomenta, sic, ne
statim uehementissimi calores incipiant: sed paulatim accrescant. Per-
fricadæ quoq; eæ partes manibus unctis ex uetere oleo sunt: eiq; adij-
ciendum aliquid ex calefacientibus. Contentiq; medici quidam una fri-
ctione et ex quolibet oleo sunt. In harū febrū remissionibus nonnulli
tres, aut quatuor sorbitionis cyathos etiam nam ultra manente febre
dant. deinde ea bene finita reficiunt stomachum cibo frigido, et leni.
Ego tum hoc puto tentandum, cum parū abus semel et post febrem
datus prodest. sed curiose perspicendū est, ne tempus remissionis de-
cipiat. Sæpe enim in hoc quoq; genere ualetudinis iam minui febris
uidetur: et rursus intenditur. itaq; ei remissioni credendum est: quæ
etiam immoratur: et iactationem, factoremq; quendam oris, quem
ὄζερ græci uocant, minuit. Illud satis auenit, si cotidie pares accessio-
nes sunt: cotidie paruum cibum dandum. si impares, post grauiorem
cibum: post leuiorem, aquam mulsam.

e iij

inflam. fev.

Dolor

*lingua arida
et scabra.*

Frigus

Horror

Horror autem eas ferè febres antecedit: quæ certū habent circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoq; tutissimæ sunt, maximeq; curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt: neq; alui ductio, neq; balneum, neq; uinum, neq; medicamentum aliud recte datur. incertū est enim quando febris uentura sit: ita fieri potest, ut si subito uenerit, summa in eo perniciēs sit: quod auxilij causa sit inuentū. Nihilq; aliud fieri pōt, quā ut primis diebus bene abstineatur æger. deinde sub decessu febris eius, quæ grauissima est: cibūumat. at ubi certus circuitus est: facilius oīa illa tentantur: quia facilius proponere nobis et accessiōnū, & deaccessiōnū uices possumus. In his autem cum ueterauerunt: utilis famis non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est: deinde diuidenda curatio est: & ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit: dare ei oportet potū tepidam aquam subsalsam, & uomere eum cogere. nam ferè talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. idem faciendū est, si proximo quoq; circuitu æque cessit: sæpe enim sic discutitur. iamq; quod genus febris sit, scire licet. itaq; sub expectatione proxime accessiōis, quæ instare tertia potest: deducendus in balneum est: dādāq; opera est, ut per tempus horroris in solio sit. si ibi quoq; senserit: nihilominus idem sub expectatione accessiōis quartæ faciat. si quidem eo quoq; modo sæpe id discutitur. si nec balneū quidem profuit: ante accessiōnem allium edat: aut bibat calidā aquam cum pipere: si quidem ea quoq; assumpta calorem mouent, qui horrorem nō admittit. Deinde eo modo quo in frigore præceptū est: anteq̃ inhorrescere possit, opiatur. Fomentisq; protinus ualidioribus totum corpus circumdare conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis, & titiōibus. Si nihilominus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa uestimenta perfundatur: cui æque ex calefacientibus aliquid sit adiectum. adhibeaturq; frictio quantam is sustinere poterit, maximeq; in manibus, & pedibus: & spiritum ipse contineat. neq; desistendum est etiam si horror est. sæpe enim pertinacia iuuantis malum corporis uincit. Si quid euomuit, danda aqua tepida: iterumq; uomere cogendus est: utendumq; eisdē est, donec horror finiatur. Sed præter hæc, ducenda alius est, si tardius horror quiescit: si quidem id quoq; exonerato corpori prodest. Vltima quoq; post hæc auxilia sunt gestatio, & frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maxime dandus est: qui mollem alui præstet. Caro glutinosa, uinum cum dabitur, austerum.

Curatio

Curatio cotidiane febris. Caput. XIII.

Haec ad omnes circuitus februm pertinent. discernendae tamen singulae sunt: sicut ratione habent dissimilem. si cotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet: tum cibis altero quoque die uti. si res inueterauerit, post febrem experiri balneum, et uinum, magisque si horrore sublato haec superest.

Curatio tertianae febris. Caput. XIII.

In tertiana uero, quae ex toto intermittit, aut quartana est: medijs diebus et ambulationibus uti oportet, alijsque exercitationibus, et unctionibus. quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus in hoc genere morborum multo ante accessionem caput aegri multa calida aqua perfundebat: deinde uinum dabat. quod quauis plerumque eius uiri praeccepta secutus est Asclepiades, recte tamen praeteriit. Est enim anceps ipse, si tertiana febris est: tertio die post accessionem dicit aluum duci oportere. quinto post horrorem uomitum elicere. deinde post febrem, sicuti illi mos erat, adhuc calidis dare cibum, et uinum. sexto die in lectulo detineri. sic enim fore ne septimo die febris accedat. Id saepe fieri posse uerisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur tria remedia, uomitus, alui ductionis, uini potus per triduum: id est die tertio, et quinto, et septimo tentare. nec uinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus non est: inciditque in uetustatem, quo die febris expectabitur: in lectulo se contineat: post febrem perfricetur: tum cibo assumpto bibat aquam. postero die, quo cibo uacat, et ab exercitatione, unctioneque aqua tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si uero imbecillitas urgebit: et post febrem uinum, et medio die paulum cibi debebit assumere.

Curatio quartanae febris. Caput. XV.

Eadem in quartana facienda sunt. Sed cum haec tarde ad modum finiatur, nisi primis diebus discussa est: diligentius ab initio praecipendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaque desit: eodem die, et postero, tertioque continere se debet: et aquam tantummodo calidam primo die post febre sumere: biduo proximo quantum fieri poterit ne hanc quidem. si quarto die cum horrore febris reuertitur, uomere

sicut ante præceptum est: deinde post febrem modicum cibum sumere, uini quadrantem. Postero, tertioque die abstinere: aqua tantummodo calida, si sitiet, assumpta: septimo die balneo frigus præuenire: abstinere, continere se debet: et aqua tantummodo calida si sitiet: ac tum ita nono die balneo frigus præuenire: si febris redierit, ducere alium. ubi ex eo corpus conquiuerit, in unctione uehementer perfricari: eodem modo sumere cibum et uinum: biduo proximo se abstinere frictione seruata. decimo die rursus balneum experiri: et si postea febris accessit, æque perfricari. uinum copiosius bibere. ac si proximum est quies tot dierum, ut abstinentia cum cæteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si uero nihilominus remanet: aliud ex toto sequendum est curationis genus: idque agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet: qui primis diebus ducenda alium: deinde abstinendum usque in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit: tamen etiam febre liberatus, uix refectio ualebit. adeo si febris sæpius accesserit: concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit: balneum neque ante febrem, neque post eam tentandum erit: nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per cadem quæ supra præscripta sunt expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi: et uehementer perfricari: cibum et ualidum, et fortiter assumere. uino uti quantum libebit. postero die cum satis quiuerit, ambulare, exerceri, ungi, perfricari fortiter: cibum accipere sine uino: tertio die abstinere. quo die uero febrem expectabit: ante surgere, et exerceri, dareque operam non oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. sic. n. sæpe illa distat. At si in opere occupauit: tum demum se recipere. In eiusmodi ualitudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, uinum. Si uenter astrictus est, soluendus est. Sed hæc facile ualidiores faciunt. si imbecillitas occupauit: pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet: adhibenda tamen frictio est. si hæc quoque uehemens onerat: intra quietem, et unctionem, et cibum sistendum est: dandaque opera est, ne qua cruditas in cotidianam id malum uertat. Nam quartana neminem ingulat. sed si ex ea facta cotidiana est: in malis æger est. Quod tamen nisi culpa uel ægri, uel curantis nunquam fit.

Et multus sci.
m. 6.

Curatio duarum quartanarum. Caput. XVI.

T si duæ quartanæ sunt: neque hæ, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est: aut si id difficile est, leniter ambulare: considerare diligenter in uino.

lulis pedibus, & capite. Quoties febris accessit, & desit, cibum modicum sumere, & vinum. reliquo tempore nisi imbecillitas urget: abstinere. Aut si duæ febres penè iunguntur, post utrâq; cibum sumere. deinde uano tempore & moveri aliquid, & post unctionem cibo uti. Cum uero uetus quartana raro, nisi uere solvatur: utiq; eo tempore attendendum est ne quid fiat, quod ualitudinem impediat. Prodestq; in uetere quartana mutare subinde uictus genus: à uino ad aquam: ab aqua ad uinum: à lenibus cibis ad acres: ab acris ad lenes transire: esse radicem: deinde uomere: iure uel pulli gallinacei uentrem resolueri: oleum ad frictiones adijcere: calefactione ante accessionem sorbere, uel aceti cyathos duos, uel unum sinapis cum tribus græci uini salsi, uel mixta paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, lafer, myrram. per hæc enim similiaq; corpus agendum est, ut moueatur ex eo statu quo detinetur. Si febris quiescit, diu meminisse eius diei conuenit: eoq; uitare frigus, calorem, cruditatē, lassitudinē. Facile enim reuertitur: nisi à sano quoq; aliquandiu timetur.

Curatio cotidiane febris, quæ ex quartana facta sit. Caput. XVII.

T si ex quartana cotidiana facta est: cum id initio inaderit, per biduum abstinere oportet. frictione uti: aquam tantummodo uesperis potui dare. tertio die sæpe fit ne febris accedat. sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus. at si manet: per biduum abstinentia, quanta maxime imperari corpori potest: frictione cotidie utendum est.

De tribus insanie generibus: & primo de eius curatione, quæ à græcis phrenitis dicitur. Caput. XVIII.

T februm quidem ratio exposita est. supersunt uero alij corporis affectus: qui huic superneniunt. ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt: protinus iungam. Incipiam ab insanis: primamq; huius ipsius partē agrediar: quæ et acuta, et in febre est: græci *φρενίτις* appellant. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione ægros desipere: et loqui aliena. Quod non quidē leue est: neq; incidere potest, nisi in febre uehementi: non tamen æque pestiferum est. Nam plerumq; breue esse consuevit: lenatq; accessionis impetu protinus mens redit. Neq; id genus morbi remedium aliud desiderat: quàm quod in curanda febre præceptum est. Phrenitis uero tum demum est: cum continua demencia esse incipit: aut cum æger quauis adhuc sapiat: tamen quasdam na-

Polus mulatio

Phrenitis

De huius

Phrenitis

LIBER

nas imagines accipit. perfecta est ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt: si quidem ex phreneticis alij hilares, alij tristes sunt: alij facilius continentur, et intra uerba desipiunt. alij consurgunt, & uiolenter quaedam manu faciunt. atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu peccant: alij etiam artes adhibent: summamq; spem sanitatis in captandis maiorum operum occasionibus præbent: sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos qui intra uerba desipiunt, aut leuiter etiam manu peccant: onerare asperioribus coercionibus superuacuum est. Eos uero qui uiolentius se gerunt, uincere conuenit: ne uel alteri, uel sibi noceant. Neq; credendum est si uinctus aliquis dum leuari uinculis cupit: sanum iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur: quoniam is dolus insipientis est. Fere uero antiqui tales ægros in tenebris habebant: eo quod eis contrarium esse exterreri: & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades tanquam tenebris ipsis terrentibus in lumine habendos esse dixit neutrum tamen perpetuum est: alium enim lux, alium tenebræ magis turbant. reperiunturq; in quibus nullum discrimen deprehendi uel hoc, uel illo modo possit. Optimum itaq; est utrunq; experiri: & habere eum, qui tenebras horret, in luce: eum q; lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, æger si uires habet, loco lucido: si non habet, obscuro continendus est. Remedia uero adhibere ubi maxime furor urget, superuacuum est. simul enim febris quoq; increscit. itaq; tunc nihil nisi continendus æger est. Vbi uero res patitur, festinanter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit his sanguinem mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quod neq; insania esset, nisi febre intenta: neq; sanguis nisi in remissione eius recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quæsiuit, cuius intentio febris somnum impediatur: & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaq; hoc quoq; auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo recte fiunt aliàs omittenda. & continuata quoq; febris habet tempora: quibus & si non remittit, non tamen crescit. Estq; hoc ut non optimum, sic tamen secundum remedium tempus. Quod si uires ægri patiuntur, sanguis quoq; mitti debet. Nec minus deliberari potest an alius ducenda sit. tum interposito die conuenit caput ad cutem tondere: deinde aqua fouere. in aqua uerbenæ aliquæ decoctæ sint, uel ex reprimentibus: aut prius fouere: deinde tondere: & iterum fouere: ac nouissime rosa caput, naresq; implere: offerre etiam naribus rutam ex aceto contritam: mouere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus uires non defunt. Si uero imbecillitas est,

Vincula

Transfuso

rosa tantum caput adiecto serpillio, similiq; aliquo madefaciendū est. Utiles etiam in quibusq; uiribus herbae duae sunt, solanum, & muralis: simul ex utraq; succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit, frictione utendum est. partius tamen in his qui nimis hilares, quam in his qui nimis tristes sunt. Aduersus omnium autē sic insaniensium animos, gerere se pro cuiusq; natura necessarium est. Quorundā enim uani metus leuandi sunt: sicut in homine praediuite famē timente incidit: cui subinde falsae hereditates nunciabatur. Quorundā audacia coercenda est: sicut in his fit, in quibus continēdis plagae quoq; adhibentur. Quorundā etiā intempestiuus risus & oburgatione, & minis prohibendus est. Quorundā discutiendae tristes cogitationes: ad quod symphoniae, & cymbala, strepitusq; proficiunt. Saepe tamen assentiendum, quam repugnandū est. paulatimq; & non euidenter ab his, quae stulte dicuntur, ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiā elicienda ipsius intentio, ut fit in hominibus studiose literarum quibus liber legatur: aut recte si delectantur: aut perperam, si id ipsum eos offendit. emendando enim conuertere animum incipiunt. Quin etiam recitare si qua meminerunt cogendi sunt. Ad cibum quoq; quosdam non desiderantes reduxerunt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt. Omnibus uero sic affectis somnus & difficilis, & praecipue necessarius est. sub hoc enim pleriq; sanescunt. Prodest ad id, atq; etiam ad mentem ipsam componendam crocinum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus uigilant hi, quidam somnum moliantur potui dando aquam, in qua papauer, aut uoscuus decocta sit: alij mandragorae mala puluino subiiciunt: alij uel amonium, uel sicamini lachrymam fronti inducunt. hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum graeci morū σινούριον appellant: mori nulla lachryma est. sic uero significatur lachryma arboris in Aegypto nascētis: quā ibi μωπόσυον appellāt. Plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Aesclepiades ea superuacua esse dixit, quoniam in Leithargum saepe cōpellerent. Praecipit autē ut primo die à cibo, potione, somno abstinere: uespere ei daretur potui aqua: tunc frictio admoueretur lenis, ita ut ne manum quidem qui friatret, uehementer imprimeret. postero deinde die hisde omnibus factis, uespere ei daretur sorbitio, et aqua: rursusq; frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut illo confitente nimirum frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, quae hic quoq; necessaria est: ne quem obdormire uolumus;

Somnus periculis

excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnum sila-
 nus iuxta cadens: uel gestatio post cibum & noctu, maximèq; suspen-
 si lecti motus. Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est:
 neque mens constat: neque somnus accedit: occipitio inciso cucurbitu-
 lam admonere. quæ quia leuat morbum, potest etiam somnum fa-
 cere. Moderatio autem in cibo quoq; adhibenda est. Nam neq; imple-
 nus eger est, ne insaniat. neq; ieiunio utiq; uexandus est, ne imbecilli-
 tate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximèq;
 sorbitione, potione aquæ mulsæ: cuius ternos cyathos bis hyem: quater
 æstate dedisse satis est. *Alterum* genus insanæ est: quod spatium lon-
 gius recipit: quia fere sine febre incipit: leues deinde febriculas exci-
 tat: & consistit in tristitia, quam uidetur bilis atra contrahere. in hac
 utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est absti-
 nentia: secunda per album ueratrum, uomitumq; purgatio. post utrū-
 libet adhibenda bis die frictio est. si magis ualet, frequens etiā exer-
 citatio. In ieiunio uomitus: cibus sine uino dandus ex media materia
 est. Quam quotiens posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari
 posse: dum ne ea sola quis utatur: ualentissima tantummodo esse remo-
 uenda. præter hæc seruanda aliud est quàm tenerrima. remouendi
 terrores, & potius bona spes afferenda. quærenda delectatio ex fabu-
 lis, ludisq; quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua
 sunt ipsius opera: & ante oculos eius ponenda. Leuiter obiurganda
 uana tristitia. Subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ sollicitant:
 cur non potius letitiæ, q̃ sollicitudinis causa sit. Si febris quoq; accessit,
 sicut aliæ febres curanda est. *Tertium* insanæ genus est ex his lon-
 gissimum, adeo ut uitam ipsam non impediat: quod robusti corporis
 esse consuevit. huius autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam ima-
 ginibus, non mente falluntur: qualem insanientem Aiacem, uel Ore-
 stem poetarum fabulæ ferunt. quidam animo desipiunt. Si imagines
 fallunt: ante omnia uidendum est, tristes, an hilares sint. In tristitia ni-
 grum ueratrum deiectionis causa: in hilaritate album ad uomitum
 excitandum dari debet. idq; si in potione non accipit: pani adijcien-
 dum est, quo facilius fallat. nam si bene se purgauerit: ex magna par-
 te morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum ueratrum parum pro-
 fecerit: interposito tempore iterum dari debet. Neq; ignorare oportet, le-
 uiozem esse morbum cum risu, quàm serio insanientium. Illud quoq;
 perpetuum est in omnibus morbis: ubi ab inferiore parte purgandus
 aliquis est, uentrem eius ante soluendum esse: ubi à superiore, compri-
 mendum. Si uero consilium insanientem fallit: tormentis quibusdam
 optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, uinctu-

lis, plagis coercendus est. Cogendus est & attendere, & ediscere aliquid, & meminisse. sic enim fiet ut paulatim metu cogatur considerare quid faciat. subito etiam terreri, & expauescere in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animum uehemèter perturbat. Potest enim quedam fieri mutatio: cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Interest etiam si ipse sine causa subinde rideat: an mestus, demissusq; sit. nam demens hilaritas terroribus his, de quibus supra dixi: melius curatur. si nimia tristitia est: prodest lenis, sed multa bis die frictio. Itè per caput aqua frigida infusa: demissumq; corpus in aqua, & oleum. illa communia sunt, insanientes uehementer exerceri debere: multa frictione uti: neq; pinguem carnē, neq; uinum assumere: abis uti post purgationem ex leui materia quā leuissimis. non oportere esse uel solos, uel inter ignotos, uel inter eos quos aut contemnunt: aut negligunt. mutare debere regiones: & si mens redit, annua peregrinatione esse iactandos. Raro, sed aliquando tamen ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium specie, similiq; uictus genere curandum est: præterquā quod in hoc insanie genere solo recte uinum datur.

Cardiacæ morbi curatio. Caput. XIX.

Vic morbo præcipue contrarium est id genus, quod *uapxiandov* à grecis nominatur: quīs sæpe ad eum phrenitici transeunt. si quidem mens in illis labat: in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quā nimia imbecillitas corporis: quod stomacho languente immo dico sudore digeritur. Licetq; protinus scire id esse, ubi uenarū exigui, imbecilliq; pulsus sunt. Sudor autem supra cōsuetudinem et modo, & tempore ex toto thorace, & cernicibus, atq; etiam capite prorūpit: pedibus tantummodo et cruribus siccioribus, atq; frigentibus. At ubi id morbi genus est: curatio prima ē, supra præcordia imponere quæ reprimant cataplasmata. secunda, sudorē prohibere. id præstat acerbum oleū, uel rosa, uel melinū, aut myrteū. quorū aliquo corpus leuiter perungendū: cæratumq; ex aliquo horum tum imponendum est. Si sudor uincat, delinendus homo est uel gypso, uel argenti spuma, uel cinolia creta: uel etiam subinde horum puluere respergendus. Idem præstat puluis ex contritis aridi myrti, uel rubi folijs: aut ex austeri, et boni uini arida fecē. Pluraq; similia sunt: quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex uia puluis iniectus. Sup hæc uero quo minus corpus insudet: leui ueste debet esse cōtectus, loco nō calido, fenestris patentibus

hinc & hinc
ent.

lib. 4. c. 5.

X

bleu

signu

cur.

*Vind. Chalcidius**Articulus. I. p. 1.**Plinius. 1. 1. 1. 1.**Lethargus.**+**Pho.
Ogynhi**Ex p. 1. 1. 1. 1.*

sic, ut per status quoque aliquis accedat. Tercium auxilium est imbecillitati iacentis uino, ciboque succurrere. Cibus non multis quidem, sed saepe tamen nocte, ac die dandus est, ut nutriat: neque oneret. is esse debet ex infirmissima materia: et stomacho aptus. nisi autem necesse est, ad uinum festinare non oportet. si uerendum est ne deficiat, tum et in trita ex hoc, et hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue muracum. Egelidum subinde et liberaliter dandum est adiecta polenta: si modo is aeger parum cibi assumit. idque uinum esse debet neque nullarum uirium, neque ingentium: recteque tota die, ac nocte uel treis heminas aeger bibet. si uastius corpus est: plus etiam. Si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida conuenit: et tum dare. Quod si stomachus resolutus parum continet, et ante cibum, et post eum: sponte uomere oportet: rursusque post uomitum cibum sumere. si ne id quidem manserit, sorbere uini cyathum: interpositaque hora sumere alterum. si id quoque stomachus reddiderit: totum corpus bulbis contritis super illinendum est. qui ubi inaruerunt, efficiunt, ut uinum in stomacho contineatur: exque eo toti corpori calor, uenisque uis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum pitisanæ, uel alicæ cremorem ex inferioribus partibus iniicere, si quidem id quoque uires tuetur. Neque alienum est naribus quoque estuantis admonere quod reficiat: id est rosam, et uinum. Et si qua in extremis partibus frigent: unctis, et calidis manibus fouere. per quæ si consequi potuimus, ut et sudoris impetus minuiatur: et uita prorogetur: incipit iam tempus ipsum esse praesidio. ubi in tuto esse uidetur: uerendum est tamen ne ad eandem imbecillitatem cito recidat. Itaque uino tantum remoto, cotidie ualidiorem cibum debet assumere: donec satis uirium corpori redeat.

De lethargo, et eius curatione. Caput. XX.

Lethargus quoque morbus est aliter phrenitico contrarius. In illo difficilis somnus, prompta ad omnem audaciam mens est. At in hoc marcor et inexpugnabilis penè dormiendi necessitas, antephoræ graeci nominant. atque id quoque genus acutum est: et nisi succurratur, celeriter iugulat. Hos agros quidam subinde excitare nituntur admotis his, quæ per sternutamenta euocantur: et his, quæ odore foedo mouent, qualis est pix cruda, lana succida, piper, ueratrum, castoreum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. si id non est, quod libet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odorem foedum mouent. Tharrias uero quidam accessionis esse id malum dixit: leuarique cum ea decessit. Itaque

cessit. Itaq; eos qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest aut in decessione expergiscatur aeger: an cum febris non leuetur: aut leuata quoq; ea somnus urgeat. Nam si expergiscatur, adhibere ei ut sopito superuacuum est. neq; enim uiglando melior fit: sed per se, si melior est: uigilat. Si uero continens ei somnus est: utiq; excitandus est. sed his temporibus quibus febris leuissima est, ut et exarnat aliqd, et sumat. Excitat aut ualidissime repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaq; perunctum oleo multo corpus tribus, aut quatuor amphoris totum per caput persundendum est. Sed hoc utemur, si equalis agro spiritus erit: si mollia praecordia. Sin aliter haec erunt: ea potiora, quae supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima haec ratio est. Medendi autem causa caput radendum: deinde postea fouendum est aqua: in qua laurus, aut ruta decocta sit. Altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri baccae, aut hederam cum rosa, et aceto. Praecipueq; proficit, et ad excitandum hominem naribus admotum, et ad morbum ipsum depellendum capiti, fronti uel impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeq; oportune cibus datus: idest in remissione quanta maxima inueniri poterit: aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat: sic ut si cotidie grauis accessio est: haec cotidie detur. Si alternis, post grauiorem, sorbitio: post leuiorem, mulsata aqua. Vinum quoq; cum tempestiuo cibo datum, non mediocriter adiuuat. quod si post longas febres eiusmodi torpor corpori accessit: cetera eadem seruanda sunt. Ante accessionem aut tribus, quattuor uel horis castoreum, si uenter astrictus est: mixtum cum scamonea: si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si praecordia mollia sunt, cibis utendum est plenioribus. Si dura, in hisdem sorbitionibus subsistendum: imponendumq; est praecordijs, quod sinul et reprimat, et emolliat.

De aqua inter cutem, hoc est hydropico morbo. Caput. XXI.

Ed hic quidem acutus est morbus. Longus uero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet: nisi primis diebus discussus est: ὕδρωπας graeci uocant. Atq; eius tres species sunt. Nam modo uentre uehementer intento creber intus ex motu spiritus sonus est. modo corpus inaequale est: tumoribus aliter, aliterq; per totum id orientibus. modo intus in unum aqua contrahitur: et moto corpore ita mouetur, ut impetus eius conspici possit. Primum τιμπανίτην, secundum λοκοπλευματίαν, uel ὁ πόσαρκα, tertium ὠσκήτην graeci nominant. Communis tamen omnium est huius-

Aurelij Cor.

f

Carabus

Castoreum

Hydrops.

X

Vinum

LIBER

Causa.

Prognost.

Cura.

Abol. & potus

ris nimia abundantia: ob quam ne ulcera quidē in his agris facile sanescunt. Sæpe uero hoc malū per se incipit. Sæpe alteri uetusto morbo, maximeq; quartanæ superuenit. Facilius in seruis, quā in liberis tollitur. quia cum desideret famem, sitim, mille alia tedia, longamq; patietiam: promptius his succurritur, qui facile coguntur: quā quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt: si ex toto sibi temperare non possunt: ad salutem perducuntur. Ideoq; non ignobilis medicus Chryssippi discipulus apud Antigoniū regem amicum quendam eius notæ intemperantiæ mediocriter eo morbo implicatum, negauit posse sanari. Cumq; alter medicus epirotes Philippus se sanaturum polliceretur: respondit illum ad morbum agri respicere: se ad animum. neq; eum res fefellit. Ille. n. cum summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur: tamen malagmata sua deuorando, bibendoq; suam urinam, in exitum se præcipitauit. Inter initia tamen non difficillima curatio est: si imperata sunt corpori quies, sitis, inedia. At si malum inueterauerit: non sine magna molestia discutitur. Metrodorum tamen Epicuri discipulum referunt: cum hoc morbo tentaretur, neq; æquo animo ferret necessariam sitim: ubi diu abstinerat: bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur qui quid receptum est: multum tedio demit. si à stomacho retentum est, morbum auget. Ideoq; in quolibet tentandum nō est. Sed si febris quoq; est: hæc in primis submouenda est per eas rationes: per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est: tum demū ad ea ueniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. atq; hic quoq; quæcunq; species est, si nondum nimis occupauit: hisdem auxilijs opus est. multum ambulandum. currendum aliquid est. superiores maxime partes sic perfriandæ, ut spiritum ipse contineat. euocandus est sudor non exercitatione tantummodo, sed etiam in harena calida, uel laticinio, uel clibano, similibusq; alijs: maximeq; utiles naturales, et siccæ sudationes sunt: quales super baias habemus in myrtetis. balneū, atq; omnis humor alienus est. Ieiunio recte catapotia dantur facta ex absinthij duabus: myrrhæ uetertia parte. Cibus esse debet ex media quidem materia: sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quā ut uitam sustineat. optimaq; est, quæ urinā mouet. Sed id ipsum tamen molliri cibo, quā medicamento melius est. Si tamen res cogit ut ex his aliquid detur: præstanter id decoquendū, eaq; aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum, crocum, cinnanum, amomum, cassia, myrra, balsamum, galbanum, ladanum, oenanthe, panace, cardamomum, hebenus, cypressi semen, uua timinia, quæ scapida & ἀρίστει γράει nomināt: abrotanum, rose folia, acorum, ama-

re nuces, tragoriganum, storax, costum, iunci quadrati & rotundi
 semen: illud $\nu\alpha\pi\omega\rho$, $\chi\omicron\iota\tau\omicron\rho$ hoc græca vocant. Quæ quotiens posuero,
 non quæ hic nascuntur, sed quæ inter aromata afferuntur, signifi-
 cabo. Primo tamen quæ leuissima ex his sunt: idest rosæ folia, uel nar-
 di spica tentanda sunt. Vinum quoque utile est, & austerum: sed quàm
 tenuissimum. Commodum est etiam lino cotidie ventrem metiri: &
 qua comprehendit aluum, notam imponere. postero die uidere si ple-
 nius corpus sit: an extenuetur. Id enim quod tenuatur, medicinam sen-
 tit. Neque alienum est metiri & potionem eius, et urinam. Nam si plus
 humoris excreuitur, quàm assumitur: ita demum secundæ ualitudi-
 nis spes est. Asclepiades in eo qui ex quartana in hydropa deade-
 rat: se abstinentia bidui & frictione usum. tertio die iam et febre,
 & aqua liberato cibum, & uinum dedisse, memorie prodit. Hacte-
 nus communiter de omni specie dici potest. Si uehementius malum est,
 diducenda ratio curadi est. Ergo si inflammatio, et ex ea dolor creber
 est: utilis quotidianus aut alterno quoque die post cibum, uomitus est. Fo-
 mentis siccis, calidisque utendum est. Si per hæc dolor non finitur, ne-
 cessariæ sunt sine ferro cucurbitulæ. Si ne per has quidem tormentum
 tollitur: incidenda cutis est: & tum his utendum. Vltimum auxilium
 est: si cucurbitulæ nihil profuerunt: per aluum infundere copiose
 aquam calidam, eamque recipere. Quin etiam cotidie ter, quaterue
 opus est uti frictione uehementi cum oleo, & quibusdam calefacienti-
 bus. Sed in hac frictione à uentre abstinendum est. Imponendum uero
 in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat: ferramentisque cadentibus
 pluribus locis uenter exulcerandus est: & seruanda ulcera diutius.
 Vtiliter etiam scylla cocta delinitur cutis: sed diu post has inflamma-
 tiones abstinendum est ab omnibus instantibus. At si id uitium est, cui
 $\alpha\upsilon\upsilon\omicron\pi\lambda\epsilon\upsilon\mu\alpha\tau\iota\varsigma$ nomen est: eas partes quæ tument, subijcere soli oportet:
 sed non nimium, ne febricula incidat: si is uehementior est, caput
 uelandum est: utendumque frictione madefactis tantum manibus aqua:
 cui sal, & nitrum, & olei paulum sit adiectum sic, ut aut pueriles, aut
 muliebres manus adhibeantur: quo melior earum tactus sit. Idque si
 uires patiuntur, ante meridiem tota hora: post meridiem semi hora fieri
 oportet. Vtilia etiam sunt cataplasmata quæ reprimunt: maximeque si
 corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum quattuor
 fere digitis ex parte interiore: qua per aliquot dies frequens humor fe-
 ratur: atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumque
 multa gestatione corpus est: atque ubi induræ uulneribus cicatrices sunt,
 adiucendum & exercitationibus est, & cibis, donec corpus ad pristinum
 habitum reuertatur. Cibus ualens esse debet, & glutinosus, maximèque

f ij

*oia diliget inhos
morbida*

inflammatio

Hyposarion

LIBER

Asciis
 caro. Vinum, si per stomachum licet: dulcius. sed ita ut inuicē biduo, triduo uel modo aqua, modo id bibatur. Prodest et lactucae marinae quae grandis iuxta mare nascitur, semen cum aqua potui datum. Si ualens est qui id accipit: ei scylla cocta sicut supra dixi, delinitur. Anthoresque multi sunt: inflatis uescis pulsandos tumores esse. Si uero id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur: ambulare, sed magis modice oportet. malagma quod digerat impositum habere: idque ipsum super imposito triplici panno fascia, non nimium tamen uehementer astringere. quod à Tharria profectum, seruatum esse à pluribus uideo. Si iecur aut lienem affectum esse manifestum est: ficum pinguem contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia uenter non siccatur: sed humor nihilominus abundat: celeriore uia succurrere, ut is per uentrem ipsum emittatur. Neque ignoro Erastrato dissipluisse hanc curandi uiam. Morbum enim hunc iocineris putauit. Ideoque ita illum esse sanandum: frustra quaequam emitti: quae uitiato illo subinde nascitur. sed primum non huius uisceris unius hoc uitium est. Nam splene affecto, et in totius corporis malo habitu fit: deinde ut inde coeperit: tamen aqua nisi emittitur, quae contra naturam ibi subsistit: et iocineri, et ceteris interioribus partibus nocet. conuenitque corpus nihilominus esse curandum: neque enim sanat emissus humor: sed medicinae locum facit, quam intus inclusus impedit. *Quia inuicem morbo sic curari possint: sed iuuenes robusti, qui uel ex toto carent febre: uel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est, qui uel ex atra bile huc deciderunt: quique malum corporis habitum habent: idonei huic curationi non sunt. Cibus autem quo die primum humor emissus est, supernacius est: nisi si uires desunt. Insequentibus diebus et his uinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet, paulatimque euocandus aeger est ad exercitationes, frictiones, solem, sudationes, navigationes, et idoneos cibos: donec ex toto conualescat. Balneum rarum res amat: frequentiore in ieiunio uomitum. Si aestas est, in mare natare commodum est. ubi conualuit aliquis, diu tamen alienus ei ueneris usus est.*

tabes.
Quia
 De tabe, et eius speciebus, et curationibus. Caput. XXII.

d Intius saepe et periculosius tabes eos male habet, quos in uasit. Atque huius quoque plures species sunt. Vna est qua corpus non alitur: et naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis uero in eorum locum subeuntibus, summa

1 summa macies oritur: & nisi occurratur, tollit. ἀνοσιαν hanc græci
 vocant. Ea duabus fere de causis incidere consuevit. aut enim nimio
 timore aliquis minus, aut auaritia nimia plusquam debet: assumit. ita
 uel quod deest, infirmat: uel quod superat, corrumpitur. Altera spe-
 cies est, quam græci καχεξία appellat: ubi malus corporis habitus
 est. ideoq; omnia alimenta corrumpuntur. quod fere fit, cum longo
 morbo uitata corpora, etiam si illo uacant: refectionem tamen nō acci-
 piunt: aut cum malis medicamentis corpus affectum est, aut cum diu
 necessaria defuerunt, aut cum inusitatos & inutiles cibos aliquis as-
 sumpsit, aliquid ne simile incidit. Huic præter tabem illud quoq; nō
 nunq; accidere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulcera, summa cutis
 exasperetur: uel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, lon-
 gæq; periculossissima species, quam græci φθίσις nominauerunt. Ori-
 tur fere à capite: inde in pulmonem destillat: huic exulceratio accedit.
 ex hac febricula leuis fit: quæ etiam cum quieuit, tamen & repetit.
 Frequens tussis est. pus excreatur: interdum cruentum aliquid. Quic-
 quid excreatum est, si in ignem impositum est: mali odoris est. Itaq;
 qui de morbo dubitant, hac nota utuntur. Cum hæc genera tabis sint,
 animaduertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. deinde
 si tantummodo non ali corpus apparet: causam eius attendere: & si
 cibi minus aliquis quam debet, assumit: adijcere, sed paulatim: ne si
 corpus insuetum subita multitudine onerauerit: concoctionem impe-
 diat. Si uero plus iusto quis assumere solitus est: abstinere uno die, de-
 inde ab exiguo cibo incipere: cotidie adijcere donec ad iustum modum
 perueniat. Præter hæc conuenit ambulare locis quam minime frigi-
 dis sole uitato: p. manus quoq; exerceri si infirmior est, gestari, ung-
 perfricari si potest maxime per se ipsum sæpius eodem die, & ante
 cibum, & post eum sic, ut interdum oleo quædam adijciantur calefa-
 ciencia, donec insudet. Prodestq; ieiuno prehendere per multas partes
 cutem: & attrahere ut relaxetur: aut imposita resina, & abducta
 subinde idem facere. Vtile est etiam interdum balneum: sed post ci-
 bum exiguum. Atq; in ipso solio recte cibi aliquid assumitur: aut si
 sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi uero esse debent ex his,
 qui facile concoquuntur: qui maxime alunt. Ergo uini quoq; sed au-
 steri necessarius usus est. mouenda urina. at si malus corporis habi-
 tus est, primum abstinendum est: deinde aluus ducenda. tum paula-
 tim cibi dandi adiectis exercitationibus, unctionibus, frictionibus. Vti-
 lius his frequens balneum est: sed ieiunis etiam usq; sudorem. Cibus
 uero opus est copiosis, uarijs, boni succi: quiq; etiam minus facile cor-
 rumpantur: uino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mitten-

Aurelij Cor.

f iiij

Causæ

Ampho pp affor
 q. l. r. in gl. ab h. h. h.
 affor. n. r. 3. r. r.
 l. 3. c. n. m. b. d. h. p.

dus est, sed paulatim cotidieq; pluribus diebus cū eo, ut cætera quoq;
 eodem modo seruetur. Quod si mali plus est, & uera p̄s̄is est: in-
 ter initia protinus occurrere necessarium est. neq; enim facile is mor-
 bus cum inueterauerit, euincitur. Opus est si uires patiuntur longa na-
 uigatione, coeli mutatione sic, ut densius quā id est, ex quo discedit
 æger: petatur. Ideoq; aptissime Alexadriam ex Italia itur. Ferēq; id
 posse inter principia corpus pati debet: cum hic morbus ætate firmis-
 sima maxime oriatur: id est ab anno duodecimo, ad annum quintū,
 & trigessimū. Si id imbecillitas non sinit, naue tñ non longe gestari
 cōmodissimum est. Si nauigationē aliqua res prohibet: lectica uel alio
 modo corpus dimouendum est. Tum a negocijs abstinendum est: omni-
 busq; rebus, quæ sollicitare animum possunt. somno indulgendum: at-
 uende desillationes, ne si quid cura lenarit: exasperetur: & ob id ui-
 tanda cruditas: simulq; sol, & frigus. Os obtegendum: fauces uelandæ:
 tussicula suis remedijs finiendæ. et quādiu quidem febricula incur-
 sat, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuis cibis meden-
 dum. Eoq; tempore bibenda aqua. Lac quoq; quod in capitis dolori-
 bus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sitis, siue præcor-
 dia tument, siue biliosa urina est, siue sanguis fluxit, pro ueneno est.
 in phthisi tamen sicut in omnibus longis, difficilibusq; febriculis recte
 dari potest. Quod si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit:
 decurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq; ambulationes:
 item lenes frictiones. Balneum alienū est. Cibus esse debet primo acer,
 ut alliū, porrum, idq; ipsum ex aceto. uel ex eodē intubus, ocymum, la-
 ctuca. Deīn lenis ut sorbitio ex ptisana, uel ex alia, uel ex amylo la-
 cte adiecto. Idem oriza quoq; et si nihil aliud est: far præstat. Tū in-
 uicem modo his cibis, modo illis utendum est. adiiciendāq; quædam ex
 media materia, præcipueq; uel ex apruna, cerebellū, uel pisciculus, &
 his similia. Farina ē cum seuo ouillo, caprino uel mixta, deīn inco-
 cta pro medicamēto est. uinum assumi debet lene, austerum. Hactenus
 non magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est, ac neq; febricu-
 la, neq; tussis quiescit: tenuariq; corpus apparet: ualidioribus auxilijs
 opus est. Exulcerandus est ferro candenti uno loco sub mento, altero in
 gutture: duobus ad mammam utraq; item sub imis ossibus scapula-
 rum, quas ὠμοπλάτας græci uocant: sic ne sanescere ultra sinamus, nisi
 tussi finita: cui per se quoq; medendum esse manifestū est. Tunc ter,
 quaterq; die uehementer extremæ partes perfricandæ. thorax leui
 manu perfractandus. post cibum intermittenda hora: & perfricanda
 crura, brachiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est æger in so-
 lium: in quo sit aqua calida, & oleum. cæteris diebus bibenda aqua:

phthisis

cap. 27.

q̄ a leni abstinere

tum & uinum: si tussis non est, potui frigidum dandum: si aestas est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissionibus cotidie dari: frictiones, gestationesq; similiter adhiberi. eadem acria quarto, aut quinto die sumere. interdum herbam sanguinalem ex aceto, uel plantaginem esse. Medicamentum etiam est uel plantaginis succus per se, uel marrubium ex melle concoctum, ita ut illius cyathus sorbillo sumatur: huius cochleare plenum paulatim delingatur: uel inter se mixta, & incocta resinae terebinthinae pars dimidia: butyri, et mellis pars altera. Praecipua tamen ex his omnibus sunt uictus, uehiculum, & nauis, & sorbitio. Aluus cito utiq; uitanda est. Vomitus in hoc morbo si frequens est, perniciosus est, maximeq; sanguinis. Qui meliusculus esse cepit, addicere debet exercitationes, frictiones, cibos: deinde ipse se suppresso spiritu perficere: diu abstinere a uino, balneo, uenere.

De comitialis morbi curationibus. Caput. XXIII.

Inter notissimos morbos est et is, qui comitialis, uel maior nominatur. Homo subito concidit: ex ore spumae mouentur: deinde interposito tempore ad se redit: & per se ipsum consurgit. Id genus saepius uiros quam foeminas occupat. ac solet quidem et longum esse, usq; ad mortis diem: & uita non periculosum: Interdum tamen cum recens est hominem consumit: & saepe cum si remedia non sustulerunt, in pueris ueneris, in puelis menstruum initium tollit. modo cum distentione membrorum, aut neruorum prolabitur aliquis: modo sine illa quidem. Hos quoque hisdem quibus lethargicos excitare conantur, quod admodum supernacuum est: & quia ne lethargicus quidem is sanatur: & quia cum possit ille nunquam expergescere, acq; ita fame interire: hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla neruorum distentio accessit, utiq; sanguis mitti debet: si accessit, non utiq; mittendus est, nisi alia quoque hortantur. necessarium autem est ducere aluum: uel nigro ueratro purgare: uel iurumq; facere si uires patiuntur. tunc caput tondere: oleoq; & aceto pun gere: cibum post diem tertium simul cum transit hora, qua concidit, dare. Neq; sorbitiones autem his, aliq; molles, & faciles cibi, neq; caro, minimeq; suilla conuenit: sed mediae materiae. Nam et uiribus opus est: & cruditates auendae sunt, cum quibus fugere oportet solem: balneum, ignem, omniaq; calefacientia. item frigus, uinum, uenerem, loci praecipitis conspectum, omniumq; terrentium, uomitum, lassitudinem, solitudines, negocia omnia. Vbi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & inuicem alterum quenuq; eadem hora cibi seruata: donec quatuordecim dies transeant. quos ubi morbus exisset: acuti uino

f. iij

X
Epilepsia

signa

prognost.

Curatio

LIBER

deposuit. at si manet, curandus iam ut longus est. Quod si non quo die primum id incidit, medicus accessit: sed is qui cadere consuevit, ei traditus est: protinus eo genere uictus dabitur: qui supra comprehensus est: expectandus est dies, quo prolatur: utendumq; tum uel sanguinis missione, uel ductione alui, uel nigro ueratro: sicut præceptum est. In sequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui: uitatis omnibus quæ cauenda dixi: nutriendus. Si per hæc morbus finitus non fuerit: confugendum erit ad album ueratrum: ac ter quoq; aut quater eo utendum: non ita multis interpositis diebus, sic tamen ne iterum unquam sumat, nisi conciderit. Medijs autem diebus uires eius erunt nutriendæ, quibusdā præter ea quæ scripta sunt, adiectis. Vbi mane expectatus est, corpus eius leuiter ex oleo uetere, cū capite, excepto uentre, permulceatur. tum ambulatione quā maxime longa, & recta utatur. post ambulationem loco tepido uehementer & diu, ac non minus ducentes, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur. paulum cibi assumat: conquiescat: rursum ante noctem ambulatione utatur: iterum uehementer perfricetur sic, ut neq; uenter, neq; caput contingatur: post hæc coenet: interpositisq; tribus, aut quattuor diebus, uno aut altero acria assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radat: unguatur oleo uetere, adiecto aceto, & nitro: perfundatur aqua salsa: bibat ieiunus ex aqua castorei: nulla aqua nisi decocta potionis causa utatur. Quidam iugulati gladiatori calido sanguine epota, tali morbo se se liberarunt: apud quos miserū auxilium, tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicū uero pertinet, ultimū est iuxta talū ex utroq; crure paulum sanguinis mittere: occipitium incidere: & cucurbitulas admoouere ferro candente: in occipitio quoq; & infra, qua summa uertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus humor euadat. quibus si finitum malum non fuerit, propè est, ut perpetuum sit. Ad leuandum id tantummodo utendum erit exercitatione, multa frictione, cibisq; his, qui supra comprehensi sunt. præcipueq; uitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

Gul. x. f. 10. r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Le Iuris.

De regij morbi curatione. Caput. XXIIII.

Eque notus est morbus, quem interdum arquatū, interdum regium nominant: quem Hippocrates ait: si post septimum diem febricitante agro superuenit, tutum esse mollibus tantummodo præcordijs substantibus. Diocles ex toto si post febrem oritur, et prodesse. si post hunc febris, occidere. Colorem autem

Signum
 lor autem eum morbum detegit maxime oculorum: in quibus quod album esse debet, fit luteum. Soletq; accedere et sitis, et dolor capitis, et frequens singultus, et praecordiorum dextra parte durities: et ubi corporis uehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumq; resolutio. atq; ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit. Primo die abstinere aegrum oportet: secundo ducere aluum: tum si febris est, eam uictus genere discutere. si non est, scamoneam potui dare: uel cum aqua betam albam contritam, uel cum aqua mulsam nucas amaras, absinthium, anesum sic, ut pars huius minima sit. Asclepiades aquam quoq; salsam, et quidem per biduum purgationis causa bibere cogebat ijs, quae urinam mouent: reiectis. Quidam superioribus omissis, per haec et per eos cibos, qui extenuant: idem se consequi dicunt. Ego ubiq; si satis uirum est, ualidiora: si parum, imbecillia auxilia praefero. Si purgatio fuit, post eam triduo: primo modice cibum oportet assumere ex media materia: et uinum bibere graecum salsum, ut resolutio uentris maneat. tum altero triduo ualidiores cibos, et carnis quoq; aliquid esse. intra aquam manere. deinde ad superius genus uictus reuerti cum eo, ut magis satietur omissis graeco uino bibere integrum austerum: atq; ita per haec uariare, ut interdum acres quoq; cibos interponat: interdum ad salsum uinum redeat. Per omne uero tempus utendum est exercitatione, frictione: si hyems est, balneo: si aestas, frigidis natationibus: lecto et, et conclauis cultiore. clauso loco uti ludis, lasciuia: per quae mens exhilaretur. ob quae regius morbus dictus uidetur. Malagma quoq; quod digerat, super praecordia datum, prodest: uel arida ibi ficus imposita, si iecur, aut lienis affectus est.

De elephantiae curatione. Caput. XXV.

i Notus autem penè in italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ελεφαντία graeci uocant. isq; longis annumeretur. Totum corpus afficitur, ita ut ossa quoq; uitiari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosq; tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa cutis inaequaliter crassa, tenuis, dura, mollisq; quasi squamis quibusdam exasperatur: corpus emacrescit: os surae: pedes intumescunt. Vbi uetus morbus est, digiti in manibus, pedibusq; sub tumore conduntur: febricula oritur, quae facile tot malis obrutum hominem consumit. protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet: aut nigro ueratro uenter solui: adhibenda tamen quanta sustineri potest, inedia est. paulum deinde uires reficiendae: et

Elephantia

Signum

Cumulo

apoplexia
morb. huius
morb. huius

LIBER

ducenda alius. post hæc, ubi corpus leuatum est, utendum est exercita-
tione, præcipueq; cursu. sudor primum labore ipsius corporis, deinde
etiam siccis sudationibus euocandus. frictio adhibenda: moderadumq;
inter hæc, ut vires conferuentur: balneum rarum esse debet. Cibus
sine pinguibus, sine glutinosis, sine instantibus. Vinum, præterquam
primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago, & illita tueri
optime uidetur.

Apoplexia

apoplexia
morb. huius
morb. huius

De attonitis, & eorum curatione. Caput. XXVI.

Attonitos quoq; raro uidemus: quorum & corpus, & mens
stupet. Fit interdum ictu fulminis: interdum morbo: ἀπο-
πληξίαν hūc græci appellant. His sanguis mittendus est.
uer atro quoq; albo, uel alui ductione utendum. Tum adhibendæ fri-
ctiones: & ex media materia minime pingues cibi. quidam et acres;
& à uiuo abstinendum.

Paralysis

Paralysis

Paralysis

Paralysis

De resolutione neruorum: quæ apoplexia, uel paralysis dicitur.
Caput. XXVII.

Resolutio neruorum frequens ubiq; morbus est. Sed in-
terdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres
authores illud ἀποπληξίαν, hoc παράλυσιν nominaue-
runt. Nunc utrumq; paralysis appellari uideo. Solent
autem qui per omnia membra uehementer resoluti sunt, celeriter rapi.
ac si correcti non sunt, diutius quidem uiuunt: sed raro tamē ad sa-
nitatem perueniunt: & plerumq; miserum spiritum trahunt, memoria
quoq; amissa. In partibus uero nunquam acutus, sæpe longus, ferè sa-
nabilis morbus est. Si omnia membra uehementer resoluta sunt, sangui-
nis detractio uel occidit, uel liberat. Aliud curationis genus uix un-
quam sanitatem restituit: sæpe mortem. tantum differt uitam: interim
infestat. Post sanguinis missionem si non redit & motus, & mens: ni-
hil spei superest. Si rediit: sanitas quoq; prospicitur. At ubi pars reso-
luta est, prouidet malo corporis, uel sanguis missus, uel alius ducta.
Cætera eadem in utroq; casu facienda sunt. Si quidem uitare præcipue
conuenit frigus: paulatimq; ad exercitationes reuertendum est sic, ut
ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum imbecillitas probi-
bet: uel gestetur, uel motu lecti concutitur: tum id membrum quod de-
ficiet si potest, per se, si minus, per alium moueatur: & ut quadam ad
consuetudinem suam redeat. Prodest et torpentibus mēbris summam

Paralysis

cutem exasperasse, uel urticis caſam, uel impoſito ſinapi ſic, ut ubi ru-
bere coeperit corpus: hæc remoneantur. Scylla quoq; contrita, bulbiq;
contriti cum thure recte imponuntur. Neq; alienum eſt reſina cutem
tertio quoq; die diutius uellere: pluribus eſt locis aliquando ſine ferro
cucurbitulas ad mouere. Vnctioni uero aptiſſimum eſt uetus oleum, uel
nitrum aceto, & oleo mixtum. Quin etiam fouere aqua calida ma-
rina: uel ſi ea non eſt, tamen ſaſa, magnopere neceſſarium eſt. At ſi
quo loco uel naturales, uel etiam manu factæ tales natationes ſunt, iſ
poſſimum utendum eſt: præcipueq; in his agitata membra, quæ
maxime deſiciunt. ſi id non eſt, balneum tamen prodeſt. Cibus eſſe de-
bet ex media materia, maximeq; ex uenatione. potio ſine uino aqua
calida. ſi tamen uetus morbus eſt, interponi quarto, uel quinto die pur-
gationis cauſa uinum græcum ſaſum prodeſt. Poſt cœnam utilis uom-
itus eſt. Interdum uero etiam neruorum dolor oriri ſolet. In hoc caſu
non oportet uomere: non medicamentis urinam mouere: non ſine exer-
citatione ſudores, ut quidam præcipiunt, expedit. Bibenda aqua eſt bis
die. in lectulo leniter ſatis diu corpus perfricandum eſt. deinde reten-
to ſpiritu ab ipſa exercitatione potius ſuperiores partes mouendæ. bal-
neo raro utendum: mutadum ſubinde peregrinationibus cœlum. ſi do-
lor eſt, ea ipſa pars ſine oleo nitro ex aqua perungenda eſt: deinde in-
uoluenda, et ſubiicienda pruna lenis, & ſulphur. atq; ita id ſuffumigan-
dum: idq; aliquandiu faciendum. ſed ieiuno cum bene iam concoxerit,
cucurbitulæ quoq; ſæpe dolenti parti ad mouendæ ſunt: pulſandusq; le-
uiter inflatis ueſicis bubulis iſ locus eſt. Vtile eſt eſt ſeuum niſcere cum
uorruus, & urtica contritis ſimilibus ſic, ut omnium par modus ſit:
idq; imponere: fouere aqua, in qua ſulphur decoctum ſit. Vtricoli
quoq; recte imponuntur aqua calida repleti: aut bitumen cum ordea
cea ſarina mixtum: atq; in ipſo poſſimum dolore utendum geſtatione
uehementi eſt. quod in alijs doloribus peſſimum eſt. Tremor aut ner-
uorum æque uomitu, medicamentisq; urinam mouentibus impeditur.
Inimici etiam habet balnea, aſſasq; ſudationes. bibenda aqua eſt. acri
ambulatione utendum. item unctionibus, frictionibusq; maxime per
ſeipſum. pila, ſimilibusq; ſuperiores partes dimouendæ. cibo quolibet
utendum, dummodo concoctioni utiq; ſtudeatur. ſecundum cibum cu-
ris abſtinendum. rariffima uenere utendum eſt. ſi quando quis in eâ
prolapſus eſt: tum oleo leniter, diuq; in lectulo perfricari manibus
puerilibus, potius quam uirilibus debet. ſuppurationes autem quæ in
aliqua interiori parte oriuntur, ubi notæ fuerint: primum id agere
oportet p ea cataplaſmata, quæ reprimunt: ne coitus inutilis materiæ
fiat. deinde ſi hæc uicta ſunt, p ea malagmata quæ digerunt: diſſi-

Cibus

Nervorum dolor

Tremor nervorum

Suppuratio

pentur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut euocetur: deinde ut mature scat: omnis tunc uomicae finis est, ut rumpatur. Inditumq; est, pus uel aluo, uel ore redditum. sed nihil facere oportet quo minus quicquid est puris, excedat. Utendum maxime sorbitionibus est: et aqua calida: ubi pus ferri desit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen ualidiores, et frigidos cibos, frigidamq; aquam sic, ut ab egelidis tamen initium fiat. primoq; cum melle quedam edenda, ut nuclei pinci, uel graecae nuges, uel auellanae. Postea submouendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, suauis assumptus uel porri, uel marrubij: et omni cibo porrum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus quae non afficientur, frictionibus: item ambulationibus lenibus. Vitandumq; erit, ne uel luctando, uel currendo, uel alia ratione sanescientia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo pernitiosus, ideoq; omnimodo cauendus sanguinis uomitus est.

De humani corporis interioribus sedibus. Caput. I.

h Astenus reperiuntur ea genera morborū: quæ
 in totis corporibus ita sunt, ut ijs certæ sedes
 assignari non possint. Nunc de his dicam, quæ
 sunt in partibus. Facilius autem omnium inte-
 riorum morbi, curationesq; in noticiam ueni-
 ent: si prius eorum sedes breuiter ostendero.
 Caput igitur, eaq; quæ in ore sunt, non lin-
 gua tantummodo, palatq; terminantur: sed etiam quatenus oculis no-
 stris exposita sunt. In dextra, sinistraq; circa guttur uenæ grandes,
 quæ σφαγίτιδες nominantur: itemq; arteriæ, quas αρτήριδες uocant:
 sursum procedentes ultra aures feruntur. atq; in ipsis ceruicibus glan-
 dulæ positæ sunt: quæ interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo
 itinera incipiunt. alterum asperam arteriam nominant: alterum sto-
 machum. arteria exterior ad pulmonem: stomachus interior ad uen-
 triculum fertur. illa spiritum, hic cibum recipit: quibus cum diuersæ
 uie sint: quæ coeunt exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est.
 quæ cū spiramus, attollitur: cum cibum, potionemq; assumimus, arte-
 riam claudit. Ipsa autem arteria dura, & cartilaginosa in gutture
 assurgit: cæteris partibus residet. Constat ex arcibus quibusdam com-
 positis ad imaginem earū uertebrae, quæ in spina sunt: ita tñ, ut
 ex parte exteriori aspera, ex interiore stomachi modo leuis sit. eaq;
 descendens ad præcordia, cum pulmone committitur. Is spongiosus,
 ideoq; spiritus capax, et à tergo spinæ ipsi iunctus in duas fibras un-
 gulae bubulae modo diuiditur. huic cor annexū est natura musculosum,
 in pectore sub sinistro mēbra situm: duosq; quasi uentriculos ha-
 bet. at sub corde, atq; pulmone transuersum, ex ualida membrana se-
 ptum est: quod à præcordijs uterum diducit æque neruosum. Multis
 etiam uenis per id discurrentibus à superiore parte non solum inte-
 stina, sed iecur quoq; lienemq; discernit. Hæc uiscera proxima: sed in-
 fra tamē posita dextra, sinistraq; sunt. Iecur à dextra parte sub præ-
 cordijs ab ipso septo ortum intrinsecus cauum: extrinsecus gibbum:
 quod prominens leuiter uentriculo insidet: & in quattuor fiores di-
 uiditur. Ex inferiore uero parte ei fel inhaeret. at lienis sinistra non
 eidē septo, sed intestino innexus est: natura mollis, & rarus longitu-
 dinis, crassitudinisq; modicæ: isq; paulum à costarum regione in ute-
 rum excedens, ex maxima parte sub his conditur. atq; hæc quidem

nisi lib.

Caput

arteria in
stomachum

pulmonem

cor

superius in fiores

ecur

lienem

LIBER

iuncta sunt. Renes uero diuersi, qui lumbis sub imis costis inhaerent
 à parte earum resimi, ab altera rotundi: qui & uenosi sunt: & uen-
 triculos habent: & tunicis super conteguntur: ac uiscerum quidem hæc
 sedes sunt. Stomachus uero qui intestinorum principium est, nervosus
 à septimæ spinæ uertebra incipit: ac circa præcordia cum uentriculo
 committitur. Venter autem qui receptaculum cibi est: constat ex
 duobus tergoribus. isq; inter lienem, & iecur positus est: utroq; ex his
 paulum super eum ingrediente. suntq; etiam membranulae tenues,
 per quas inter se omnia ista connectuntur: iungunturq; ei septo,
 quod transuersum esse supra posui. Inde ima uentriculi pars pau-
 lum in dexteriolem partem conuersa, in summum intestinum coar-
 tatur. Hanc iuncturam πύλονες græci uocant: quoniam portæ modo
 in inferiores partes ea quæ excreturi sumus, emittit. ab ea ieiunum
 intestinum incipit non ita implicitum, cui tale uocabulū est: quia nun-
 quam quod accipit, continet: sed protinus in inferiores partes trans-
 mittit. Inde tenue intestinum est in sinus uehementer implicitum. Or-
 bes uero eius per membranulas singuli cum inferioribus connectun-
 tur, qui in dexteriolem partem conuersi, & è regione dexterioris
 coxæ finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id in-
 testinum cum crassiore altero transuerso committitur: quod à dextra
 parte incipiens, in sinisteriolem peruium, & longum est: in dextero-
 rem non est. Ideoq; cæcum nominatur. At id quod peruium est, late-
 fusum, atq; sinuatum: minusq; quam superiora intestina nervosum:
 ab utraq; parte huc, atq; illuc uolutum: magis tamen sinisteriores, in-
 ferioresq; partes tenens: contingit iecur, atq; uentriculum. Deinde cum
 quibusdam membranulis à sinistro rene uenientibus iungitur: atq;
 hinc dextra recuruatum in imo dirigitur, qua excernit. ideoq; id ibi
 rectum intestinum nominatur. Contegit uero uniuersa hæc omentum
 ex interiore parte læue, & strictū: ex superiore mollius. Cui adeps
 quoq; innascitur: quæ sensu sicut cerebrum quoq; & medulla caret.
 At à renibus singulae uenæ calore albæ ad uesicam feruntur: ou-
 τήρας græci uocant: quod per eas inde descendentem urinam in ue-
 sicam destillare concipiunt. Vesica autem in ipso sinu nervosa, & du-
 plex ceruice plena, atq; carnosâ iungitur per uenas cum intestino,
 eoq; osse, quod pubi subest. Ipsa soluta, atque liberior est: aliter in ui-
 ris, atq; in foeminis posita. Nam in uiris iuxta rectum intestinum
 est, potius in sinistra partem inclinata. In foeminis super genitale ea-
 rum posita est: superq; elapsa ab ipsa uulua sustinetur. Tum in ma-
 sculis iter urinæ spaciosius, & compressius à ceruice huius descen-
 dit ad colen. In foeminis breuius, & plenius super uulua ceruicem

Renes

Stomachus

Venter

Intestini

Omentum

Adeps

Vesica

se ostendit. Vulua autem in uirginibus quidem admodum exigua est. In mulieribus uero nisi ubi grauidæ sunt, non multo maior: quàm ut manus comprehendatur. Ea recta continuatq; ceruice, quæ canalem uocant: contra mediam alium orsa: inde paulum ad dexteriores coxas conuertitur: deinde super rectum intestinum progressa, alijs foeminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas, & pubem imo uentre posita sunt: à quibus ac pube abdomen sursum uersus ad præcordia peruenit: ab exteriori parte euidenti cute, ab interiori leui membrana inclusum: quæ omento iungitur: peritæos autem à græcis nominatur.

De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: & primo de eius dolore: deinde de morbo qui circa faciem nascitur: tum de linguae resolutione: postremo de destillatione, ac grauedine. Caput. II.

Is ueluti in conspectum quendam quatenus scire curanti necessarium est adductis, remedia singulari laborantium partium exequar, orsus à capite. sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si quis similis est: alijs erit explicandus. In capite autem interdum acutus, & pestifer morbus est: quem *νεφελία* græci uocant. Cuius notæ sunt horror calidus, neruorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, uomitus: sic ut uox supprimatur, uel sanguis ex naribus cursus: sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maxime circa tempora, uel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas: sed neq; grauis, neq; periculosa per hominis ætatem est. Interdum grauior dolor, sed breuis, neq; tamen mortiferus: qui uel uino, uel cruditate uel frigore, uel igne, aut sole contrahitur. Hiq; omnes dolores modo in febre, modo sine hac sunt: modo in toto capite, modo in parte interdum, sic ut oris quoq; proximam partem excrucient. Præter hæc est unum inuenitur genus, quod potest longum esse. ubi humor cutē inflat, eaq; intumescit, et prementi digito cedit, *ὀφθαλμία* græci appellant. Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est: qua sit ratione curandum, dixi: cum persequer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ uero auxilia sunt capitis, ubi cum febre dolor est: eo loco explicatū est, quo febrim curatio exposita est. Nunc de cæteris dicendum: ex quibus id quod acutum est, et id quod supra consuetudinem intenditur: idq; quod ex subiecta causa, & si non pestiferum, tamen uehemens est: prima curationem

h. lund

Affectus Capitis

Capitulum

Signum

Hydromela

LIBER

26
 habet, quā sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, sup̄ uā
 1 cum est. Satiūsq; est abstinere à cibo: si fieri potest, etiam à potione:
 2 si non potest, aquam bibere. si postero die dolor remanet, aluum du
 3 cere: sternutamenta euocare: nihil assumere, nisi aquā. sæpe enim dies
 unus, aut alter totum dolorē hac ratione discutit. utiq; si ex uino, uel
 cruditate origo est. si uero in his auxiliij parum est: tonderi oportet ad
 cutem. deinde considerandū est: quæ causa dolorem excitauit. si calor,
 aqua frigida multa perfundere caput expedit: spongiā concuā im
 ponere, subinde in aqua frigida expressā: ungere rosa, & aceto, uel
 potius his tinctā lanā succidā imponere: aliāq; refrigerantia
 cataplasmata. At si frigus nocuit: caput oportet perfundere aqua ca
 lida marina, uel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit: tum caput
 uehementer perfricare: deinde calido oleo implere: ueste uelare. qui
 dam ē id deuinciunt. Alij cervicalibus uestimentisq; onerant: et sic le
 uantur. alios calida cataplasmata adiunant. Ergo ēt ubi causa inco
 gnita est, uidere oportet refrigerantia magis, an calefacientia leniant:
 & his uti, quæ experimentum approbarit. At si parum causa discer
 nitur: perfundere caput primū aqua calida, sicut supra præceptum
 est: uel salsa, uel ex lauro decocta. tum frigida posca. Illa in omni ue
 rusto capitis dolore communia sunt: sternutamenta excitare, inferiores
 partes uehementer perfricare: gargarizare his, quæ salinam mouent:
 cucurbitulas temporibus & occipitio admoovere: sanguinem ex nari
 bus detrachere: resina subinde tempora peruellere: et imposito sinapi
 exulcerare ea, quæ male habent, ante linteolo subiecto, ne uehemen
 ter arrodāt: cidentibus feramentis ubi dolor est, ulcera excitare: cibū
 per modicum cum aqua sumere. ubi leuatus est dolor, in balneum ire:
 ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si
 discussus ex toto dolor est, etiam ad uinum reuerti: sed postea semper
 antequam quicquam aliud, aquam bibere. dissimile est id genus quod
 humorem in caput contrahit. In hoc tondere ad cutem necessarium
 est. deinde imponere sinapi, sic ut exulceret. si id parū profuit: scal
 pello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur:
 insudet: uehementer perfricetur: cibis, potionibusq; utatur, urinā præ
 cipue mouentibus.

De morbo, qui circa faciem nascitur: quem græci cynicum spasmum uo
 cant.

Irca faciem uero morbus innascitur: quem græci nuuindor
 σπασμὸν nominant. Is cum acuta fere febre oritur. Os cū
 motis

motu quodam peruertitur. ideoq; nihil aliud est, quam distentio oris. Accedit crebra coloris in facie, totoq; corpore mutatio. somnus in promptu est. in hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est: ducere aluum. si ne sic quidem discussum est: albo ueratro uomitum mouere. præter hæc necessarium est uitare solem, lassitudinē, uinum. sed si discussum his non est: utendum est cursu, frictione in eo quod læsum est leni, & multa in reliquis partibus breuiore, sed uehementi. prodest etiam mouere sternutamenta: caput radere: idq; perfundere aqua calida, uel marina, uel certe salsa sic, ut ei quoq; sulphur adijciatur. post perfusionem iterum perfriari: sinapi manducare: eo demq; tempore affectis oris partibus ceratum: integris idem sinapi, donec arrodant, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

ay. galsa & sulphur

De resolutione lingue.

T si lingua resoluta est: quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit sic, ut sermo hominis non explicetur: oportet gargarizare ex aqua: in qua uel thymum, uel hyssopū, uel nepeta decocta sit: aquam bibere: caput, et os, & ea quæ submento sunt, & cervicem uehementer perfriare: laesere linguam ipsam: linere: manducare quæ sunt acerrima, idest sinapi, allium, cepam: magna ui luctari, ut uerba exprimantur: exerceri re tanto spiritu: caput sæpe aqua frigida perfundere: nonnunquam multam esse radicula: deinde uomere.

De destillatione, ac grauedine.

Est illat autem humor ex capite interdum in nares: quod leue est. interdum in fauces: quod peius est. interdum et in pulmonem: quod pessimum est. Si in nares destillat: tenuis per has pituita profluit: caput leuiter dolet: grauitas eius sentitur: frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces: has exasperat: tussiculam mouet. si in pulmonem: præter sternutamenta, & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, æstus, biliosa urina. Aliud autem quamuis non multum distans malum grauedo est. Hæc nares claudit: uocem obtundit: tussim siccam mouet: sub eadem salsa est salina: sonant aures: uenæ mouentur in capite: turbida urina est. Hæc omnia uox Hippocrates nominat. Nunc uideo apud grecos in grauedine hoc nomen seruari: destillationem uocat, & uox appellari. Hæc autem & breuia, & si neglecta sunt, longa esse consue-

Coryza

Grauedo

Destillatio

Aurelij Cor.

g

runt. Nihil pestiferum est: nisi quod pulmonem exulcerauit. Vbi ali-
 quid eiusmodi sensimus: protinus abstinere à sole, balneo, uino, uenere
 debemus. Inter quæ unctione, & assueto cibo nihilominus uti licet. am-
 bulatione tantum acris: sed tecta utendum est: & post eam caput, atq;
 os supra quinquagies perficiendum. Raroq; fit, ut si biduo, uel certe
 triduo nobis temperauimus: id uitium non leuetur. Quo leuato, si in
 destillatione crassa facta pituita est: uel in grauedine nares magis
 patent: balneo utendum est: multaq; aqua prius calida, post egelida fo-
 uendum os, caputq; deinde cum cibo pleniore uinum bibendum. At si
 aque tenuis die quarto pituita est: uel nares aque clausæ uidentur:
 assumendum est uinum amineu austerum: deinde rursus biduo aqua:
 post quæ ad balneum, & ad consuetudinem reuertendum est. Neq;
 tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt: expedit tan-
 quam egros agere. sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt: præ-
 terquam si diutius aliquem, & uehementius ista sollicitare consueuerunt.
 Huic enim quædam curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic si
 in nares, uel in fauces destillauit: præterea quæ supra retuli: protinus
 primis diebus multum ambulandum est: perficienda uehementer in-
 feriores partes: leuior frictio adhibenda thoraci erit: leuior capiti. de-
 menda assueto cibo pars dimidia: sumenda oua, amyrum: similiaq;
 quæ pituitam faciunt crassiorem. Siti quanta maxime sustineri potest,
 pugnandum est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoq; usus
 est: adijciendus est cibo pisciculus, aut atro: sic tamen ne protinus iu-
 stus modus cibi sumatur. uino meraco copiosius utendum est. At si in
 pulmonem quoq; destillat: multoq; magis & ambulatione, & frictio-
 ne opus est. eademq; adhibita ratione in cibis, si non satis illi profi-
 ciunt: acrioribus utendum est. magis somno indulgendum: abstin-
 dumq; à negocijs omnibus. aliquando sed serius & balneum tentan-
 dum. In grauedine autem primo die quiescere: neq; esse: neq; bibere:
 caput uelare: fauces lana circumdare. postero die surgere. diu abstinere
 à potione, aut si res coegerit: non ultra heminam aquæ assumere. Ter-
 tio die panis non tam multum ex parte interiore cum pisciculo, uel
 leni carne sumere: aqua bibere. Si quis sibi temperare non potuerit,
 quo minus pleniore uictu utatur: uomere. Vbi in balneum uentum
 est, multa aqua calida caput, & os fouere usq; ad sudorem. tum ad ui-
 num redire post quæ uix fieri potest, ut idem incommodum maneant.
 sed si manserit, utendum erit cibis frigidis, aridis, leuibus, humore q;
 minimo: seruatis frictionibus, exercitationibusq; quæ in omni tali ge-
 nere ualitudinis necessariae sunt.

Inna in:
 crullando

Capite transitus ad cervicem est: quæ grauibus admodum morbis obnoxia est. neq; tamen alius importunior, acutiorq; morbus est: quam is qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis: modo mentu pectori annectit: modo rectam, et immobilem cervicem intendit. Priore græci ὀπισθότορον, insequentem ἑμipροσθότορον, ultimū τέταρον appellant. quamvis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utantur. Ea sæpe intra quartū diem tollunt. Si hunc euaserunt: sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur: idq; conuenit. Sed Asclepiades utiq; mittendum sanguinem credidit. Quod quidam uitandum esse dixerunt: eo quod maxime tum corpus calore egeret: isq; esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neq; enim natura sanguinis est, ut utiq; caleat: sed ex his, quæ in homine sunt: hic celerrime uel calefcit: uel refrigescit. Mitti uero nec ne debeat, ex his intelligi potest: quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Vtiq; autem recte datur castoreum: & cum hoc piper, uel laser. Deinde opus est fomento humido, & calido. Itaq; pleriq; aqua calida multa ceruices subinde perfundunt. id in præsentia leuat. sed oportuniores nervos frigori reddit. quod utiq; uitandum est. Vtilius igitur est cerato liquido primum cervicem perungere: deinde admonere uestias, bubulas, uel utriculos oleo calido repletos, uel ex farina calidum cataplasma, uel piper rotundum cum fico contusum. Vtilissimum tamen est humido sale fouere. quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, admonere ad ignem: uel si æstas est, in sole ægrum oportet, maximiq; oleo uetere: si id nō est, syriaco: si ne id quidem est, adipe quā uetustissima cervicem, & scapulas, & spinam perfricare. Frictio cum omnibus in homine uertebis utilis sit: cum is præcipue quæ in collo sunt. Ergo die, nocteq; interpositis tamen quibusdam temporibus hoc remedio utendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefactis. cauendum uero præcipue frigus. Ideoq; in eo conclauis, quo cubabit æger: ignis continuus esse debet: maximiq; tempore ante lucano: quo præcipue frigus intenditur. Neq; inutile erit caput attonsum habere: idq; irino, uel cyprino calido madefacere: & super imposito pilleo uelare. nonnunquam et in calidum oleū totum descendere: uel in aquam calidam: in qua fœnum græcum decoctum sit: & adiecta olei pars tertia. Alius quoq; ducta sæpe superiores partes resoluit. Si uero etiam uehementius dolor creuit: admonendæ cerniculus curbitulæ sunt sic, ut cutis incidatur: eadem aut feramentis, aut

ad hunc finem =
humidum.

Cervicis

per frictum
malagma opus

sinapi adurendæ. Vbi leuatus est dolor, moueriq; ceruix cœpit, scire licet cedere remedijs morbum. Sed diu uitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum: itemq; ouis sorbilibus: aut à pullis mollibus ius aliquod assumendum. id si bene processerit: iamq; ex toto recte se habere ceruices uidebuntur: incipiendum erit à pulticulâ, uel intrita bene madida. Celerius tamen etiâ panis mandendus, quàm uinum gustandum. si quidem huius usus præcipue periculosus: ideoq; in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus: Et primum de angina, deinde de difficultate spirandi: ultimo de tussi. Caput. IIII.

Angina

T hoc autem morbi genus circa totam ceruicem, sic alterâ æque pestiferum, acutumq; in faucibus esse consuevit: nosstri anginam uocant. apud græcos nomen prout species est. Interdû enim neq; rubor, neq; tumor ullus apparet: sed corpus aridum est: uix spiritus trahitur: membra soluantur. id ουράχην uocant. Interdum lingua, faucesq; cum rubore intumescunt: uox nihil significat. oculi uertuntur. facies pallet. singultusq; ē: id ουράχην uocatur. Illa communia sunt, æger non cibum deuorare: nō potionem potest: spiritus eius includitur. Lenius est ubi tumor tantummodo et rubor est: cetera non sequuntur: id παραουράχην appellant. Quicquid est, si uires patiuntur, sanguis mittendus est. si non abundat: secundum est ducere aluum. Cucurbitula quoq; recte sub mento, et circa fauces admouetur: ut id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fo mentis humidis. nam sicca spiritum elidunt. Ergo admoovere spongas oportet: quæ melius in calidum oleum: quàm in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusq; est hic quoq; salis calidi succus. Tum commodum est hyssopum, uel nepeta, uel thymum, uel absinthium, uel etiam surfures, aut ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere: eaq; gargarizare. post hæc palatum ungere uel felle taurino, uel eo medicamento, quod ex moris est. polline etiam piperis id recte respergitur. si per hæc parum proficitur, ultimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, et in palato citra unam uel eas uenas, quæ sub lingua sunt: ut per ea uulnera morbus erumpat. quibus si non fuerit æger adiutus: scire licet malo uictum esse. si uero his morbus leuatus est: iamq; fauces, et cibum, et spiritum capiunt: facilis ad bonâ ualeitudinē recursus est. Atq; interdum natura quoq; adiuvat: si ex angustiore sede uitium transit in latiore. Itaq; rubore, et tumore in præcordijs orto, scire licet fauces liberari.

Quicquid



Quicquid autem eas leuabit, incipiendum est ab humidis, maximeque aqua mulsa decocta: deinde assumendi molles, et non acres cibi sunt: donec fauces ad pristinum habitum reuertantur. Vulgo audio si quis pulum hirundinis ederit: angina toto anno non periclitari. seruatumque cum ex sale cum is morbus urget: comburi, carbonemque eius contritum in aquam mulsam: quae potui datur: in fricari, et prodesse. Id cum idos neos authores ex populo habeat: neque habere quicquam periculi possit, quamuis in monumentis medicorum non legerim: tamen inferendum huic operi meo credidi.

Pully hirundinis

De difficultate spirandi.

St etiam circa fauces malum, quod apud graecos aliud, atque aliud nomen habet: prout se intendit. Omne in difficultate spirandi consistit. Sed haec dum modica est, neque ex toto strangulat: *σπασμο* appellatur. Cum uehementior est, ut spirare aeger sine sono, et anelatione non possit, *σπασμα*. Cum accessit id quoque: ne nisi recta ceruice spiritus trahatur, *σπασμο*. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi. Duo in sequentia acuta esse consuerunt. His communia sunt, quod propter angustias, per quas spiritus euadit: sibilum elidit: dolor in pectore, praecordijque est: interdum etiam scapulis: isque modo decedit: modo reuertitur. ad haec tussicula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet: in sanguinis detractio. Neque id satis est: sed lacte quoque ueter soluedus est. Liquanda alius: interdum etiam ducenda. quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem et in lecto sublime habendum est. thorax fomentis, cataplasmatibusque calidis, aut siccis, aut etiam humidis adiuuandus est: et postea uel malagma super imponendum: uel certe ceratum ex cyprino, uel irino unguento. Sumenda deinde ieiuno potui mulsa aqua: cum qua uel hyssopus cocta, uel contrita capparis radix sit. Datur et utiliter aut nitrum, aut nasturcium, frictum allium, deinde contritum, et cum melle mixtum: simulque coquatur mel, galbanum, resina terebinthina: et ubi coierunt ex his quod fabae magnitudinem habet, cottidie sub lingua liquatur. aut sulphuris ignem non experti, pondo et quadrans abrotani pondo in uini cyatho teruntur: idque tepesfactum sorbetur. Est et non uana opinio uulpinum iecur, ubi siccum et aridum factum est: contundi oportere: polentamque ex eo potioni aspergi: uel eiusdem pulmonem quam recentissimum assum, sed sine ferro coctum, edendum esse. Praeter haec sorbitionibus, et lenibus cibis utendum est. interdum uino tenui austero: nonnunquam uomitu. Pro sunt et quaecumque

Amr

Siguan

Cumfio

huc vultu

Aurelij Cor.

g ij

LIBER

urinam augent. sed nihil magis quam ambulatio lenta penè usq; ad lassitudinem, frictio multa præcipue inferiorum partium uel in sole, uel ad ignem, & per se ipsum, & per alios usq; ad sudorem. In interiore uero faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac pleriq; extrinsecus cataplasmatibus calidis, fomentisq; humidis utuntur. Volunt etiam uaporem calidum ore recipi: per quæ molliores alij partes eas fieri dicunt: oportunioresq; uitio iam hærenti. Sed si bene scuitari morbus potest: tanta illa præsidia. si metus eius est, supernacua sunt. Utq; autem perfricare fauces periculosum est. exulcerat enim. neq; utilia sunt quæ urinae mouendæ sunt apta: quia possunt, dum transeunt, ibi quoq; pituitam extenuare: quam suppressi melius est. Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoq; secuti sumus: author bonus, acetum ait quàm acerrimum esse sorbendum. Hoc enim sine ulla noxa comprimit ulcera sed id suppressere sanguinem potest: uel ipsa sanare non potest. Melius huic rei licium est: quod idem quoq; æque probat, uel porri, uel marrubij succus, uel nuxes græcæ cum trachanto contritæ, & cum passo mixtæ, uel lini semen contritum, & cum dulci uino mixtum. exercitatio quoq; ambulandi, currendiq; necessaria est. Frictio à pectore uehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi uero esse debent neq; nimium acres, neq; asperi: mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis quoq; atro, præcipueq; porrum, et quicquid cum hoc mixtum est. Potionis quàm minimum esse conuenit. Aqua dari potest, uel pura, uel in qua malum cydoneum, palmulæ uel decoctæ sunt. Gargarizationes quoq; lenes. sin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neq; acutum est: & potest esse non longum. curationem tamen maturam, ne uehementer, & diu ledat: desiderat.

De tussi.

Vssis uero ferè propter faucium exulcerationem molestus est: quæ multis modis contrahitur. Itaq; illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoq; male habere: & uix cum uetus facta est, eliditur. ac modo arida est: modo pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoq; die bibere. spiritum retento currere: sed minime in puluere, ac lectione uti uehementi. quæ primo impeditur à tussi, post eam uincat. tum ambulare: deinde per manus quoq; exerceri: & pectus diu perfricare. Post hæc quàm pinguius si quis uncias tres supra prunas incoctas esse. Præter hæc si humida est, prosunt frictiones ualidæ cum quibusdam calefacientibus sic, ut caput quoq; si uel uehementer perfricetur. Item cu-

*Asclepiades
multam omni
aut ser bonus.*

curbitulae pectori admotae. sinapi ex parte exteriori faucibus impositum: donec leuiter exulceret. potio ex menta, nucibusq; graecis, & amylo: primoq; assumptus panis aridus: deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum ea uehementissime urget: adiunat uini austeri cyathus assumptus: dum ne amplius id interposito tempore aliquo, quam ter, aut quater fiat. Item laseris quam optimi paulum deuorare opus est: porri, uel marrubij succum assumere: scylla delingere: acetum ex ea uel certe acre sorbere: aut cum spica alij contriti duos uini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi est peregrinatio, navigatio longa, loca maritima, natationes. Cibus interdum mollis, ut malua, ut urtica. interdum acer, ut lac cum allio coctum. sorbitiones quibus laser sit adiectum: aut in quibus porrum incoctum tabuerit: onum sorbile sulphure adiecto: potui primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus haec, alijs uinum. Magis terreri potest aliquis cum sanguine expuit. sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit enim modo ex ginguis, modo ex ore. & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere sine ginguarum ullo uitio: ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atq; interdum sanguis profluit: interdum simile aquae quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is a summis faucibus fertur: modo exulcerata ea pte, modo non exulcerata: sed aut ore uenae alicuius ad aperto, aut tuberculis quibusdam natis ex his sanguine erumpente. quod ubi incidit, neq; laedit potio aut cibus: neq; quicquam aut ex ulcere excreatur. aliquando gutture, & arterijs exulceratis, frequens tussis sanguinem quoq; extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex iocinere feratur. Saepes foeminae quibus sanguis per menstrua non respondet: hunc expuunt: authoresq; medici fuerunt, uel exesa parte aliqua sanguinem exire: uel rupta, uel ore alicuius uene patefacto. Prima διαβρωσις, secundam ἰσχυρὰ μὲν ἁρμόνιον, tertiam ἀνάστροφον appellat. ultima minime nocet. prima grauissime. Ac saepe quidem euenit, uti sanguinem pus sequatur. interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad ualitudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt: si pus, si tussis est, pro ut sedes ipsa est: ita uaria, et periculosa genera morborum sunt. Si uero sanguis tantum fluit: expeditius, & remedium, & finis est. Neq; ignorari oportet eis, quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxae uel, aut post cursum uehementem, uel ambulationem: dum febris absit: non esse inutile sanguinis mediocre profluvium. idq; per urinam redditum ipsam quoq; lassitudinem soluere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decedit. si tamen in eius urina nihil morabit. Neq;

uomitum huius afferre periculum etiā cum repetit, si ante confir-
 re & implere corpus licuit: & ex toto nullū nocere: qui in corpore
 robusto neq; nimius est: neq; tussim, aut calorem mouet. Hæc pertinent
 ad uniuersum. Nunc ad ea loca, quæ proposui, ueniam. Si ex gingui-
 exit, portulacā manducasse satis est. si ex ore, continuisse eo merum
 uinum. si parum id proficit, acetum. si inter hæc quoq; grauiter erum-
 pit, quia consumere hominem potest: commodissimum est: impetum eius
 admota occipitio cucurbitula sic, ut cutis quoq; incidatur: auertere. Si
 id mulieri cui menstrua non feruntur, euenit: eandem cucurbitulam
 inasis inguinibus eius admo-
 uere. At si ex faucibus, interioribusue
 partibus processit, & metus maior est: et cura maior adhibenda. San-
 guis mittendus est: & si nihilominus ex ore processit, iterum, tertioq;
 & cotidie paulum aliquid: protinus autem debet sorbere uel acetum,
 uel etiam cum thure plantaginis, aut porri succum. imponendaq; ex-
 trinsecus supra id quod dolet, lana succida ex aceto est: & id spongia
 subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoq; et femora,
 brachiaq; pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo nō prodesse,
 ut etiam inimicum esset: proposuit. Sed id sæpe commode respondere
 experimenta testantur. Neq; tamen pluribus locis deligari necesse est.
 sed sat est infra inguina, & super talos, summosq; humeros, etiam
 brachia. Tum si febris urget, danda est sorbitio et potui aqua: in qua
 aliquid ex his, quæ aluum astringunt: decoctum sit. at si abest febris,
 uel elota alia, uel panis ex aqua frigida, & mole quoq; ouum dari
 potest potui: uel idem quod supra scriptum est: uel uinum dulce, uel
 aqua frigida: sed sic bibendum erit, ut sciamus huic morbo sitim pro-
 desse. præter hæc necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput hu-
 ius quoq; cubātus sublime esse debet: recteq; tondetur. Facies sæpe aqua
 frigida fouenda est. At inimica sunt uinum, balneum, uenus. in cibo
 oleum, acris omnia. item calida fomenta. conclaue calidum, & inclu-
 sum. multa uestimenta corpori iniecta. etiam fricationes ubi bene etiā
 sanguis conquieuit. Tum uero incipiendum est à brachijs, cruribusq;
 à thorace abstinendum. In hoc casu per hyemem locis maritimis, per
 æstatem mediterraneis opus est.

De stomachi morbis, & curationibus. Caput. V.

f Auibus subest stomachus: in quo plura longa uitia inci-
 dere consueverunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio
 hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit. Inter-
 dum pituita, interdum bilis oritur. frequentissimumq;
 est eius

est eius malum quo resoluitur: neq; ulla re magis aut afficitur: aut corpus afficit. Vt diuersa autem uitia eius, sic etiā remedia sunt. Vbi ex-
astuat, aceto cum rosa extrinsecus subinde fouendus est. imponendusq;
puluis cum oleo, & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt: &
moliunt. Potui, nisi quid obstat: gelida aqua præstanda. Si inflatio est,
 prosunt admotæ cucurbitulæ: neq; incidere cutem necesse est. prosunt
 siatæ, & calida fomenta, sed non uehementissima. Interponenda abste-
 nentia est. Vtilis in ieiunio potio est absinthij, aut hyssopi, aut rutæ.
 Exercitatio primo lenis, deinde maior adhibenda est: maximeq; quæ
 superiores partes moueat. quod genus in omnibus stomachi uitij
 aptissimum est. Post exercitationem opus est unctione, frictione: balneo
 quoq; nonnunquam, sed rarius: interdum alui ductione. Cibis deinde
 calidis, neq; inflatibus. eodemq; modo calidis potionibus: primo aquæ:
 post ubi resedit inflatio: uini austeri. Illud quoq; in omnibus stomachi
 uitij præcipiendum est, ut quo modo se quisq; aeger refecerit: eo ut sa-
 nus utatur. Nam redit huic imbecillitas sua: nisi hisdem defendatur
bona ualeitudo, quibus reddita est. At si inflamatio aliqua est: quæ ferè
 tumor, & dolor sequitur: prima sunt quies, & abstinentia. Lana sul-
 phurata circumdata: in ieiunio absinthium. si ardor stomachum ur-
 get, aceto cum rosa subinde fouendus est: deinde cibis quidem utendū
 est modicis. Imponenda uero extrinsecus quæ simul & reprimunt: et
 moliunt. deinde his detractis utendum calidis ex farina cataplasma-
 tis: quæ reliquas digerant. Interdum alui ducenda. Adhibenda exer-
 citatio, & cibis plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem
 ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exer-
 citatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues, &
 glutinosi cibi, sed citra sacietatem. Omnia acria, atq; acida remouen-
 da. Vino, si febris nō est, dulci: aut si id inflat, certe leni utendum, sed
 neq; præfrigido, neq; nimis calido. si uero pituita stomachus impletur:
 necessarius modo in ieiunio, modo post cibum uomitus est. Vtilis exer-
 citatio, gestatio, nauigatio, frictio. Nihil edendum, bibendumq; nisi cali-
 dum: uitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consuerunt. Mole-
 stus est: si stomachus bile uitiosus est. Solent autem hi qui sic tentan-
 tur: interpositis quibusdam diebus hanc, & quidem quod pessimum
 est, atram mouere. His recte alui ducitur. potiones absinthio dan-
 tur. necessaria gestatio nauigatio est, si fieri potest ex nausea uomitus.
 uitanda cruditas. sumendi cibi faciles, & stomacho non alieni. uinū
 austerum. Vulgatissimum uero, pessimumq; stomachi uitium est resolu-
 tio: id est cum cibi non tenax est: soletq; desinere ali corpus: ac sic tabe
 consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones exercitat=

Egestio

Inflatio

Inflatio

Exulceratio

Absterus capio

Bilis absterus

Prosolutio

ionesq; superioris partis necessariae. Itē unctiones, frictionesq; his per-
fundi frigida, atq; in eadem natate: canalibus eiusdem subycere etiam
stomachū ipsum, & magis etiam à scapulis, id quod contra stomachū
est. Consistere in frigidis, medijs capitisq; fontibus quales cutiliarū, sym-
bruinarumq; sunt: salutare est. Cibi quoq; assumendi sunt frigidi: qui
potius difficulter coquantur: quàm facile nitantur. Ergo pleriq; qui
nihil aliud concoquere possunt: bubulam coquant. Ex quo colligi po-
test, neq; auem, neq; uenationem, neq; piscem dari debere: nisi generis
durioris. Potui quidem aptissimum est uinum frigidum, uel certe bene
calidum meracum: potissimum rheticum, uel allobrogicum: aliud ue,
quod & austerum, & resina conditum est. si id non est: quàm asper-
rimum, maximeq; signinum. Si cibus non continetur, danda aqua: &
eliciendus plenior uomitus est: iterumq; dandus cibus, & tum admo-
uendæ duobus intra stomachum digitis cucurbitula: ibiq; duabus, aut
tribus horis continendæ sunt. Si simul & uomitus, & dolor est, im-
ponenda supra stomachum est lana succida, uel spongia ex aceto, uel
cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda uero non diu, sed uehemen-
ter brachia, & crura: & calefacienda. Si plus doloris est, infra præ-
cordia quatuor digitis cucurbitula utendum est: protinus dandus pa-
nis ex posca frigida. Si non continuit: post uomitum lene aliquid ex
his, quæ non aliena stomacho sint. Si ne id quidem tenuit: singuli cya-
thi uini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens
etiam medicamentum est radiculæ si. atus, ualencius acidi punici mali
compari modo succi, qui ex dulci punico malo est: adiecto etiam intu-
bi succo & menta: sed huius minima parte: quibus tantundem quan-
tum in his omnibus est aquæ frigida, quàm optime miscetur. Id enim
plus quàm uinum ad comprimendum stomachum potest. Supprimen-
dus autem uomitus est, qui per se uenit sic, si nausea est. Sed si coacuit
intus, cibus aut computruit: quorum utrumlibet ructus estendit: eijc-
tus est: protinusq; cibus assumptis hisdem, quos proxime posui: stoma-
chus restituendus. Vbi sublatus est præsens metus, ad ea redeundum
est: quæ supra præcepta sunt.

De laterum doloribus. Caput. VI.

Plenitudo.

Stomachus lateribus cingitur: atq; in his quoq; uehemen-
tes dolores esse consueverunt. & initium uel ex frigore, uel
ex ictu, uel ex nimio cursu, uel ex morbo est. Sed interdū
ne malum intra dolorem est: usq; modo tarde, modo cele-
riter soluitur. interdum ad perniciem quoq; procedit. oriturq; acu-

ius morbus, qui *καταπληξ* à grecis nominatur. Huic dolori lateris febris, & tussis accedit. & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus est: pituita si grauis sanguis. Interdum etiam sicca tussis est: quæ nihil emollitur. idq; primo uitio grauius: secundo tolerabilius est. Remediū uero est magni, & recentis doloris sanguis missus. At siue lenior, siue uetustior casus est: uel superuacuum, uel serum id auxilium est. confugiendūq; ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Recte et sinapi ex aceto super pectus imponitur: donec ulcera, pustulasq; excitet: & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc circundare primum oportet latus absolantæ sulphurata. deinde cum paulum inflammatio se remittit: siccis, & calidis fomentis uti. Ab his trāsitus ad malagmata est. Si uetustior dolor remanet: nouissime resina imposita discutitur. Utendum cibis, potionibusq; calidis. uitandum frigus. Inter hæc tamen non alienum & extremas partes oleo, & sulphure perfricare. Si leuata tussis est: leni lectione uti. iamq; & acres cibos, & uinum meracius assumere. quæ à medicis præcipiuntur: ut tamen sine his rusticos nostros epotæ ex aqua herba trixago satis adiuuet. Hæc in omni lateris dolore communia sunt. plus negotij est, si acutus quoq; morbus is factus est. In hoc præter ea quæ supra posita sunt, hæc animaduertenda sunt, ut cibus sit quàm maxime tenuis, & lenis, præcipueq; sorbitio: eaq; ex ptisana potissimum, aut ius in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit. Idq; non nisi tertio quoq; die detur: si tamen per uires licebit. potui uero aquamulsa in qua hyssopum, aut ruta decocta sit. quæ quibus temporibus danda sint: ex ratione uel adiectæ, uel leuata febris apparebit sic, ut in remissione quàm maxima dent: cum eo tamen, ut sciamus non esse eius generis tussi aridas fauces committendas. sepe enim ubi nihil est quod excreatur: continuatur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam prius id genus esse tussis: quod nihil, quàm quod pituitam moueret. Sed hic uinum sorbere, ut supra præcepimus: morbus ipse non patitur. inuicem eius cremor ptisanæ sumendus est. Ut his autem in ipso morbi furore sustinendus æger est: sic ubi paulum is se remittit: alimenta pleniora, & uini quoq; aliquid dari potest. dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectioe quoq; manserit tussis, intermittere oportebit uno die: posteroq; cum cibo uini paulo plus assumere. atq; inapiente quoq; tussi tam non erit alienum, ut supra quoq; positum est: uini cyathos sorbere. Sed in hoc genere ualitudinis dulce, uel certe lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico uictu corpus firmandum est.

Causa.

Triplex f.
Causa.

LIBER.

De uiscerum morbis: & primo de pulmone, deinde de iocinere, tum de liene, postremo de renibus. Caput. VII.

Pulmo

Compagine uero corporis ad uiscera transeundū est: & in primis ad pulmonem ueniendum: ex quo uehemens & acutus morbus oritur, quem *περιπνευμονιον* græci uocant. eius hæc conditio est. Pulmo totus afficitur. hunc eius casum subsequitur tussis: bilem, uel pus trahens: præcordiorū totiusq; pectoris grauitas: spiritus difficultas, magnæ febres, continua uigilia, cibi fastidium, tabes. Id genus morbi plus periculi, quàm doloris habet. Oportet si satis ualidæ uires sunt, sanguinem mittere: si minores, cucurbitulas sine ferro præcordijs adnouere. Tum si satis ualet, gestando agrum digerere: si parum, intra domum tamen dimouere. Potionem autem hyssopi dare, cui ficus arida sit incocta: aut aquam mulsam, in qua uel hyssopum, uel ruta decocta sit. Frictione uti diutissime in scapulis: proxime ab his in brachijs, & pedibus, & cruribus, leniter contra pulmonem. idq; bis cotidie facere. Quod ad cibum uero pertinet: huic nec salsis opus est, neq; acribus, neq; amaris, neq; aluum astringentibus: sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est sorbitio ptisanæ, uel alicæ, uel orizæ: cum qua recens adeps cocta sit. Cū hac sorbile ouum, nuclei pinei ex melle. panis, uel elota alicæ ex aqua mulsæ. potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsæ egelida, aut si æstas est, etiam frigida: nisi quid obstat. hæc autem altero quoq; die incremente morbo dare satis est. Vbi incremento constitit quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est: præterquam aqua egelida. Si uires defunt, adiuuandæ sunt aqua mulsæ. profunq; aduersus dolores imposita calida fomenta, uel ea quæ simul & reprimunt, & emolliunt. Prodest impositus super pectus sal bene contritus, cum cerato mixtus, quia leniter cutem erodit: coq; impetum materiæ, quo pulmo uexatur: euocat. Vtile etiam aliquod magma est ex his, quæ materiam trahunt. Neq; alienum est dum premit morbus, clausis fenestris agrum continere. Vbi paulum leuatus est, ter, aut quater die fenestris aliquanto apertis paruum aërem recipere. Deinde in refectione pluribus diebus à uino abstinere. gestatio ne, frictione uti. sorbitionibus, & prioribus cibis adijcere ex oleribus porrum, ex carne ungulas, & summa trunculorum, atq; pisciculos sic, ut diu nihil molle, & lene sumatur.

Iecur

Lterius quoq; uisceris morbus idest iocineris æque modo longus, modo acutus esse consuevit: n̄ tatinōv græci uocāt. Dextra parte sub præcordijs uehemens dolor est. idemq; ad latus dextrum, & ad iugulum, humerumq; partis eiusdem peruenit. nonnunq; manus quoq; dextra torquetur. horror calidus est. Vbi male est, bilis euomitur. interdū singultus propè strangulat. & hæc quidem acuti morbi sunt. Lōgioris uero ubi suppuratio in iocinere est: dolorq; modo finitur: modo intenditur: dextra parte præcordia dura sunt: & tument. post cibum maior difficultas est. accedit maxillarum quædam resolutio. ubi inueterauit malum, uenter et crura, pedesq; intumescunt: pectus, atq; humeri, circaq; iugulū utrumq; extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est. tum uenter soluendus est: si non potest aliter, per nigrum ueratrum imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ reprimant: deinde calida, quæ deducant. q̄bus recte iris, uel absinthium adiicitur: post hæc malagma. Danda uero sorbitiones sunt: omnesq; cibi, & calidi, & qui non multum alant: & ferè qui pulmonis quoq; dolori conueniunt: præterq; eos, qui urinam mouent: potionesq; ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thymum, satyria, hyssopum, nepeta, amyllum, sisamum, lauri bacca, pini flos, herba sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, columbæ iecur recens, & crudum. Ex quibus quædam per se esse, quædam adijcere uel sorbitioni, uel potioni licet: sic tamen ut parce assumentur. Neq; alienum est absinthium contritum ex melle, et pipere: eiusq; catapotium cotidie deuorare. abstinendum utiq; est ab omnibus frigidis: neq; enim res ulla magis iecur lædit. Frictionibus utendum in extremis partibus. uitandus omnis labor: omnis uehementior motus. ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, ictus, cursus inimici sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est, calida: si æstas, tepida. Item liberalis unctio: & in balneo sudor. Si uero iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id scalpello aperiunt: ipsam uomicam adurunt.

Iecur columbæ

frigidis huius conueniunt.

Lien

T lienis ubi affectus est, intumescit: simulq; cum eo pars sinistra, eaq; dura est: & prementi renititur: uenter intentus est: aliquis etiam cruribus tumor est. Vlcera aut omnino nō

LIBER

sanescunt: aut certe cicatricem uix recipiunt. In intentā ambulatione, cursumq; dolor, et quaedam difficultas est. hoc uitium quies auget. Itaq; exercitatione, et labore opus est: habita tamen ratione ne febre mixta si nimium procefferit, excitetur. Vnctiones, frictionesq; et sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt. item lac, et caseus. Acida autem maxime conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, et magis etiam quod scylla conditum est: expedit. Edenda sunt salsamenta, uel olea ex muria dura: tincta in aceto lactuca, intubiq; et betta ex eodem. ex sinapi asparagus, armoracia, pastinaca, ungula, rostra, aues macrae, eiusdem generis uenatio. Potui uero ieiunio dari debet ab sinthium incoctum. at post cibum aqua a ferrario fabro: in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Haec enim uel praecipue lienem coercet: quod animaduersum est in his animalibus: quae apud hos fabros educata, exiguos lienes habent. potest etiam dari uinum tenue, austerrum: omniaq; in cibis, et potionibus, quae urinae mouenda sunt: praecipueq; ad id ualet uel trifolij semem, uel cuminum, uel apium, uel serpillum, uel citisus, uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hyssopum, uel satureia. haec enim inde commodissime uidentur humorem deducere. Lienis quoq; bubulus utiliter esui datur: praecipueq; eruca, et nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoq; extrinsecus sunt quae leuent. Fit ex unguento, et palmulis, quod $\mu\rho\rho\beta\alpha\lambda\alpha\nu\rho$ graeci uocant. Fit ex lini, et nasturtij semine, quo uinum, et oleum adijcitur. fit ex cupresso uiride, et arida ficu. fit ex sinapi, cui seui hirquini a renibus quarta pars ponderis adijcitur: teriturq; in sale, et protinus imponitur. Multisq; modis huic rei appari aptum est. Nam et ipsum cum cibo assumere, et muriam eius cum aceto sorbere, commodum est. Quin et extrinsecus radicem contritam, uel corticem eius cum furfuribus, aut ipsum appari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoq; huic rei aptantur.

De renum morbis, et curationibus. Caput. X.

Renibus ubi affecti sunt: diu male habent. Peius est si frequens biliosus uomitibus accedit. Oportet conuiescere: cubare molliter: soluere aluum si aliter non respondet, etiam ducere. Saepes desiderare in aqua calida: neq; cibum, neq; potionem frigidam assumere. abstinere ab omnibus salsis, acerbis, acidis pomis: bibere liberaliter: adijcere modo cibo, modo potioni piper, porrum, ferula, album papauer: quae maxime inde urinam mouere consuerunt. Auxilio quoq; his exularatis sunt, si adhuc ulcera purganda

*Dulcia inimica
aero acceptu.*

ag. chulybrato

ling. Bubuly.

Ren.

plens

sunt: cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex pinis silvestri duodecim, anesi quod tribus digitis sumi possit: croci paulū, cōtrita et in duas mulsū potiones diuisa. si uero dolor tantū lenādus est: eiusdē cucumeris semina triginta, ijdē nuclei uiginti, noces græce quīq; croci paululū, contrita, et cū lacte potui data. At sup̄ quoq; recte quædā malagmata inijciuntur: maximeq; ea quæ humori extrahendo sunt.

De intestinorum morbis, & primo de cholera. Caput. XI.

Visceribus ad intestina ueniēdum est: quæ sunt et acutis, & longis morbis obnoxia. Primo æque faciēda mentio est cholera: quia cōe id stomachi, atq; intestinorum uitiiū uideri potest. Nam simul & deiectio, & uomitus est: præterq; hæc inflatio est: intestina torquentur: bilis supra, infraq; erumpit: primum aquæ similis: deinde ut in ea recens atro lota esse uideatur: interdum alba: nonnunquam nigra, uel uaria. Ergo eo nomine morbi hunc *Χολέρα* græci nominarunt. præter ea uero, quæ supra cōprehensa sunt: sepe et crura, manusq; contrahuntur: urget sitis: anima deficit: quibus concurrentibus non mirū est, si subito quis moritur. neq; tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo ubi ista cōperunt: aquæ tepidæ quā plurimum bibere oportet: et uomere. Vix unquam sine uomitu sequitur: sed et si non incidit: misuisse tamē nouam materiā corruptæ prodest: parsq; sanitatis est uomitum esse suppressum: si id incidit: protinus ab omni potione abstinendum est. Si uero tormina sunt: oportet frigidis, & humidis fomentis stomachum fovere: uel si uenter dolet: hisdem egelidis sic, ut uenter ipse mediocriter calentibus inuētur. Quod si uehementer et uomitus, & deiectio, et sitis uexant: & adhuc subcruda sunt, quæ uomuntur: nondū uino maturum tempus est. Aqua, neq; ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. admouendūq; naribus est puleiū ex aceto: uel polenta uino aspersa: uel menta secundū naturam est. At cū discessa cruditas est: tum magis uerendū est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad uinū: id esse oportet tenue, odoratū, cū aqua frigida mixtum: uel polenta adiecta, uel melle quoq; assumere expedit: quotiensq; aliquid aut stomachus, aut uenter effudit: totiens p hæc uires restitue re. Erastistratus primo tribus uini guttis, aut quinīs aspergendā potio nem esse dixit: deinde paulatim merū adijciendū. Is si et ab initio uinū dedit: et metū cruditatis secutus est: non sine causa fecit. Si uehementē infirmitatē adiunari posse tribus guttis putauit: errauit. At si inanis est homo: et crura eius cōtrahuntur: interponēda potio absintij est.

Dolor

Intestinum

cholera

LIBER.

Si extremæ partes corporis frigent, unguenda sunt calido oleo: cui ceræ paulum sit adiectum: calidusq; fomentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra uentriculum ipsum cucurbitula admonenda est: aut sinapi super imponendum. Vbi is constitit, dormire oportet. postero die utiq; à potione abstinere. die tertio in balneis ire. paulatim se cibo reficere: somno: quisquis facile acquiescit. itemq; lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est. tum cibus, uinoq; utendum est. sed hic quidem morbus & acutus est: & inter intestina, stomachumq; uersatur sic, ut cuius potissimum partis sit: non facile dici possit.

De cœliaco uentriculi morbo. Caput. XII.

Ni ipsius uero uentriculi porta consistit is, qui & longus
esse consuevit: νοιαικός à græcis nominatur. Sub hoc uen-
ter indurescit: dolorq; eius est. Aluus nihil reddit: ac ne
spiritum quidē transmittit. extremæ partes frigescunt.
difficiliter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida
cataplasmata toto uentri imponere, ut dolorem leniant. post cibum uo-
mere: atq; ita uentrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitu-
las sine ferro uentri, et coxis admoere. Ventrem ipsum liquare da-
to lacte, & uino salso, frigido. Si tempus anni patitur, etiam uiridibus
ficis: sic tamen ne quis aut cibus, aut humor uniuersus detur: sed pau-
latim. Ergo per intervalla temporis sat est cyathos binos, ternos'ue su-
mere: et cibum pro portione huius. commodèq; facit cyathos lactis, cya-
thus aquæ mixtus, et sic datus. Cibiq; instantes, & acres utiliores
sunt: adeo ut lacti quoq; recte contritum allium adiciatur. Procedente
uero tempore opus est gestari: maximèq; nauigare: perfricari ter, aut
quater die sic, ut nitrum oleo misceatur: perfundi aqua calida post ci-
bum: deinde sinapi imponere per omnia membra excepto capite, do-
nec arrodat: & rubeat: maximèq; si corpus durum, & uirile est.
paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ uentrem compri-
munt. Assa catro danda, ualens, & quæ non facile corrumpatur. potui
uero pluvialis aqua decocta: sed quæ per binos, ternos'ue cyathos bi-
batur. Si uetus uinum est, oportet laser quàm optimum ad piperis
magnitudinem denotare. altero quoq; die uinum, uel aquam bibere:
interdum interposito cibo singulos uini cyathos sorbere: ex inferiori
parte infundere pluvialem egelidam aquam: maximèq; si dolor in-
imis partibus remanet.

De tenuioris

De tenuioris intestini morbo. Caput. XIII.

i Nter ipsa uero intestina consistunt duo morbi: quoru alter in tenuiore, alter in pleniore intestino est. Prior acutus est. insequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum $\chi\omicron\rho\sigma\alpha\tau\omicron\nu$, plenioris $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\nu$ nominauit.

A plerisque uideo nunc illu priorem $\epsilon\iota\lambda\epsilon\omicron\nu$, huc $\kappa\omega\lambda\iota\kappa\omicron\nu$ nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem mouet. Fit ex alterutro loco inflamatio: nec aluus, nec spiritus infra transmititur. si superior pars affecta est, abus: si inferior stercus per os redditur. si utrumlibet uetus est, adiungitur periculo uomitus bilis: mali odoris, aut uariis, aut niger. Remedium est sanguinem mittere: uel cucurbitulas pluribus locis admonere, non ubique: cute incisa. Id enim duobus, aut tribus locis satis est. Ex ceteris spiritum euocare abunde est. Tum animaduertere oportet, quo loco malum sit. solet enim contra id tueri. Et si supra umbilicum est, alui ductio utilis non est. Si infra est: aluum ducere, ut Erasistrato placuit: optimum est. Et sepe id auxiliij satis est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore cum oleo, et melle sic, ut præter ea nihil adijciatur. Si nihil timet, duas manus imponere oportet supra summum uentrem: paulatimque deducere. Inuenietur enim mali locus, qui necesse est, renitatur: et ex eodem deliberrari poterit ducenda nec ne aluus sit. Illa communia sunt, calida cataplasmata admonere: eaque imponere à mammis usque ad inguina et spinam: ac sepe mutare: brachia, cruraque perfricare: demittere totum hominem in calido oleo. Si dolor non quiescit, etiam in aluum ex parte inferiore tres, aut quattuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc consecuti sumus ut iam ex inferiore parte spiritus transmittatur: offerre potui nullum tepidum non multum. nam ante magna cura uitandum est, ne quid bibat. si id commodè cessit: adijcere sorbitionem. Vbi dolor, et febricula quierunt: tum demum uti cibo pleniore: sed neque instante, neque duro, neque ualido: ne intestina adhuc imbecilla ledantur. potui uero nihil præterquam puram aquam. nam siue quid uolentum, siue acidum est: id huic morbo alienum est. Ac postea quoque uitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, ceterosque corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit: et siue cum frigus subit: siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, reuertitur.

Aurelij Cor.

h

Hron

clyster

LIBER

De morbo intestini plenioris. Caput. XIII.

colica

S autem morbus, qui in intestino plenior est: in ea maxi-
 me parte est: quam certum esse proposui. Vehemens infla-
 tio, uehementes dolores dextra magis parte, intestinum
 quod uerti uidetur, propè spiritum elidit. In plerisq; post
 frigora, cruditatesq; oritur: deinde quiescit: & per ætatem sæpe repe-
 tens sic cruciat, ut uitæ spacio nihil demat. Vbi is dolor cœpit, admo-
 uere siat, & calida fomenta oportet: sed primo lenta, deinde uali-
 diora: simulq; frictiones. ad extremas partes id est crura, brachiaq;
 materiam reuocare. Si discussum non est: qua dolet cucurbitulas sine
 ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum,
 quod κωλινδὸν nominatur. id se repperisse Cassius gloriabatur. Ma-
 gis prodest potui datum. sed impositum quoq; extrinsecus digerendo
 spiritum, dolorē leuat. nisi finito uero tormento, recte neq; abus, neq; po-
 tio assumitur. Quo uictu sit utendum qui hoc genere tentantur: iam
 mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod κωλινδὸν nominatur: ex
 his constat. Costi, anesi, castorei singulorū Pondo denariorū triū. petro-
 selini. P. denariorum. III. piperis longi, et rotundi singulorū. P. *. II.
 papaueris lachrymæ, iunci rotundi, myrræ, nardi singulorū. P. VI.
 quæ melle excipiuntur. id autem & deuorari potest: & ex aqua ca-
 lida sumi.

De torminibus, id est dysenteria. Caput. XV.

Dysenteria

Roxima his inter intestinorū mala, tormina esse consue-
 uerunt: δυσεντερία græce uocatur. intus intestina exul-
 cerantur. ex his cruor manat. Isq; modo cum stercore
 aliquo semper liquido, modo cum quibusdā quasi muc-
 cosis excernitur. interdum simul quædam carnosæ descendunt. Fre-
 quens deiiciendi cupiditas, dolorq; in ano est. Cum eodem dolore exi-
 guum aliquid emittitur. atq; eo quoq; tormentum intenditur. idq; post
 tempus aliquod leuatur. exiguaq; requies est. somnus interpellatur. fe-
 bricula oritur. longorq; tempore id malū cum inueterauerit, aut tollit
 hominem: aut etiam si finitur, excruciat. Oportet in primis conque-
 scere. si quidem omnis agitatio exulcerat. deinde ieiunū sorbere uini
 cyathum: cui contrita radix quinq; folij sit adiecta. imponere cata-
 plasmata super uentrem, quæ reprimunt. quod in superioribus uen-
 tris morbis non expedit. quotiensq; desidit, subluere aqua calida: in
 qua decoctæ uerbæ sint. portulacæ uel coctæ, uel ex dura muria
 edisse. cibos, potionesq; eas, quæ astringūt aliū. Si uetustior morbus est,

ex inferioribus ptibus tepidū infundere uel ptisanæ cremorē, uel lac, uel adipem liquatam, uel medullā ceruinam, uel oleum, uel cum rosa buthirum, uel cum eadē album crudum ex ouis, uel aquam: in qua lini semen decoctum sit: uel si somnus non accedit, uitellos cum aqua, in qua rosæ floris folia cocta sint. Leuant enim dolorē hęc, & mitiora ulcera efficiunt: maximeq; utilia sunt, si cibi quoq; secutiū fastidiū est. Themison muria dura quā asperrima sic utendū memorie prodidit. Cibi uero esse debent, qui leniter uentrem destringant: & ea quæ urinam mouent. Si ea consecuta sunt, in aliā partem humorē auertendo prosunt. si non sunt cōsecuta, noxam augent. Itaq; nisi in quibus prompte id facere consuerunt, non sunt adhibenda. Potui, si febricula est: aqua pura calida, uel ea, quæ ipsa quoq; astringat: dari debet. si non est: uinum lene austerū. Si pluribus diebus nihil remedia alia inuerunt, uetusq; iam uitium est: aquæ bene frigide potio assumpta ulcera astringit: & initium secundæ uoletudinis facit. Sed ubi uenter suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies, pessimiq; odor descendere. solet purus sanguis profluere. si superius uitium est, alius aqua mulsa duci debet: tunc demde eadem infundi, quæ supra cōprehensa sunt. Valensq; est etiam aduersus ulcera intestinorum minij gleba, cum salis hemina contrita. si minus, mixta his aqua in aluum datur. Ac si sanguis profluit, ubi, potionesq; esse debent, quæ astringant.

De leuitate intestinorum. Caput. XVI.

X torminibus interdum intestinorū leuitas oritur: quæ continere nihil possunt: & quicquid assumptum est, imperfectū protinus reddunt. id interdum ægros trahit: interdum præcipitat. In hoc utiq; adhibere oportet comprimētia: quo facilius tenendi aliquid intestinis uis sit. Ergo et super pectus ponetur sinapi: exulcerataq; cute malagma, quod humorē euocat: & ex uerbena decoctis aqua desidat: & abos, potionesq; assumat, quæ aluum astringunt: & frigidis utetur perfusionibus. Oportet tamen prospicere ne simul his omnibus admotis, uitium contrariū per immodicas inflationes oriat. Iaculatim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus cotidie adiectis. Et cum in omni fluore uentris, tum in hoc præcipue necessarium est: non quoties libet desiderare, sed quotiens necesse est: ut hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoq; quod æque ad omnes similes affectus ptinet, in hoc maxime seruandū est, ut cum pleraq; utilia insuauia sint, qualis est plantago, et rubi,

Aurelij Cor.

h ij

et quicquid mali corio mixtum est: ea potissimum ex his dentur, quæ maxime æger uolet. Deinde si omnia ista fastidiet ad excitandam cibi cupiditatem, interponatur aliquid minus utile: sed magis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoque morbo necessarie sunt: & cum his sol, ignis, balneum, uomitus ut Hippocrati uisum est: etiam albo ueratro, si cætera parum proficiunt: euocatus.

De lumbricis aluum occupantibus. Caput. XVII.

Nonnunquam autem lumbrici quoque occupant aluum: hi quoque modo ex inferioribus partibus: modo foedius ore redduntur. Atque interdum latos eos, qui peiores sunt: interdum teretes uidemus. si lati sunt, aqua potui dari debet: in qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit: aut cui adiectum sit contritum uel hyssopum, uel piperis acetabulum, uel scamoneæ paulum. uel etiam pridie cum multum allium ediderit: uomat. Posteroque die mali punici tenues radículas colligat, quantum manu comprehendet: easque contusas, in aquæ tribus sextarijs decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adijciat utri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potiones sumat: aut aquæ, uel muricæ duræ sic adiectæ. tum desidet subiecta calida aqua in pelue. si uero teretes sunt, qui pueros maxime exercent: & eadem dari possunt, & quædam leuiora, ut contritum semen urticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, uel menta cum eadem, uel absinthium decoctum, uel hyssopum ex aqua mulsa, uel nasturcij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, & allium prodest: uel in aluum oleum subter dedisse.

De tenasmo intestinorum morbo. Caput. XVIII.

Tenasmus

St autem aliud leuius omnibus proximis, de quibus superius prædictum est: quod τενεσμος græci uocant. id neque acutis, neque longis morbis annumerari debet: cum & facile tollatur: neque unquam per se inuulet. in hoc aquæ, atque in torminibus frequens, desidendi cupiditas est: æque dolor ubi aliquid excernitur. descendunt autem pituitæ, mucusque similia: interdum etiam leniter subcruenta. sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque recte coacta. desiderare oportet in aqua calida: sæpiusque ipsum manum nutrire: cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, aqua ex aceto liquata, emplastrum id, quod τερρακώπια græci uocant: rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & ita appositum: eademque ex inferiore

ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, eadem uerbenæ decoctæ, ut inferiores partes foueantur: alternis uero diebus aqua, alternis leue, & austerum uinum bibendum est. Potio esse debet egelida, & frigida. proprior ratio uictus talis, qualem in tormina supra præcepimus.

De uentris fluxu, & curatione. Caput. XIX.

1 Euior etiam dum recens deiectio est, ubi & liquida aluus, & sæpius, quàm ex consuetudine fertur. atq; interdum tolerabilis dolor est: interdum grauissimus: idq; peius est. sed uno die fluere aluum sæpe pro ualitudine est, atq; etiam pluribus: dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. purgatur enim corpus: & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. uerum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas excitat: uiresq; consumit. primo die quiescere satis est: neq; impetum uentris prohibere: si per se desit, balneo uti: paulum cibi capere. si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die, si nihilominus liquida aluus est, æque conquiescere: paulum astringentis cibi sumere: tertio die in balneum ire: uehementer omnia præter uentrem perfricere: ad ignem lumbos, scapulasq; admouere: cibi uti, sed uentrem contrahentibus: uino non multum merato. Si postero quoq; die fluat, plus edisse: sed uomere etiam ex toto, donec conquiescat. Cōtra sitim, fame, uomitu niti. uix enim fieri potest ut post hanc animaduersionē aluus nō contrahatur. Alia uia est, ubi uelis suppressere: cenare: deinde uomere: postero die in lecto conquiescere. uespere ungi sed leniter. deinde panis circa selibrā ex uino amineo uero sumere. tum assū aliquid, maximeq; auem, & postea uinum idē bibere aqua pluuiali mixtum: idq; usq; quintum diē facere: iterumq; uomere. Frigidam autem assidue potione esse debere contra priores auctores Asclepiades affirmavit, & quidem q̄ frigidissimam. Ego experimentis quæq; in se credere debere existimo calida potius, an frigida utatur. Interdum autem euenit, ut id pluribus diebus neglectū, curari difficilius possit. à uomitu oportet incipere: deinde postero die uespere tepido oleo ungi. cibū modicum assumere: uinum meratum quàm asperrium: impositā super uentrem habere cum cærato rutam. In hoc autē affectu corporis neq; ambulatione, neq; frictione opus est. uehiculo sedisse, uel magis et equo prodest. neq; enim ulla res magis intestina cōfirmat. Si uero etiam medicamentis utendum est: aptissimum est id quod ex pomis fit. Vindemiæ tēpore in grande uas coniicienda sunt pira, atq;

Aurelij Cor.

h iij

Musculi & pomis

mala siluestria. si ea non sunt, pira tarentina uiridia, uel signina, mala scandiana uel amerina, myrapia: hisq; adicienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punica, sorba: & quibus magis utimur etiā torminalia sic, ut hæc tertiam ollæ partem teneant. tum deinde ea musto implenda est: coquendumq; id donec omnia quæ indita sunt, liquata in unitatem quadam coeant. Id gustui non insuauis est: & quādoq; opus est, assumptum leuiter sine ulla stomachi noxa uenter tenet. duo, aut tria cochlearia uno die sumpsisse satis est. Alterum ualentius genus est, myrti bacas legere: ex his uinū exprimere: id decoquere ut decima pars remaneat: eiusq; cyathū sorbere. tertium quod quādoq; fieri potest, malum punicum excoquere: exemptisq; omnibus seminibus, membranas quæ inter ea fuerunt iterum conijcere: tū infundere cruda oua, rudiculaq; miscere: deinde malum ipsum super prunam imponere. quod dum humor intus est, non adurit. Vbi sic cum esse coepit, remouere oportet: extractumq; cochleari, quod intus est, edisse. aliquibus adiectis maius momentum habet. Itaq; etiam in piperatum conijcitur: misceturq; cum sale, & pipere. est quid ex his edendum. est pulicula etiam, cum qua paulum est fauo uetere coctum sit, & lenticula cū malicorio cocta, rubiq; acumina in aqua decocta, & ex oleo, atq; aceto assumpta, efficacia sunt. atq; ea aqua, in qua uel palmule, uel malum cotoneum, uel arida sorba, uel rubi decocti sunt, potata. quod genus significo, quotiens potionē dandam esse dico: quæ astringat. Tritici quoq; hemina in uino amineo austero decoquitur: idq; triticū ieiuno, ac sitienti datur. superq; id, uinū id sorbetur. quod iure ualentissimis medicamentis annumerari potest. atq; etiā potui datur uinū signinum, uel resinatum austerū, uel quodlibet austerum. Cōtunditurq; cum corticibus, seminibusq; suis punicū malum, uinūq; tali miscetur: idq; uel merum sorbet aliquis, uel bibit mixtum. sed medicamentis uti nisi in uehementibus malis superuacuum est.

De uulue morbo, & curationibus. Caput. XX.

X uulua quoq; foeminis uehemens malum nascitur: proximeq; ab stomacho uel afficitur hæc: uel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat: ut tanquam comitali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo quod neq; oculi uertuntur: nec spuma profluit: nec nerui distenduntur. sopor tantū est: idq; quibusdā foeminis crebro reuertens perpetuū est. ubi incidit, si satis uirium est: sanguis missus adiuvat. si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut alioqui iacere consuevit: admonere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, uel

*Doxa. hi non est
et phaulon ruy*

*ex pueris
mucundis*

aliud ex his, quæ foedioris esse odoris retuli: quod mulierem excitet. Idemq; aquæ frigida perfusio efficit. adiungetq; ruta contrita cū melle, uel ex cyprino ceratum, uel quodlibet callidum, & humidum cataplasma naturalibus pubetenus impositum. Inter hæc est perfricare coxas, & poplites oportet. deinde ubi ad se redit, circūcadendum uinū est in totum annum: et si casus idē non reuertitur. Frictione quotidie utendū totius quidem corporis: præcipue uero uentris, & poplitum. cibus ex media materia dandus. sinapi super inuē uentrem tertio quoq; aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire cōmode uidetur solanum in lac demissum: deinde contritum, & cera alba, atq; medulla ceruina cum irino, aut seuum taurinum, uel caprinum cum rosa mixtum. dandum potui etiam uel castoreum est, uel git, uel anetum. Si parum pura est, purgatur iunco quadrato. si uero uulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet: & recēs suilla adeps, & ex ouis albū misceatur, idq; apponatur: uel album ex ouo cum rosa mixtum, adiecto: quo facilius consistat, contritæ rosæ puluere. dolens uero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulæ cute incisa in quibus uel etiam sub mammis admotæ. si maligna purgatio est, subiicienda sunt, ^{*} coeuntia. Id faciunt etiam albæ oliuæ, & nigrum papauer cum melle assumptū, & gummi cū trito semine apij liquatum, & cum cyatho passi datum. Præter hæc in omnibus uesciæ doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt: idest spica nardi, croco, cinnamomo, castia, similibusq;. Idemq; et decocta lentiscus præstat. si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est: aut certe coxis admotæ cucurbitulæ cute incisa. At cum urina super potionum modū etiam sine dolore profluēs, maciem, & periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione, & frictione, maximeq; in sole, uel ad ignem. Balneum raurum esse debet: neq; longā in eo mora cibus comprimens. Vinum austerrum meracum, per æstatem frigidum, per hyemem egelidum, sed tantum quantum minimum sit. Infima, alius quoq; uel ducenda, uel late purganda est. Si crassa urina est, uehementior esse debet & exercitatio, & frictio: longior in balneo mora: cibus opus est teneri: uinum idē. In utroq; morbo uitanda oīa sunt, quæ urinam mouere consueuerūt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus. Caput. XXI

St etia circa naturalia uitū, nimia profusio seminis. quod si ne uenere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spatio tabe hominē consumat. In hoc affectu salutare sunt

h iij

Purgatio moderata

Deu bolus

LIBER

uehemētes frīctiones, perfusiones, natationesq; quā frigidissimae. neq;
 cibi, nec potio nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet cruditates:
 omnia instantia. nihil ex his assumere, quae contrahere semen uiden-
 tur: qualia sunt, siligo, simila, oua, alia, amyllum, omnis caro glutino-
 sa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neq; alienum est fouere inferiores
 partes, aqua decocta ex uerbenis comprimentibus. ex hisdem aliqua
 cataplasmata imo ueneri, inguinibusq; circumdare: praecipueq; ex ace-
 to rutam uitare: et ne supinus obdormiat.

De coxarum morbis, et curationibus. Caput. XXII.

Vpere est ut ad extremas partes corporis ueniam: quae arti-
 culis inter se conferuntur. initium a coxis faciam. Harū in-
 gens dolor esse consuevit. isq; hominem saepe debilitat: et
 quosdā non dimittit. Eoq; id genus difficillime curatur: quod fere post
 longos morbos uis pestifera huc se inclināt. quae ut illas partes liberat:
 sic hanc ipsam quoq; affectam praehendit. Fouendum primum aqua
 calida est: deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse ui-
 detur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mi-
 xta capparum cortex concisus, uel lolij farina ex uino diluto cocta, et
 mixta cum acida fece: quaeq; refrigescunt, imponere noctu mala-
 gnata commodius est. Inulae quoq; radix contusa, et ex uino auste-
 ro postea cocta, et late super coxam imposita, inter ualentissima au-
 xilia est: si ista non soluerunt, sale calido, et humido utendum est. Si
 ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admo-
 uendae sunt cucurbitulae: mouenda urina. Alius si compressa est, du-
 cenda. Vltimum est, et in ueteribus quoq; morbis efficacissimum, tri-
 bus, aut quatuor locis super coxam cutem candentibus, feramentis ex-
 ulcerare. Sed frīctione quoq; utendum est, maxime in sole, et eodem
 die saepius: quo facilius ea quae coeundo nocuerunt, dirigantur. Ea q;
 si nulla exulceratio est, etiā ipsis coxis, sicut et ceteris partibus adhi-
 benda est. Cum uero saepe aliquid exulcerandum candenti ferramē-
 to sit, ut materia inutilis euocetur: illud perpetuum est, non ut primū
 fieri potest, huius generis ulcera sanare: sed ea trahere, donec id uiti-
 um, cui per haec opitulantur, conquiescat.

De genuum doloribus, et cura. Caput. XXIII.

Oxis proxima genera sunt: in quibus ipsis nonnunquā do-
 lor esse consuevit. In hisdem autem cataplasmatibus, cucurbitu-
 lisq; praesidium est: sicut etiam cum in humeris, alijsue cō-

missurijs dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui genua dolent: inimicissimum omnium est. Omnes autem eiusmodi dolores ibi inueterauerunt: uix citra uestionem finiuntur.

De articularum doloribus in manibus, pedibusq. Cap. XXIII.

Articulus

N manibus, pedibusq. articularum uitia frequentiora, longioraq. sunt. quæ in podagris, chiragris'ue esse consuerunt. Ea raro uel castratos, uel pueros ante foeminae coitum, uel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt: tentant. ubi sentiri coeperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factum saepe annuam: nonnunquam perpetuam ualitudinem tota praestat. Quidam etiam cum asinino lotio epoto se eluissent: in perpetuum hoc malum euaserunt. Quidam cum toto anno a uino, mulso, uenere, sibi temperassent: securitatem totius uitae consecuti sunt. Idq. utiq. post primum dolorem seruandū est: etiam si quieuit. Quod si iam consuetudo eius facta est: potest quidem aliquis esse securior his temporibus: quibus dolor se remisit. Maiorem uero curam adhibere debent hi, quibus id reuertitur. quod fere uere, autumno'ue fieri solet. Cum uero dolor urget, manu gestari debet: deinde ferri. inambulatione leui se dimouere. Et si podagra est, interpositis temporibus exiguis, inuicem, modo sedere: modo ingredi. tum antequam cibum capiat, sine balneo loco calido leuiter perfricari: sudare: perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinā mouentibus: quotiensq. plenior est, euomere. Vbi dolor uehemens urget: interest sine timore is sit: an tumor cum calore, an tumor iam etiam obcaluerit. Nam si tumor nullus est: calidis fomētis opus est. A quam marinam, uel muriam duram feruescere oportet: deinde in peluem conijcere: Et cum iam homo pati potest, pedes demittere: superq. palam dare: Et uestimento tegere: paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadē aqua leuiter infundere, ne calor intus destituat: ac deinde noctu cataplasmata caleficientia imponere, maximeq. ibisci radicem ex uino coctam. Sin uero tumor, calorq. est, utiliora sunt refrigeratia: recteq. in aqua quam frigidissima articuli continentur. sed neq. quotidie, neq. diu sit: ne nerui ledantur. imponendum uero est cataplasma, quod refrigeret. Neq. tamen in hoc cotidie permanendum: sed ad ea transiendum quæ sic reprimunt, ut emolliant. Si maior est dolor, papaueris cortices in uino coquendi: miscendiq. cum cerato sunt: quod ex rosa factum sit. Vel ceræ, Et adipis suillæ tantundem unā liquandum, deinde his uinum miscendum: atq. ubi quod ex eo impositum est, inat-

Lotum asinino

Ips dolor

Podagra

LIBER

luit, detrahendū, & subinde imponendum aliud est. si uero tumores etiam obcaluerunt, & dolent, leuat spongia: quæ imposita subinde ex oleo, uel aceto, uel aqua frigida exprimitur: aut pari portione inter se mixta, pix, cera, alumen. sunt etiā plura idonea manibus, pedibusq; malagmata. Quod si nihil superimponi patitur, id quod sine tumore est, fouere oportet spongia: quæ in aquam calidam demittatur: in qua, uel papaueris corticis, uel cucumeris siluestris radix decocta sit. tum inducere articulis crocū cum succo papaueris, & ouillo lacte. at si tumor est, foueri qdē debet aqua egelida: in qua lentiscus, alia uē uerbena ex reprimentibus decocta sit. induci uero medicamentum ex nucibus amaris, cum aceto tritis: aut ex cerusa, cui contritiæ herbæ muralis succus sit adiectus. Lapis etiam, qui carnem exedū: quē σαπνό-
παιος græci uocant: excisus sic ut pedes capiat: demissos eos, cum dolēt, retentosq; ibi lenare consueuit. ex quo in Asia lapidi asio gratia est. Vbi dolor, & inflammatio se remiserunt, quod intra dies quadraginta fit: nisi uitium hominis accessit: modicis exercitationibus, abstinentia, unctionibus lenibus utendum est sic, ut etiam acopo, uel liquido cerato cyprino articali perfricentur. Equitare podagricis quoq; alium est. Quibus uero articulorum dolor certis temporibus reuertitur: hos ante, & curioso uictu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit: & crebriore nomitu, & si quis ex corpore metus est, uel alui ductione uti: uel lacte purgari. quod Erasistratus in podagricis expulit: ne in inferiores partes factus cursus pedes replet: cum euident sit omni purgatione, non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocunq; autem morbo quis inualescit, si tarde confirmatur: uigilare prima luce debet. nihilominus in lecto conuiescere. circa tertiam horam leuiter unctis manibus corpus permulcere. deinde delectationis causa quantum inuat, ambulare circumsisa omni negociosa cogitatione, uel actione. tum gestari diu. multa frictione uti. loca, cœlum, cibos sæpe mutare. Vbi triduo, quatri duo uē unum bibit: uno, aut etiam altero die interponere aquam. per hæc enim fiet, ne in uitia tabē inferenti incidat: & ut mature uires suas recipiat. Cum ex toto uero conualuerit, periculose uitæ genus subito mutabit: & inordinate aget. Paulatim ergo debebit, commissis his legibus eō transire: ut arbitrio suo uiuat.

LIBER QUINTVS.

Ixi de his malis corporis, quibus uictus ratio maxime subuenit. Nunc traſeundum eſt ad eā medicinae partem: quae magis medicamenti pugnāt. His multum antiqui auctores tribuerunt: & Erasiſtratus, & hi, qui ſe iuxta pueri uos nominauerunt: praecipue tamen Erophiſus, deducitq; ab illo uiri adeo, ut nullum morbi genus

sine his curarent. Multaq; etiam de facultatibus medicamentorum memoriae prodiderunt. qualia ſunt, uel Zenonis, uel Andriae, uel Apollonij. qui Mys cognominatus eſt. Horum autem uſum ex magna parte Aſclepiades non ſine cauſa ſuſtulit: & cum omni ferē medicamentis ſtomachū ledant, maliq; ſucci ſint: ad ipſius uictus rationem potius omnem curam ſuam tranſtulit. Verū ut illud in plerisq; morbis utiliſſimum eſt, ſic multa admodum corporibus noſtris incidere conſuerunt: quae ſine medicamentis ad ſanitatem peruenire non poſſunt. Illud ante omnia ſciſſe conuenit, quod omnes medicinae partes ita innexae ſint, ut ex toto ſeparari non poſſint: ſed ab eo nomen trahant, a quo plurimum petunt. Ergo ut illa, quae uictu curat, aliquando medicamentum adhibet: & illa, quae praecipue medicamenti pugnāt, adhibere etiam rationem uictus debet: quae multum admodum in omnibus malis corporis proſicit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant: ac ſepe ſimplicia opitulentur, ſepe mixta: non alienum uidetur ante proponere & nomina, & uires, & mixturas eorum: quo minor ipſius curationis ex ſequentibus mora ſit.

De ſimplicibus facultatibus quarūcūq; rerum, ex quibus medicamenta ſiunt: & primo de his, quae ſanguinem ſupprimunt. Caput. I.

Anguinem ſupprimunt atramentum ſutorium, quod graeci χαλκούρεον appellant: chalcitis, acacia, & ex aqua licium, thus, aloe, gummi, plumbum combuſtum, porrum, herba ſanguinalis, creta uel cimolia, uel ſingularis, miſy, frigida aqua, uinum, acetum, alumen, melinum, ſquama & ferri, & aeris. atq; huius quoq; diuſae ſpecies ſunt, alia tantum aeris, alia rubri aeris.

Quae uulnus glutinant. Caput. II.

Glutinant uulnus, myrra, thus, gummi, praecipueq; acanthinum, pſyllen, tragaantha, cardamomum, bulbi, lini ſemen, naſturtium, ouii album, gluten, icthyocolla, uitis alba, conuſae

LIBER

testis suis cochleæ, mel coctum, spongia, uel ex aqua frigida, uel ex uino, uel ex aceto expressa. ex hisdem lana succida, si leuis plaga est: etiam araneū reprimunt, alumen & scissile, quod σχιδὸν uocatur: & liquidum, melinū, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentū sutoriū.

Quæ concoquunt, & mouent pus. Caput. III.

Concoquunt, & mouent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris, & fuligo, & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

Quæ aperiunt uulnera. Caput. IIII.

Uulnera aperiunt tanquam ora in corporibus, quod σόμα græce dicitur: cinnamomum, balsamum, panacis, iuncus quadratus, puleium, flos albæ uiolæ, bdella, galbanum, resina terebinthina, & pinea, propolis, oleum uetus, piper, pyretrum, chamæpytis, uua aminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

Quæ purgant. Caput. V.

Purgant, erugo, auripigmentum, quod ἀποεικὸς à græcis nominatur. Huic autem & sandaracæ in omnia eadē uis: sed ualidior est squama æris, pumex, iris, balsamū, styrax, thus, thuris cortex, resina, & pinea, & terebinthina liquida, œnāthe, lacerti sterco, sanguis columbæ, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacū potest: sed ualentius est abrotanum, ficus arida, coccum gnidium, scæbis eboris, omphaciū, radícula, coagulum, sed maxime leporinū: cui eadem quæ cæteris coagulibus facultas, sed ubiq; ualidior est: fel, uitellus crudus, corui teruini, gluten taurinum, mel crudum, misyos, chalcitis, crocum, uua aminia, abrotanum, spuma argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula, eruū.

Quæ rodunt. Caput. VI.

Rodunt alumen liquidum, sed magis rotundum: ærugo, chalcitis, mysi, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaraca, minium synopicum, galla, balsamum, myrra, thuris cortex, galbanū, resina terebinthina humida, piper utrunq; sed rotundum magis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij semen, narossi radix, omphacium, aleyonium, oleum ex amaris nucibus, allium, mel crudum, uinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, uua aminia, cinnamomum, styrax, acutæ semen, resina, narossi semen, fel, nuges amaræ, oleumq; earum, atramentum sutorium, chrysocolle, ueratrum, cinis.

Quæ exedunt corpus. Caput. VII.

e Xedunt corpus acaciæ suavis, hebenus, ærugo, squama æris, chryso colla, cinis cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hy pocistis, diphyrges, sal, auripigmentum, sulphur, acuta, sandaraca, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum sutorium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifici, uel lactucæ marine, quæ τὸ δ' μάλ' αὐτὸς à græcis nominatur: alcyonium, fel, turturis fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hematites et phrygius, et asius, et scissilis, mysi, uinum, acetum.

Quæ adurunt. Caput. VIII.

a Durunt auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, mysi, ærugo, calx, carta combusta, sal, squama æris, fex combusta, myrra, stercus et lacerti, et columbæ, et palumbi, et hirundinis, piper, coctum guidium, allium, diphyrges, lac utrunq; quod proximo capite supra comprehensum est: ueratrum et album, et nigrum, cantharides, corallium, piretrum, thus, salamandra, eructa, sandaraca, uina aminia, chryso colla, ochra, alumen scissile, ouillum stercus, oenanthe.

Quæ crustas ulceribus inducunt. Caput. IX.

e Adem ferè crustas ulceribus tanquã igne adustis inducunt: sed præcipue chalcitis utiq; si cocta est: flos æris, ærugo, auripigmentum, mysi, et id quo magis coctum.

Quæ crustas ulceribus resolvunt. Caput. X.

c Rustas uero has resoluit, farina triticea cum ruta, uel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discutiat ea, quæ in aliqua pte corporis coierunt. Caput. XI.

D discutieda uero ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt:

a maxime possunt abrotanum, helenium, amaracus, alba uiola, mel, liliū, sampucus, cyprius, lac, fertula campana, serpillum, capressus, cedrus, iris, uiola purpurea, narcissus, rosa, crocum, passum, iuncus quadratus, nardum, cinamomum, cassia, ammoniacum, cera, resina, uina aminia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini, et narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis aut molaris: crudus uittellus, amaræ nuces, sulphur.

Quæ euocant, et educunt. Caput. XII.

e Vocat, et educit iadanium, alumē rotundū, hebenus, lini semē, omphacium, fel, chalcitis, bdeliū, resina terebinthina, et pinea, propolis, ficus arida decocta, stercus columbæ, pumex, farina lolij, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccæ, nitrum, sal.

LIBER

Quæ exasperata leuent. Caput. XIII.

l Enat id quod exasperatum est, spodium, hebenas, gummi, onni album, lac, tragacanthum.

Quæ carnem nutriunt, et ulcus implent. Cap. XIII.

c Arnem alit, et ulcus implet resina pinea, ochra actia, uel asterica, cera, butyrum.

Quæ molliunt. Caput. XV.

m Olliunt æs combustum, terra ereithria, nitrum, papaueris lacryma, ammoniacum, bdellium, cera, seuum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum, sertula campana, narcissi et radix, et semen, rosæ folia, coagulum, vitellus crudus, amara nuges, medulla omnis, stibi, pix, choctea acta, cicuta semen, plumbi recrementum, σκωπ' α' μολυβδου græci uocant: panacis, cardamomum, galbanum, resina, uia aminia, styrax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

Quæ cutem purgant. Caput. XVI.

i Tem cutē purgat mel: sed magis si est cum galla, uel eruo, uel lenticula, uel marrubio, uel iride, uel ruta, uel nitro, uel ærugine.

De mixturis simplicium rerum, et de ratione ponderum, et quid malagma, et emplastrum, et pastillus inter se differant. Caput. XVII.

Xpositis simplicibus facultatibus dicendum est quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem uarie: neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur: alia adijciuntur: ipsæque seruatis ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit: innumerabilia mixturarum genera sunt: quæ comprehendere si possent, tamen esset superuacuum. Nam et ydem affectus intra paucas compositiones sunt: et mutare eas cuilibet cognitis facultatibus facile est. itaque contentus his ero quas accepi uelut nobilissimas. In hoc autem uoluisse eas explicabo: quæ uel desiderari in prioribus potuerunt: uel ad eas curationes pertinent: quas protinus hic comprehendam sic: ut tamē quæ magis cōia sunt, simul iungam. Si qua singulis, uel et paruis ac commodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed et antea sciri uolo, in uncia pondus denariorum septem esse. Vnus deinde denarii pondus diuidi à me in sex partes idest sex uncias: ut idem in uncia denarii habeam, quod græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellant. id ad nostra pondera relatum, paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata uero, atque emplastra, pastilli, quos σκωπ' α' xous græci uocant: cum plurima eadem habeant: differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus, eorumque etiam surculis, Emplastra, pastilli: magis ex quilibet

lxx

dam metallicis fiunt. deinde malagmata confusa abunde mollescunt. nam super integram cutem iniunguntur. Laboriose uero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastilliq; fiunt: ne lædant uulnera cum imposita sunt. Inter emplastrum autem, & pastillum hoc interest: quod emplastrum utiq; liquati aliquid accipit in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. arida medicamenta per se teruntur. deinde mixtis his instillatur aut acetum: aut si quis alius non pinguis humor accessurus est. & ea rursum ex eo teruntur. Ea uero quæ liquari possunt ad ignem simul liquantur: & si quid olei misceri debet: tum infunditur. Interdum etiã aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt quæ seperatim fieri debuerunt: in unum omnia miscentur. At pastilli hæc ratio est. Arida medicamenta contrita humore non pingui aut uino, uel aceto coquuntur, & rursus cocta inarescunt. Atq; ubi utendum est eiusdem generis humore, diluuntur. tum emplastrum imponitur. pastillis illinitur, aut alicui molliori: aut cerato miscetur.

De malagmatis. Caput. XVIII.

Malagma aduersum calidas podagras.

Is cognitis, primũ malagmata subiiciam: quæ ferè non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit ad calidas podagras aptum. Habet gallæ & immature, & alterius coriãdri seminis, citræ, lacrimæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cæratii eloti, quod *πεποσμέ* *ρον* greci uocant: selibram. Reliqua ferè calefaciunt. Sed quædam digerunt materiam: quædam extrahunt, quæ *επιποσμή* uocantur. pleraq; certis magis partibus membrorum accomodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

I materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoq; mediocri, aptum est id quod habet resinæ aridæ, nitri, ammoniaci, galbanæ singulorum pondo, ceræ pondo. Aut in quo hæc sunt, æruginis rasæ, thuris, singulorum. P. *. ammoniaci salis. P. VI. squamæ æris, ceræ, singulorum. P. VIII. resinæ aridæ. P. VII. aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum struthio & melle. P. II.

Malagma ad iecur dolens.

I iecur dolet: id in quo est balsami lacrimæ. P. XII. costi, cinamomi, cassiæ, corticis myrræ, croci, iunci rotundi, balsami, seminis iridis illiricæ, cardamomi, amomi, nardi, singulorum.

Malagma.

LIBER.

P. XVI. quibus adiicitur nardinum unguentum, donec cæratı crassı-
tudo sit. Et huius quidem recentis usus est. Si uero seruandum est, re-
sinæ terebinthinæ. P. XVI. ceræ. P. X. ex uino leni contunduntur, tum
eo miscntur.

Malagma ad lienem.

T si lienis torquet, glādis, quam βάλανος græci uocant:
a cortex, Et nitrum paribus portionibus contunduntur:
respergunturq; aceto quā acerrimo. Vbi cæratı crassı-
tudinem habet, lınteo antea in aqua frigida madefacto
illinitur: Et sic imponitur: supraq; farina hordacea inijcitur: sed ma-
nere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat. satiusq;
est id bis, aut ter fieri. Communem autem Et iocaneri, Et lieni,
Et abscessibus, Et strumæ, parotidibus, articulis, calabus quoq; sup-
purantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni uentris Lysias cō-
posuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani, resinæ, singulorum. P. II.
ammoniā, bdellij, cære, seuı taurini, iridis aridæ. P. IIII. caclirios ace-
tabulo, piperis granis quadraginta. quæ contrita irıpo unguento
temperantur.

Malagma ad laterum dolores.

D laterum autem dolores compositio est, A pollophanis, in
a qua sunt resinæ terebinthinæ, turis, fuliginis, singulorū
P. IIII. bdellij, ammoniaci, iridis, seuı uitalini, aut capri-
ni à renibus siccı singulorum. P. IIII. Hæc aut eadem
omnem dolorem leuant: dura emolliunt: mediocriter calefaciunt. Ad
idem latus Andree quoq; malagma est: quod Et resoluıt: educıt humo-
rem: pus maturat: ubi id maturum est, cutem rumpit: ad cicatricem
perducit. prodest impositum minutis, maioribusq; abscessibus: item ar-
ticulis: ideoq; Et coxis: et pedibus dolentibus. item si quid in corpore
collisum est, reficit: præcordia quoq; dura, Et inflata emollit: ossa ex-
trahit. ad omnia deniq; ualet, quæ adiunare calor potest. id habet
ceræ. P. I. uisci, sycamini, quā aliās sycamorum uocat: lacrimæ sin-
gulorū. P. XI. piperis Et rotundi, Et longi, ammoniaci, thimi amatis,
bdellij, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, xilobalsami, thuris masce-
li, myrræ, resinæ aridæ, singulorum. P. X. pyretri, cocti gnidij, spumæ
nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ creticæ, radices ex cucumere agre
stı, resinæ terebinthinæ liquidæ singulorum. P. XX. quibus adiicitur
unguenti

unguenti irini quantum satis est ad ea mollienda, atq; coeunda.

Malagmata ad resoluenda quæ astricta sunt: & mollienda
quæ dura sunt: & digerenda quæ coeunt.

Recipuum uero est ad resoluenda quæ astricta sunt: molliē
da quæ dura sunt: digerenda quæ coeunt: id quod ad Poly-
archum authorem refertur. habet iunci quadrati, cardamo-
mi, thuris, fuliginis, amomi, ceræ, resinæ liquidæ pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

Lind ad eadem Nilei crocomagmatis, quod quasi recremē
tū eius est. P. XIII. ammoniaci, thymiamatis, ceræ, singulorū,
P. XXX. ex quibus duo priora ex aceto teruntur: cera cū ro-
sa liquatur: & tum omnia iunguntur.

Malagma moschi ad molliendum.

Proprie etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. habet
galbani unciam, thuris fuliginis. P. Z. ceræ, ammoniaci, thy-
miamatis trientes, picis aridæ. P. XII. aceti heminas tres.

Malagma medi ad digerenda quæ coeunt.

Fertur etiam ad digerēda quæ coeunt sub authore Medo,
quod habet ceræ. P. Z. panacis. P. semis, squamæ æris, alumi-
nis rotundi, item scissilis, singulorum. P. Z. plumbi combusti
P. I. & semis.

Malagma Panthemii ad eadem.

De eadē Panthemius utebatur calds. P. semis, sinapis contriti,
item fœni græci, aluminis, singulorum. P. I. Seni bubuli. P.
II. & semis.

Malagma ad strumas.

De strumam multa malagmata inuenio. Credo autem quo
peius id malum est, minusq; facile discutitur: eo plura esse
tentata, quæ in personis uarie responderunt. Andreas author
est, ut hæc misceantur urticæ seminis. P. XI. pipis rotundi, bdellij, gal-
bani, ammoniaci, thymiamatis, resinæ aridæ, singulorū. P. XIII.

Aurelij Cor.

i

LIBER

resinæ liquidæ, ceræ, pyretri, piperis longi, lactucæ marinæ seminis,
sulphuris ignem non experti: quod ἀπὸ πυρὸς vocatur, fecis aridæ, aceti,
spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis ex cucume-
ri siluestri, resinæ, singulorū. P. XV. Quæ ex leni uino contunduntur.

Aliud malagma ad id ualens.

Xpeditius ad idem fit: quod habet uiscæ, semini, stercoreis,
resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in
quo ē sulphuris. P. XI. lapidis quæ πυρίτην vocāt. P. XIII.
umini acetabulum. Itē in quo est lapidis eiusdem pars una, sulphu-
ris duæ partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

Malagma ad strumam, & phymata.

fractis malagma

Rabis autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tuber-
cula, quæ φώματα uocantur: quod hæc digerit. Habet myr-
rhæ, salis ammoniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ,
crocomagmatis, ceræ, singulorū. P. XI. lapidis eius: quem πυρίτην vo-
cāt. P. XIII. quibus quidam adiciunt sulphuris. P. II.

Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

St etiam proficiens in struma, & in his tuberculis: quæ dif-
ficiliter concoquuntur, & in his: quæ καπνιδόσαι uocantur:
quæ ex his cōstat. sulphuris. P. XII. nitri. P. XIII. myrræ. P.
XVI. fuliginis thuris. P. semis, salis ammoniaci. P. Z. ceræ. P. I.

Malagma protarchi ad parotidas, & fauum, & mala ulcera.

Protarchus autem ad parotidas eaq; tubercula: quæ μελμύ-
ρια idest faui uel φώματα nominantur: item mala ulcera,
pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ
nitri, iridis, singulorum. P. XVIII. cū ceræ. P. XVIII. miscebat: hisq;
olei cyathum, & dimidium adiciebat.

Malagma aduersus panum, & phymata.

T aduersus panum tum primum orientem: quod φώτερος
græci uocant, & omne tuberculum: quod φώμα nominatur,
miscetur ochra: quæ attice nominatur cum duabus partibus similæ,
hisq; contunditur: subinde mel instillatur: donec malagmatis crassi-
tudo sit.

Malagma aduersus phymata.

Is cutit etiā omne tuberculum: quod $\phi\mu\alpha$ uocatur: id quod
 d habet calcis, nutri spumæ, piperis rotundi, singulorum. P. XI.
 galbani. P. XII. salis. P. XIII. quæ excipiuntur cerato ex ro-
 sa facto.

Malagma ad suppressendum omne quod abscedit.

Vpprimitq; omne quod abscedit id: in quo est galbani, fabæ
 frescæ, singulorum. P. XI. myrræ, thuris, ex radice capparidis
 corticis, singulorum. P. XIII. Satisq; omnia abscedentia di-
 gerit murex combustus, & bene contritus, aceto subinde adiecto.

Malagma ad sanguinem suppressendum, & phymata.

T si satis sanguis subit: recte imponitur quod aduersus $\phi\mu\mu\alpha$
 a quocq; potest. Constat ex his bdellij, styracis, ammoniaci,
 galbani, resinæ & aridæ, & liquidæ pineæ. Item ex lentis-
 sci, thuris, iridis singulorum. P. XII.

Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.

$\alpha\rho\mu\iota\theta\delta\alpha$ uero, & $\phi\mu\mu\alpha$ commodè his leniuntur: galbani,
 uisci, ammoniaci, resinæ terebinthinæ in singulis. P. XI. seu
 taurini. P. semis, fecis combustæ quàm maxima portione, di-
 id siccius non faciat: quàm esse malagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei contusæ.

Vod si facie contusa liuor subcruentus est: hæc cõpositio no-
 q cte & die imposta tollit. Aristolo: hic, thapsiæ, singulorū.
 P. XII. bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galbani, re-
 sinæ aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis illyricæ, æ-
 ræ singulorum. P. XIII. Idem faba quæq; imposta proficiat.

Malagnata stomachica ad aperiendum.

Vnt etiā quedam malagnata: quæ $\sigma\phi\mu\alpha\tau\iota\mu\alpha$ græci no-
 f cant: quoniam aperiendi vim habent. Quale est quod ex
 his constat. piperis longi, spumæ nutri, singulorum. P. XII
 erisimi. P. XIII. Quæ cum melle miscentur. Idoneaq; etiā stirumæ
 aperiendæ sunt eius generis. Vchementiusq; ex his est id quod habet
 calcis. P. XIII. piperis grana sex, nutri, ceræ, singulorum. P. XX. mel-
 lis. P. Z. olei heminam.

LIBER

Niconis malagma ad resoluendum,
aperiendumq; ac purgandum.

n Iconis quoq; est quod resoluit: aperit: purgat. Habet alcyo-
nium, sulphur, nitrum, pumicem paribus portionibus: qui-
bus tantum picis, & ceræ adijcitur, ut fiat cerati crassitudo.

Malagma ad ossa, & nervos.

a D ossa autē Aristogenis fit ex his. sulphuris. P. XI. resinæ te-
rebinthinæ, nitri spumæ, & ex scylla partis interioris, plu-
bi eloti singulorū. P. XII. thuris fuliginis. P. XVIII. ficus ari-
dæ quàm pinguiissima, seu taurini, singulorū. P. XVIII. ceræ. P. XXI.
iridis macedonica. P. XVI. sesami fricti acetabulum. maximeq; ner-
uis & articulis malagma conuenit.

Malagma Euthylei ad articulos, & ad omnem dolorem.

i Citur Euthylei est et ad articulos, & ad omnem dolorem,
& ad uesticæ, & ad recenti cicatrice contractos articulos:
quas ἀγυλάας græci nominant. quod habet fuliginis thuris
acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine furculis sesquiciam, am-
moniaci, bdellij, singulorū. P. XIII. ceræ. P. semis. Aliud item fit: quod
habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri singulorū. P. XIII. resinæ li-
quidæ. P. XVI. ceræ. P. XVI.

Malagma Sasogoræ ad dolores articulorum.

a D dolores articulorum Sasogoræ, plumbi combusti, papaue-
ris lacrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seu, re-
sinæ, ceræ pares portiones.

Chrysippi malagma, ad idem ualens.

c Hrysippi, resinæ liquidæ, sandaracæ, piperis singulorum
P. XII. quibus ceræ paulum adijcitur.

Clesipontis malagma, ad idem ualens, & ad parotidas,
& phymata, & strumam.

c Lesypontis ceræ cretica, resinæ terebinthinæ, nitri quàm
ruberrimi, singulorū. p. semis, olei cyathi tres. sed id nitri
ante

ante per triduum instillata aqua teritur, & cum sextario eius inco-
quitur: donec omnis humor consumatur. Potest uero ea compositio etiā
ad parotidas, phymata, strumiam, omnemq; coitum humoris emolli-
endum.

Malagma ad articulos.

- a D articulos fici quoq; aridi partem nepetæ mixtam, uel unā
taminiam sine seminibus, cum puleio recte aliquis imponit.

Malagma Aristonis aduersus podagras, & recētia phy-
mata, & omnis dolores.

- e Adem podagræ præsidia sunt. Sed ad eam fit Aristonis
quoq; quod habet nardi, cinnamomi, cassiæ, chamuleontis, iūci
rotundi, singulorum. P. XVIII. seu caprini ex irino liquati.
P. XXX. iridis. P. XI. quæ in aceto quā acerrimo iacere per viginti
dies debet. Idem autem etiam recentia phymata, doloresq; omnes di-
scutit.

Theoni malagma ad pedum dolores.

- a T Theonius ad pedum dolores seu à renibus partem tertiā,
salis partes duas miscebat, hisq; membranulā illitam impo-
nebat: tum super iniiciebat ammoniacū, thymiana in aceto liquatū.

Numenij malagma ad podagram cæteros
que articulos induratos.

- a T Numenius podagram, cæterosq; articulos induratos hoc
molliebat. abrotani, rosæ aridæ, papaueris lacrimæ, singu-
lorū. P. XIII. resinæ terebinthinæ. P. XIII. thuris, spumæ
nitri, singulorum. P. XVIII. iridis, aristolochiæ, singulorum. P. XXII.
ceræ. P. XIII. qbus adijciatur cedri cyathus unus, olei laurei cyathi
tres, olei acerbi sextarius.

Dexij malagma si quando callus in articulis increuit.

- I quando autem in articulis callus increuit Dexius docuit
s imponere calcis. P. XIII. cerussæ. P. VIII. resinæ pineæ.
P. XXX. piperis grana. XXX. ceræ. P. Z. Quibus dum con-
tunduntur, hemina uini lenis instillatur.

De emplastris. Caput. XVIII.

- e X emplastris autem nulla maiorem usum præstant: quā
quæ cruentis protinus uulneribus iniiciuntur, & uuln. græci

i ij

Emplastrū

LIBER

uocant. Hæc enim reprimunt inflammationem nisi magna uis eam cogit, atq; illius quoq; impetum minuunt, tum glutinant uulnera: quæ id patiuntur: cicatricem hisdem inducunt. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideòq; ἀλιπὲν nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus uulneribus inijcitur.

Primum ex his est quod barbarum uocatur. Habet æruginis rase. P. XXII. spumæ argenti. P. XXX. aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ aridæ, singulorum. P. XI. quibus adiunguntur olei, & aceti singule hemina.

Coacan emplastrum nigrum ad idem ualens.

Iterum ad idem: quod χόανον uocant: habet spumæ argenti P. XC. resinæ aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est: qui ferè talis fit. ex pice, atq; resina. At ex bitumine nigerrimus. ex ærugine, aut æris squama uiridis. ex minio rubet. ex cerussa albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

Aucæ admodum compositiones sunt, in quibus aliquid mixturæ uarietas nouat. Ergo id quoq; nigrum est. quod βασιλικὸν nominatur. Habet panacis. P. XI. galbani. P. XII. picis & resinæ, singulorum. P. XX. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum ad idem.

T quod peruiride est, smaragdinum appellatur. in quo sunt resinæ pineæ. P. XIII. ceræ. P. XI. æruginis. P. semis. turis fuliginis. P. Z. olei tantundem, aceti, quo fuligo, & ærugo in unum cogantur.

Emplastrum ruffum ad idem.

St etiam coloris ferè ruffi: quod celeriter ad cicatricem uulnera perducere uidetur. Habet thuris. P. XI. resinæ. P. XII. squamæ æris. P. XIII. spumæ argenti. P. XXX. ceræ. P. X. olei heminam.

Paracolleticum emplastrum ad idem.

Rætereæ est: quàm παρακολητικὸν à glutinando uocant.

Constat ex his. bituminis, aluminis scissilis. P. XIII. spumæ argenti. P. XXL. & olei ueteris hemina.

Barb.

Color emplastrum
a qb. p. p. d. b.

Basilicon

Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens.

19.

Cephalicum.

Rætereæ sunt quedam generis eiusdem: quæ: quia capitibus fractis maxime conueniunt: κεφαλικὸν à græcis nominantur. philotæ compositio habet terræ erythræ, chalcididis, singulorū. p. XIII. myrrhæ, æris combusti. p. XX. ichthyocollæ, singulorū. p. XVI. æruginis rase, aluminis rotundi, mysi crudi, aristolochiæ, singulorum. p. XVIII. squamæ æris. p. XX. thuris masculi. p. XII. ceræ. p. I. rosæ & olei acerbi ternos cyathos, aceti quantum satis est: dum arida ex eo conteruntur.

Emplastrum uiride ad idem ualens.

Liud ad idem uiride: æris combusti, squamæ æris, myrrhæ ichthyocollæ, singulorum. p. XVI. mysi crudi, æruginis rase, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum. p. XVIII. ceræ. p. XI. olei hemina, aceti quod satis sit.

τετραφάρμακον emplastrum ad pus mouendum.

Vri autem mouendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est. τετραφάρμακον à græcis nominatur. habet partes portiones ceræ, picis, resinæ, seui taurini: si id non est, uitulini.

Tetrafarmaco

Enneapharmachum emplastrum ad pus mouendum, & ad purgandum ualens.

Iterum ad idē ἐννεαφάρμακον nominatur: quod magis purgat. constat ex nouē rebus, cera, melle, seuo, resina, myrrha, rosa, medulla uel ceruina uel uitulina uel bubula, hyssopo, butyro. Quorum ipsorum quoque pondera paria miscentur. Sunt autem quedam emplastra: quibus utriusque rei facultas est. quæ si singula habenda sunt, meliora sunt. Sed in copia reijcienda sunt: his potius adhibitis: quæ proprie id, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam.

Attalum emplastrum ad uulnera.

St igitur ad uulnera attalum: quod habet squamæ æris. p. XVI. fuliginis. p. XXV. ammoniaci tantundem. resinæ terebinthinæ liquidæ. p. XXXV. seui taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium.

i iij

LIBER

Iudei emplastrum fracto capiti acomodatum.

T inter ea quæ fracto capiti acomodantur, habet quidam
a id quod ad auctore iudeum refertur. Constat ex his. salis.
 P. XIII. squamæ æris rubri, æris combusti. singulorum. P.
 XXII. ammoniaci, thymiamatis, thuris fuliginis, resinæ aridæ, singu-
 lorum. P. XVI. resinæ colophoniacæ, ceræ, seu vitulini curati, singu-
 lorum. P. XXX. acetis sesquicyathum, olei minus cyathum. τῆς βαπτύτης
 μὲν γὰρ ἑλπίς ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αὐτῆς καλεῖται, cum ex seño puta omnes mē-
 branulæ diligenter exemptæ sunt, aut ex alio medicamento.

Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum.

*V*nt etiam quædam emplastra nobilia ad extrahendum.
s Quæ ipsa quoq; ἐπὶ τῶν ἀσθενῶν nominatur. Quale est: quod,
 q̄a lauri bacas habet διὰ δαφνιδῶν appellatur. in eo est, re-
 sinæ terebinthinæ. P. XX. nitri, ceræ, picis aridæ, bacarum lauri, sin-
 gulorum. p. XXX. olei paulum. Quotiens aut bacam, aut nucem, aut
 simile aliquid posuero, scire oportebit, anteq̄ expendatur, ei summam
 pelliculam esse demendam.

Aliud διὰ δαφνιδῶν ad extrahendum, & pus mouendum.

*L*iud eo nomine: quod puri quoq; mouendo est, seu vitulini,
a ammoniaci, thymiamatis, picis, ceræ, nitri, bacarum lauri,
 resinæ aridæ, aristolochiæ, pyretri pares portiones.

Philocratis emplastrum ad extrahendum, & pus mouendum

*P*æter has est philocratis: quod habet salis ammoniaci. P.
 XVII. aristolochiæ. P. XVIII. ceræ, resinæ terebinthinæ. fu-
 lignis thuris, singulorū. P. XXV. spumæ argenti. P. XXXII. Quibus
 ut pus quoq; moueāt, iridis. P. XIII. & galbani. P. XVI. adiunguntur.

ῥῶδης emplastrum ad extrahendum.

*P*timum tamen ad extrahendum est id: quod à similitudine
o sordium ῥῶδης ἑλπίς ἑλπίς ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αὐτῆς καλεῖται. Habet myrræ, croci, iridis,
 propolis, bdellij, capitulorum punici mali, aluminis & scissæ
 lis, & rotundi. mysi, chalcitis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis am-
 moniaci, uisci, singulorum. P. XIII. aristolochiæ. P. XVIII. squamæ
 æris. P. XXVI. resinæ terebinthinæ. P. LXXV, ceræ, & seu, uel tan-
 rini, uel hircini. P. XC.

Emplastrum

III.
 Epispastica

Emplastrum Hecatei ad extrahendum.

h Eateo quoq; auctore emplastrum generis eiusdē fit ex his.
galbani. P. XII. fuliginis thuris. P. XIII. picis. P. XVI. ceræ,
Et resinæ terebinthinæ, singulorum. XVIII. quibus paulū
irini unguenti miscetur.

Alexandrinum emplastrum uiride ad extrahendum.

u Alensq; ad idem emplastrum uiride alexandrinum est.
Habet aluminis scissilis. P. XVIII. salis ammoniaci. P. XV
III. Z. squamæ æris. P. XXVI. myrrhæ, thuris singulorū. P.
XXVIII. ceræ. P. CL. resinæ colophoniacæ, aut pineæ. P. CC. olei
heminam, acetī sextarium

De emplastris exedentibus.

q Vædam autem sunt emplastra exedentia: quæ scilicet græci
uocant quale est id quod habet resinæ terebinthinæ, fuligi-
nis, thuris, singulorum. P. Z. squamæ æris. P. XI. ladani. P.
XII. aluminis tantundem, spumæ argenti. P. XIII.

Emplastrum quod exest corpus, Et ossa resoluit, Et
super crescentem carnem coercet.

e Xest etiam uehementer corpus, atq; ossa quoq; resoluit, Et
super crescentem carnem coercet id quod habet spumæ ar-
genti, squamæ æris, uncias singulas, nitri ignem non expti,
lapidis asij, aristolochiæ. p. sextantes, ceræ resinæ terebinthinæ, thuris
olei ueteris, atramenti sutorij, salis ammoniaci. P. semis, æruginis, rase.
p. bessē, acetī scyllitiæ heminam, uini aminei tantundem.

Emplastra aduersus morsus, Et alia recentiora ulnura.

f Vnt etiam aduersus morsus quædam accomodata quale est.
Diogenis, nigrum: quod habet bituminis, ceræ, resinæ pineæ
aridæ, singulorū. P. XXX. spumæ argenti. P. XC. olei sexta-
rium. Aut in quo sunt squamæ æris. P. XIII. cerussæ, Et æruginis
passæ singulorū. P. XVIII. ammoniaci. P. XXII. ceræ, resinæ pineæ.
singulorum. P. XXV. spumæ argenti. P. XC. olei sextarium. Aut in
quo sunt squamæ æris. P. XIII. galbani, P. XVI. cerussæ, Et ærugi-
nis rase, singulorum. P. XVIII. ammoniaci. P. XXII. ceræ, resinæ pi-
neæ singulorum. P. XLV. spuma argenti concoquitur.

Alexand.

*III
sepho.*

Diog.

LIBER

ἑμφίον emplastrum rubrum ad idem valens.

Vbrum quoque emplastrum, quod ἑμφίον vocatur, huc
aptum est. Habet resinæ terebinthinæ. P. XII. galbani. P. X.
IIII. minij sinopici. P. XVI. thuris fuliginis. P. XVI. ceræ
P. XVIII. spumæ argenti. P. XLVI. olei veteris heminam.

Aliud emplastrum ad idem valens.

Tē id quod ex his constat. squamæ æris: thuris fuliginis: sin-
gulorū. P. XIII. galbani. P. XVI. salis ammoniaci. P. XII.
Z. ceræ. P. XXXV. olei tribus heminis. Hæc autē alijs quoq;
recentioribus vulnerebus recte imponuntur.

λευκά emplastra non grauibus vulnerebus accommodata, et
maxime senilibus.

Vnt enim alba lenia: λευκά græci vocant. ferè nō grauibus vul-
neribus accommodata, præcipuèq; senilibus. Quale est qđ ha-
bet cerussæ. P. XXXII. seni vitulini curati, et ceræ: singulo-
rum. P. XLVIII. olei heminas tres; ex quibus ea cerussa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

Liud qđ hēt cerussæ. P. XXX. ceræ. P. XXXV. olei hemi-
næ, aquæ sextariū. Quæ quotiens adiçitur cerussæ uel spu-
mæ argenti: scire licet illa ex his coquēda esse. Est autē ea p-
cādida cōpositio quæ supra posita est, ideoq; elephātina nominatur.

Lenia emplastra.

Enia quoq; quædam emplastra sunt, quas λιπαράς ferè græ-
ci nominant: ut id quod habet minij. P. XIII. spumæ argen-
ti. P. XXXV. ceræ et adipis suillæ. singulorum. P. XXXVII
vitellos quatuor.

Emplastrum lene.

Lia compositio generis eiusdem: ceræ, resinæ terebinthinæ,
singulorum. P. XVI. cerussæ. P. XVIII. spumæ argenti, plu-
bi recrementi, σινοπιὰρ, μολύβδου græci vocant, singulorum
P. XXX. cicini olei, et myrti, singulorum heminæ.

Archagathi emplastrum lene.

Ertia quæ ad auctorem Archagathum refertur, mysi cocti,
æris combusti, singulorum. P. XIII. cerussæ coctæ. P. XVIII
resinæ terebinthinæ. P. XX. spumæ argenti. P. XVI.

Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta.

Tiam num spumæ, argenti, ceræ, adipis suillæ singulorum
P. XXXVII. vitelli cocti quatuor, rosæ hemina, Aut cerati ex
oleo myrteo facti partes tres, adipis suillæ pars quarta, pau-
lum ex plumbi recremento. Aut spumæ argenti selibra ex olei hemi-
na, & aquæ marinæ altera cocta donec bullire desierit, cui paulum
ceræ sit adiectum, aut pares portiones ceræ, seu, sibi, spumæ argenti,
cerussæ.

De pastillis, & primo de his, qui ad recentia vulnera glutinā-
da, sanandaq; apti sunt. Cap. XX.

Pastillus.

Astilli quoq; facultates diuersas habent. sunt enim ad recen-
tia vulnera glutinanda, sanandaq; apti. Qualis est qui ha-
bet chalcitis, mysi, spumæ nitri, floris æris, gallæ, aluminis
scissilis modice cocti, singulorum. P. XI. æris combusti, capitulorum ma-
li punici, singulorum. P. XII. Hunc oportet diluere aceto, sic, ubi vul-
nus glutinandū est, illinere. At si nervosus aut musculosus is locus est,
comodius est, cerato miscere sic, ut illius octo partes: nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda vulnera.

Liūs ad idem cōstat ex his, bituminis, aluminis scissilis, sin-
gulorum. P. XI. æris combusti. P. XII. spumæ argenti. P. X.
XI. olei sextarium.

De sphragide pastillo: quē Polybus confecit, ad glutinandū vulnus.

Ed longe polybi celeberrimus est. operari s autē nominatur.
qui habet aluminis scissilis. P. XI. Z. atramenti sutorij. P. X.
II. myrrhæ. P. XV. aloes tantundē, capitulorum punici mali, fellis tau-
rini, singulorum. P. XVI. Quæ contrita uino austero excipiuntur.

Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, nari-
bus, obscenis partibus, inflammationesq; eorum.

D ulcera sordida & nigritiem in auribus, naribus, obscenis
partibus, inflammationesq; eorum, chrysocollæ. P. XI. atra-
menti sutorij, aluminis scissilis, singulorum. P. XII. halicacabi corticis.
P. XIII. minij. P. XVI. spumæ argenti. P. XII. cerussæ. P. XXVI.
Quæ ex aceto & coguntur, & ubi utendum est: diluuntur.

Past. Andronis

LIBER

Pastillus andronis ad uiam inflammata, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia.

Andronis uero est ad uiam inflammata, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia, gallæ, atramenti sutorij, myrrhæ singulorum .P. xij. aristolochiæ, aluminis scissilis, singulorum .P. xii. capitula punici mali. P. xxxv. ex passo coacta, et cuius usus exigit aceto, uel uino diluta, prout ualentius, aut lenius uitium est, cui medendum est.

Pastillus ad fissa ani, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum.

Proprie autem ad ani fissa, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum, æruginis. P. xii. myrrhæ. P. xxii. stibis, lacrymæ papaueris, acaciæ, singulorum. P. xxvi. Quæ ex uino, et teruntur, et in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum cum urina.

Expellere autem ex uesica cum urina calculum uidetur hæc compositio. casia, croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici, pares portiones conteruntur. deinde uinum lene instillatur, et pastilli fiunt: qui singuli habeant. P. xz: hiq; singuli quotidie mane ieiuno dantur.

Pessum.

De pessis. Caput. XXI.

Hæc tria compositionum genera: idest quæ in malagmatis, pastillis, emplastrisq; sunt. maximè, præcipueq; uarium usum præstant. Sed alia quoq; utilia sunt. ut ea quæ foeminis subiciuntur (παραγὰς græci uocant) Eorū hæc proprietas est, Medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

Ad sanguinem autem euocandum canneis duabus adijcitur natri. P. xii. aut allij semen coteritur. adijcitur myrrhæ paululum, et unguento susino miscetur, aut cucumeris siluestris pars interior ex lacte muliebri diluitur.

Ad uulnam molliendam.

Ad uulnam molliendam oui vitellus, et foenum græcum, et rosa, et crocum temperantur. Aut elaterij. P. xz. salis tantundem, uulæ taminie. P. xvi. melle excipiuntur.

Alia pessi compositio ad idem ualens.

a Ut Boetho auctore, croci resinæ terebinthinæ, singulorum
P. XIII. myrræ. P. X. ZZ. rosæ. P. XI. seui uulini. P. X. Z.
ceræ. P. XII. miscentur.

AD inflammationes uulnæ Numenij, Pessus.

o Prima autem aduersus inflammationes uulnæ Numenij com-
positio est: quæ habet croci. P. X. Z. ceræ. P. XI. butyri. P. X.
VIII. adipis anserinæ. P. XII. uitellos coctos d uos, rosæ
minus cyatho.

Ad eijciendum è uulua infantem mortuum.

f I uero infans intus decessit: quo facilius eijciatur, malicorium
ex aqua terendum: eoq; utendum est.

Si mulier uitio locorum concidit, qua curatione utendum sit.

f I concidere uitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis
comburendæ, conterendæq; deinde his mel adijciendum est.
Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

De medicamentis quibus aridis utimur, ad carnem super-
crescentem exedendam. Caput. XXII.

q Vadam autem mixturæ medicamentorum sunt: quibus ari-
dis neq; coactis utimur sic, ut inspergamus: aut cum aliquo
liquido mixta illinamus: quale est ad carnem supercre-
scentē exedendā. qā habet squamæ, fuliginis thuris singulorū. P. XI.
æruginis. P. XII. Hæc aut eadem cum melle purgant ulcera: cum cera
implent. Myse quoq; et galla si paribus portionibus misceatur, corpus
consumunt: eaq; uel arida inspergere licet: uel excepta cadmia illinere.

Ad putrem carnem continendam ne ultra serpat, eamq;
leniter exedendam plures compositiones.

p Vtrem uero carnē continet, neq; ultra serpere patitur, et
leniter exest mel, uel cum lenticula, uel cum marrubio, uel
cum oleæ folijs ante ex uino decoctis. Item fertula campana
in mulso cocta, deinde contrita, aut calx cum cerato, aut amara nuxes
cū allio sic, ut huius pars tertia sit: paulumq; his croci adijciatur. aut
quod habet spumæ argenti. P. XVI. cornu bubuli combusti. P. XXII.

fulcis

Mel. & Gum

Al. & Gum

LIBER

aluminis scissilis, thuris, singulorum. P. XIII. gallæ. P. XVIII. aristolochiæ. P. XX. Veementius idem facit etiam adurendo, auripigmentum cum chalcitide, aut nitro, aut calce, aut charta combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio quæ habet chalcitidis, capitulorum punici mali, aloes, singulorum. P. XII. aluminis scissilis, thuris, singulorum. P. XIII. gallæ. P. XVIII. aristolochiæ. P. XX. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Vel catharides. P. XI. sulphuris. P. XI. lolij. P. XIII. Quibus adijcitur picis liquidæ quantum satis est. adiungendum vel chalcitis quoque cum resina, et ruta mixta. aut cum eadem resina: diphyrges, aut uua ammia cum pice liquida. Idem uero possunt feces uini combustæ, et calcis, et nitri pares portiones, uel aluminis scissilis. P. XX. thuris sandaracæ, nitri singulorum. P. XI. gallæ. P. XVIII. aristolochiæ. P. XX. mellis quantum satis est.

Hieræ compositio.

St etiam hieræ compositio. quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum. P. XII. aloes, thuris, aluminis scissilis, singulorum. P. XIII. Aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum. P. XVIII. malicorij contriti. p. XX.

Iudei compositio.

St iudei: in qua sunt calcis partes duæ, nitri quæ ruberrima pars tertia. quæ urina impuberis pueri cogitur, donec strigmeti crassitudo sit. sed subinde is locus: cui id illinitur: maleficiendus est.

Iolæ compositio.

T iolas, chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum. p. XI. calcis. p. XII. auripigmenti tantumdem miscebat.

Ad sanguinis profluvia, uel ex membrana cerebri, uel alijs locis et ad cancerum, et ad induendam cicatricem, et ad coerendam carnem crescentem.

I uero ex membrana: quæ super cerebrum est, profluit sanguis, utellus combustus et contritus inspergi debet. Si alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamæ aeris, singulorum. P. XI. sandaracæ. P. II. marmoris cocti. P. XIII inspergi debet. Eadem cancro quoque obfistunt. Ad induendam cicatricem, squamæ aeris, thuris fuliginis, singulorum. P. XII. calcis. P. III. Eadem incrementem quoque carnem coercent.

ad sang. *[Handwritten signature]*

Timei compositio ad ignem sacrum, uel cancrum.

Imeus autem ad ignem sacrum, uel ad cancrum, his utebatur.
Myrræ. P. XII. thuris, atramēti sutorij, singulorum. P. XIII.
sandaracæ, auripigmēti, squamæ æris, singularū. P. XIII.
gallæ. P. XVI. cerussæ combustæ. P. XVIII. Eadem uel arida insper-
sa, uel melle excepta idem præstant.

Ad sternutamenta excitanda.

Sternutamenta uero, uel albo ueratro, uel struthio coniecto
in naves excitantur, uel his mixtis: piperis, ueratri albi, sin-
gulorum. P. XZ. castorei. P. X. spumæ nitri. P. XI. struthij. P. XIII.

Gargariizationes quibus fieri debeant.

Gargariizationes autem aut lenandi causa fiunt, aut reprimē-
di, aut euocandi. Lenati lac, cremor uel ptisanæ, uel furfurū.
Reprimit aqua, in qua uel lenticula, uel rosa, uel rubus, uel
cotoneum malum, uel palmulæ decoctæ sunt. Euocant, sinapi, piper.

De antidotis, quibus malis opitulentur. Caput. XXIII.

Antidota raro, sed præcipue interdum necessaria sunt: quia
grauissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem datur col-
lisis corporibus uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel
uiscerum, laterum, faucium, interiorumq; partiū doloribus. Maxime
autem desideranda sunt aduersus uenena uel per morsus, uel per ci-
bos, aut potiones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

Num est: quod habet lacrymæ papaueris. P. XZ. acori, ma-
lobachri. P. XV. iridis illirica, gummi, singulorum. p. XII.
anesti. p. XIII. nardi gallici, foliorum rosæ aridorū, carda-
moni, singulorum. p. p. IIII. petroselinū. P. p. IIII. Z. folij. p. p. V. casia
nigræ, silis, bdellij, balsami, seminis piperis albi, singulorum. P. XZ. sty-
racis. P. V. Z. myrræ, oppoponacis, nardi syrii, thuris masculi, hypocisti-
dis succi, singulorū. P. XVI. castorei. P. XVI. costi, piperis albi, galbani,
resinæ terebinthinæ, croci floris, iunci rotundi, singulorum. P. VI. Z.
dulcis radici. P. p. VIII. Z. Quæ uel melle, uel passo excipiuntur.

Sternutamenta

Gargariizationes

Antidotes

Compositio

LIBER

Aliud antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus
Ptolemæo regi composuit.

Iterum quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse,
atq; Ambrosia nominasse: ex his constat. Costi, thuris mas-
li, singulorū. P. p. V. piperis albi. P. p. Z. floris iunci rotundi. P.
II. cinnamomi. P. p. III. castæ nigræ. P. p. IIII. croci ciliij. P. p. IIII.
Z. myrræ quàm stadien nominat. P. p. V. nardi indici. P. p. V. Z. quæ
singula contrita melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendum est id:
quod ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione uini diluitur.

Antidotum Mithridatis.

Obilissimum autem est Mithridatis, quod cotidie sumendo
rex ille dicitur aduersus uenenorum pericula tutum corpus
suū reddidisse. in quo hæc sunt, costi. P. p. S. Z. acori. P. p. V.
hypici, cumini, sagapeni, agaciæ succi, iridis illyricæ, cardamomi, singu-
lorū. P. p. II. anesi. P. p. III. nardi gallici, gentiæ æradias, aridorū ro-
sæ foliorum, singulorū. P. p. IIII. papaueris lacrymæ, petroselinū, sin-
gulorū. P. p. IIII. Z. castæ, filis lolij, piperis longi, singulorū. p. XVI.
styracis. p. V. Z. castorei, thuris hypocistidis succi, myrræ, opoponacis, sin-
gulorum. p. VI. Z. malobathri folij. XVI. floris iunci rotundi, resinæ
teribinthinæ, galbani, dauci cretici seminis, singulorū. P. p. VI. Z. nar-
di, opobalsami, singulorū. P. p. VI. Z. thlaspi. p. XV. ZZ. radicis pon-
ticæ. p. VII. croci, Zinziberis, cinnamomi, singulorum. p. XVIII. r.
Hæc contrita melle excipiuntur: et aduersus uenenum, quod magni-
tudinem nucis græcæ impleat, ex uino datur. In cæteris autem affe-
ctibus corporis pro modo eorū, uel quod ægyptiæ fabæ, uel quod Erui
magnitudinem impleat, satis est.

DE acopis. Caput. XXIIII.

Copa quoq; utilia nervis sunt: quale est quod habet floris
iunci rotundi. p. II. ZZ. costi, iūci quadrati, lauri baatarum,
ammōiaci, cardamomi, singulorū. p. p. IIII. Z. myrrhæ, æris
robusti singulorū. P. p. VII. iridis illiricæ, cere singulorū. P. p. XIII.
alexadrini calami, iunci rotundi, aspalathi, xylobalsami, singulorum
P. XVIII. seui. P. I. unguenti irini cyathum.

Acopum aduersus nervis utile.

Iterum quod aduersus uocant, hoc modo fit: ceræ. P. Z. olei
tantundem, resinæ terebinthinæ ad nucis iuglandis magni-
tudinem simul incoquantur: deinde infusa in mortario te-
runtur:

untur, instillaturq; subinde quàm optimi mellis acetabulum: tum iri
ni unguenti, & rosæ terni cyathi.

Ex pisa ad ulcera purganda, & implenda.

Ex pisa autem græci uocant, liquida quæ illinuntur. Qua-
le est quod fit ad ulcera purganda, & implenda, maxime
inter nervos paribus portionibus inter se mixtis, butyri, me-
dulle uitulinae, seu uitulini, adipis anserinae, ceræ, mellis, resinae tere-
binthinae, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur: deinde
liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis pur-
gat. Magis uero emollit: si pro rosa cypirus infunditur.

Ad sacrum ignem.

D sacrum ignem spumæ argenti. P. XVI. corni bubuli com-
busti. P. XII. conteruntur, adijciturq; inuicem uinum, & id
quod specialiter sil uocatur, & myrteū: donec utriusq; terni
cyathi coniungantur.

De catapotijs. Caput. XXV.

Catapotium ad somnum accersendum, & leuationem
doloris, & simul ad concoquendum.

Atapotia quoq; multa sunt, varijsq; de causis fiunt. αρωδύνα
uocant quæ somno dolorem leuant. Quibus uti: nisi nimia
necessitas urget, alienum est. Sunt enim ex uehementibus me-
dicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendū:
quod habet papaueris lacrymæ, galbani, singulorum. P. XI. myrrhæ,
castorei, piperis, singulorum. P. XII. Ex quibus quod erui magnitudi-
nem habet, satis est deuorasse.

Catapotium ualentius ad somnum.

Iterum stomacho peius, ad somnū ualentius ex his fit, mā-
dragoræ. P. Z. apij seminis, item hyoscyami seminis, singulo-
rum. P. XIII. Quæ ex uino teruntur. Vinum autem eiusdē
magnitudinis: quæ supra posita est: abunde est sumpsisse.

Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Sive autem capitis dolores, siue ulcera, siue lippitudo, siue
dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta,

Aurelij Cor.

k

Catapotia

quæ sunt.

LIBER V

siue inflammatio uulue est, siue coxa, siue iecur, aut lienis, aut latus torquet, siue uitio locorum aliqua prolabiatur, & obmutescit, occurrat dolori per quietem eiusmodi catapotium. Silis, acori, rutæ siluestris seminis, singulorum. P. p. I. castorei, cinnamomi, singulorum. P. XII. papaueris lacrymæ, panaces, radices mandragoræ, malorum aridorum, iunci rotundi floris, singulorum. P. p. II. piperis grana. LVI. Hæc per se contrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

Catapotium aliud, ad multa ualens.

q Vin etiam siluestris papaueris, cum iam ad excipiendam lachrymam maturum est, manipulus qui manu comprehendere potest, in uas demittitur, & superinfunditur aqua: quæ id contegat, atq; ita coquitur. Vbi iā bene manipulus is coctus est, ibidem expressus projicitur, & cum eo humore passi pari mensura misceatur, inferuetq; donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapotia ex eo fiunt ad nostræ fabæ magnitudinem, habentq; usum multiplicem. Nam & somnū faciunt uel per se assumpta, uel ex aqua data, & aurium dolores leuant, adiectis exiguo modo rutæ succi, ac passi. Et tormina supprimunt ex uino liquata, & inflammationem uulue coercet mixta cerato ex rosa facto: cum paulum his croci quoq; accessit, & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

Catapotiū ad inducendū somnū: quod uulua dolens prohibuit.

i Tem si uulua dolens somnum prohibuit, croci. P. XII. anesi, myrrhæ, singulorū P. p. I. papaueris lacrymæ. p. p. XIII. cicutæ seminis. p. XVIII. miscentur, excipiunturq; uino uetere, et quod lupini magnitudinem habet in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

Ad iecur sanandum.

a D sanandum iecur nitri. P. X. Z. croci, myrrhæ, nardi gallici, singulorum. P. XI. melle excipiuntur, daturq; quod ægyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

a d lateris dolores finiendos, piperis, aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

D thoracis, nardi. P. XI. thuris, casie, singulorū. P. XIII. myrrhæ, cinnamomi, singulorū. P. XVI. croci. P. XVIII. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis hemina tres.

Catapotium Athenionis ad tussim.

D tussim Athenionis, myrrhæ, piperis, singulorum. P. p. XI. castorei, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. Quæ separata contusa postea iunguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ bina catapotia mane, bina noctu dormituro dantur.

Catapotium Heraclidis tarentini ad tussim, & somnum.

I tussis somnum prohibet, ad utranq; Heraclidis tarentinæ croci. P. XI. cinnamomi. castorei, papaueris lacrymæ, singulorū. P. XI. myrrhæ, pipis longi. costi, galbani, singulorū. P. Z.

Catapotium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.

Vod si purganda sunt ulcera in faucibus tussientibus, panacæ, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum. P. X. galbani. P. Z. hyssopi. P. Z. conterenda sunt. huiusq; hemina mellis adiungenda, & quod digito excipi potest, deuorandum est.

Collice castij medici.

Ollice uero Castij ex his constat, croci, anesi, castorei, singulorū. P. XIII. petroselinæ. P. XIII. piperis & longi, & rotundi, singulorum. P. XV. papaueris lacrymæ, iunæ rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum. P. XVI. Quæ melle excipiuntur. Id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

Ad infansem mortuum, aut secundas expellendas.

i Nfantem uero mortuum, aut secundas expellit aquæ potio, cui salis ammoniaci. P. XI. aut cui dictami cretici. P. XI. adiectum est.

Laborantibus ex partu quid dari debeat.

e X partu laborantibus erisimum ex uino tepido ieiunæ dari debet.

Ad adiuvandam uocem.

u Ocem adiuvat thuris. P. XI. in duobus cyathis uini datum.

Aduersus difficultatem urinae.

a Duersus urinae difficultatem, piperis longi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris lacrymæ, croci, costi unciæ singulae, styradis, resinæ terebinthinæ. P. sextantes, mel, absinthij cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ ægyptiæ & mane, & cæmato dari debet.

k ij

LIBER

Arteriacae compositio quomodo fiat.

Arteriacae uero hoc modo fit: cassia, iridis, cinnamomi, nardi,
a myrrhae, thuris, singulorum. P. .X. I. croci. P. .X. I. piperis gra-
na. .XX. ex passi tribus sextarijs decoquantur: donec mel-
lis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhae, thuris, singulorum. P. .XI.
coniunguntur in passi eundem modum, eodemq; modo decoquantur.
Aut eiusdem passi heminae tres usq; eo coquantur: donec extracta
inde gutta indurescat, & adjicitur trita cassia. P. .XI.

De quinque generibus nozarum corporis, & primo de uulne-
ribus quae maxime per tela inferuntur. Cap. XXVI.

De Vulneribus

Ubi facultates medicamentorum proposuerim, genera in qui-
c bus noxa corpori est: proponam. Ea quinque sunt. Cum quid
extrinsecus laesit: ut in uulneribus. Cum quid intra se ipsum
corruptum est, ut in cancro. Cum quid immatum est, ut in uescia cal-
culus. Cum quid increuit, ut uena quae intumescens in uaricem con-
uertitur. Cum quid deest, ut cum curata pars aliqua est. Ex his alia
sunt, in quibus plus medicamenta. Alia in quibus plus manus profi-
cit. Ergo dilatis his: quae praecipue scalpelli, et manu postulant: nunc
de his dicam, quae maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc
quoque curandi partem sicut priorem. Et ante dicam, de his quae in quili-
bet partem corporis incidunt. Tum de his, quae certas partes infestant.
Incipiam a uulneribus. In his autem ante omnia scire medicus debet: quae isa-
nabilia sunt: quae difficile curatione habeant: quae promptior est. Est. na-
prudens hominis: primum eum, qui seruari non potest, non attingere, nec
subire speciem eius ut occisi, quem fors ipsius peremit. Deinde ubi gra-
uis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessarijs periculi
tantis in difficili rem esse: ne si uicta ars malo fuerit, uel ignorasse,
uel fefellisse uideatur. Sed ut haec prudenti uiro conueniunt, sic rursus
histrionis est, paruam rem attollere, quo plus praestitisse uideatur. Obliga-
riq; aequum est confessione propterea rei: quo curiosius etiam circumspiciat,
ne, quod per se exiguum est malum, maius curantis negligentia fiat.

Quae uulnera insanabilia sint.

Insanabilia

Insanabilia sunt, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui
s iocineris portae, cui in spina medulla percussa est, cuiq; aut
pulmo medius, aut ieiunum, aut tenuius intestinum, aut uen-
trculus, aut renes uulnerati sunt: cui uel circa fauces grandes uenae, uel
arteriae praecise sunt.

Quæ vulnere difficilē curationem habeant.

¶ Ix autem ad sanitatē perueniunt: quibus ulla parte pulmo, aut iocineris crassum, aut membrana, quæ continet cerebrū, aut lienis, aut uisera, aut uescia, aut ullum intestinum, aut septum transuersum uulneratū est. Hi quoq; in præcipiti sunt: in quibus usq; ad grandes intusq; conditas uenas in alis, uel poplitibus micro descendit. Periculosa etiam uulnera sunt, ubicunq; uenæ maiores sunt. quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt. Idq; euenit non in alis tantum, atq; poplitibus, sed etiam in his uenis, quæ ad anum, testiculosq; perueniunt. Præter hæc malum uulnus est, quodcunq; in alis uel foeminibus, uel inanibus locis, uel in artichis, uel inter digitos est. Item quodcunq; musculum, aut neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut arthilagnem læsit.

Quæ uulnera tutiorē curationem habeant.

¶ Utissimum omnium quod in carne est. Et hæc quidem loco uel peiora uel meliora sunt. modo uero periculū facit quodcunq; magnum est.

Observationes quædam et ætatis, et corporis, et uitæ, et temporis in uulneribus.

Liquid etiam in uulneris genere, figuraq; est. Nam peius est quod etiā collisum, quàm quod tantū discissum est. adeo ut acuto quoq; quàm retunso telo uulnerari commodius sit. Peius etiā uulnus est, ex quo aliquid excisum est: ex quo uel atro alia parte abscissa, alia dependet: pessima quæq; plaga in orbē est: tutissima quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic, illi uel figuræ uulnus est: eo uel deterius, uel tolerabilius est. Quin etiam confert aliquid et ætas, et corpus, et uitæ propositum, et anni tempus, quia facilius sanescit puer uel adolescens, quàm senior: ualens quàm infirmus: neq; nimis tenuis, neq; nimis plenus, quàm si alterum ex his est. integri habitus, quàm corrupti: exercitatus, quàm iners: sobrius, et temperans, quàm uino, ueneriq; deditus. Opportunissimumq; curationi tempus uernum est, aut certe: neq; feruens neq; frigidum, si quidem uulnera et nimis calor, et nimium frigus infestant: maxime tamen horū uarietas: ideoq; perniciosissimus autumnus est. Sed pleraq; ex uulneribus oculis subiecta sunt: quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco demonstrauimus, cum positus interiorum partiū ostendimus. Veruntamen quia quædam uicina sunt, interest quoq; uulnus in sum-

Aurelij Cor.

k ij

lra 102

45

ma parte sit, an penitus penetraverit: necessarium est notas subijcere, per quas quid intus actum sit, scire possimus: Et ex quibus, vel spes, vel desperatio oritur.

Signa percussi cordis.

Citur corde percusso, sanguis multus effertur: uenæ languescunt: color pallidissimus: sudores frigidi, maliq; odor: itaquam irrorato corpore oriuntur: extremisq; partibus frigidis matura mors sequitur.

Signa pulmonis icti.

Ulmone uero icto, spirandi difficultas est: sanguis ex ore spirans: ex plaga rubens: simulq; etiam spiritus cum sono fertur in uulnus inclinari inuat: quidam sine ratione consurgunt. Multi, si in ipsum uulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

Signa iocineris uulnerati.

Iocineris autem uulnerati notæ sunt: multus sub dextra parte præcordiorum profusus sanguis: ad spinam redacta præcordia: in uentrem cubandi dulcedo: punctiones, doloresq; usq; ad iugulum, iunctumq; ei latus scapularum: os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus uomitus accedit.

Signa percussorum renium.

Enibus uero percussis, dolor ad inguina, testiculosq; descendit: difficulter urina redditur: eaq; aut est cruenta, aut error fertur.

Signa uulnerati lienis.

Liene icto sanguis niger à sinistra parte prorumpit: præcordia cum uentriculo ab eadem parte indurescunt: sitis ingens oritur: dolor ad iugulum, sicut iocinere uulnerato uenit.

Signa percussæ uulnæ.

Cum uulua percussa est, dolor inguinibus, et coxis, et femoribus est. Sanguinis pars per uulnus, pars per naturale descendit: uomitus bilis insequitur. Quædam obmutescunt: quædam mente labuntur: quædam sui compotes: nervorum, oculorumq; dolore urgeri se consentitur: morietesq; tandem eadē, quæ corde uulnerato, patiuntur.

V. cordis

pulmonis

iocineris

renium

lienis

uulnæ

Sanguis
Sanguis
pus

LIBER

Sanies est tenuior hoc, uarie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus cras-
sissimum, albidissimumq; glutinosius & sanguine, & sanie. Exit aut
sanguis ex ulnere recenti, aut iam sanescente. Sanies est inter utrūq;
tempus. pus ex ulcere iam ad sanitatem spectante. Rursus & sanies,
& pus quasdam species græcis nominibus distinctas habent. Est enim
quædā sanies quæ uel ἰχθὺς, uel μελίμπος nominatur. Est pus quod
ἐλαῶδες appellatur. ἰχθὺς tenuis, subalbidus ex malo ulcere exit:
maximēq; ubi neruo læso inflammatio secuta est. μελίμπος crassior,
& glutinosior subalbida, melliq; albo subsimilis fertur. Hæc quoq; ex
malis ulceribus ubi nerui circa articulos læsi sunt, & inter hæc loca
maxime ex genibus. ἐλαῶδες tenue subalbidum quasi unctum colo-
re, atq; pinguitudine, oleo albo non dissimile apparet in magnis ulce-
ribus sanescentibus. Malus autem est sanguis nimium aut tenuis, aut
crassus, colore uel liuidus uel niger, aut pituita mixtus, aut uarius.
Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaq; protinus
eius ulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit.
Itemq; postea spes in his maior est, ex quibus melioris generis quæq;
proveniunt. Sanies igitur mala est multa, nimis tenuis, liuida, aut palli-
da, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum ulcus
& iunctam ei cutem erodit. Melior nō multa modice crassa, subrubin-
cunda, aut subalbida. ἰχθὺς autem peior est multus, crassus, subliuidus,
aut subpallidus, glutinosus ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est
subalbidus, qui cætera omnia contraria prioribus habet. μελίμπος
autem mala est multa, & percrassa: melior quæ & tenuior, & ma-
nus copiosa est. Pus inter hæc optimum est. Sed id quoq; peius est mul-
tum, tenue, dilutum, magisq; si ab initio tale est. Itemq; si colore sero
simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est. Præter hæc si male
olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est,
quo crassus, quo albidus. Itemq; si leue est: si nihil olet: si æquale est.
modo tamen conuenire & magnitudini ulneris, & tempori debet.
Nam plus ex maiore, plus nondum solutis inflammationibus natura-
liter fertur. ἐλαῶδες quoq; peius est multum, & parum pingue, quo
minus etiam quoq; id ipsum pinguius, eo melius est.

Curatio aduersus profusionem sanguinis in ulneribus.

Vibus exploratis ubi aliquis ictus ē, qui seruari potest: pro-
tinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis sit profusio: ne ue-
inflammatio interimat. Si profusionem timemus, quod ex se
de ulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ructis sanguinis in-

telligi potest, sicis linamentis vulnus implendum est: supraq; impo-
nenda spongia ex aqua frigida expressa: ac manu super comprimē-
da. Si parum sic sanguis conquiescat, sæpius linamenta mutanda sunt.
Et si sic parum ualent, aceto madefacienda sunt. id uehemens ad
sanguinem supprimendum est. Ideoq; quidam id uulneri infundunt.
Sed alius rursus metus subest: ne nimis ualenter ibi retenta materia
magnam inflammationem postea moueat. quæ res effiat neq; roden-
tibus medicamentis, neq; adurentibus: et ob id ipsum inducentibus cru-
stam, sit utendum: quamuis pleraq; ex his sanguinem supprimunt.
Sed si semel ad ea decurritur, potius quæ mitius idē efficiunt. Quod
si illa quoq; profusio uincuntur, uenæ, quæ sanguinem fundunt, ap-
prehendendæ: circaq; id quod ictum est, duobus locis deligendæ, inter-
cidendæq; sunt, ut in se ipsæ coeant: et nihilominus ora præclusa ha-
beant. ubi ne id quidem res patitur: possunt ferro candenti aduri.
Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neq; neruus, neq;
musculus est, ut puta in fronte, uel superiore capitis parte. commodissi-
mum tamen est cucurbitulam admoovere à diuersa parte, ut illuc san-
guinis cursus reuocetur.

Curaciones aduersus uulnorum inflammationem.

Aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Ad-
uersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu ea ti-
meri possunt, ubi læsum ē uel os, uel neruus, uel cartilago, uel
musculus: aut ubi parum sanguinis pro modo uulne ris fluxit. Ergo
quotiens quid tale erit, sanguinem mature supprimere non oportebit:
sed pati fluere dum tutum erit: adeo ut si parum fluxisse uidebitur:
mitti quoq; ex brachio debeat, utiq; si corpus inuenile, et robustum,
et exercitatum est: multoq; magis si id uulnus ebrietas præcessit.
Quod si musculus læsus uidebitur, præcidendus erit. Nam percussus
mortiferus est: præcisus sanitatem recipit.

*Uulnus foris
san. fluxus.*

*Musculus locus qui
signat.*

De glutinatione uulnorum.

Anguine autem uel suppresso, si nimis erumpit: uel exha-
sto, si per se parum fluxit: longe optimum est, uulnus glutina-
ri. Potest autem id uel quod in cute uel etiam in carne est: si
nihil ei præterea mali accedit. Potest caro alia parte dependens, alia
inherens: si tamen etiam num integra est, et coniunctione corporis so-
uetur. In his uero quæ glutinantur duplex curatio est. Nam si pla-
ga in molli parte, sui debet: maximeq; si discissa auris ima est: uel
imius nasus, uel frons, uel bucca, uel palpebra, uel labrum, uel circa

LIBER

Sutura &
Fibula.

guttur cutis, uel uenter. Si uero in carne uulnus est, huiusque, neque in unius
orae facile attrahuntur: sutura quidem aliena est. Imponendae uero
fibulae sunt, *ἀρτήρας* graeci nominant: quae oras paulum tamen con-
trahunt: quo minus lata postea cicatrix sit. Ex his autem colligi po-
test, id quoque quod alia parte dependens, alia inherere: si alienatum
adhuc non est: suturam, an fibulam postulet. Ex quibus neutra an-
te debet imponi, quam intus uulnus purgatum est: ne quid ibi concre-
ti sanguinis relinquatur. Id enim *ἐν* in pus uertitur: *ἐν* inflamma-
tionem mouet: *ἐν* glutinari uulnus prohibet. ne linamentum quidem,
quod suppressendi sanguinis causa inditum est: inibi relinquendum
est. nam id quoque inflammat. Compræhendi uero sutura, uel fibula
non cutem tantum, sed aliquid etiam ex carne: ubi suberit hæc, oport-
tebit quo ualentius hæreat, neque cutem abrumpat. Vtraque optima est
ex acia molli non nimis torta, quo mitius corpori insidat. Vtraque
neque nimis rara, neque nimis crebra incidenda est. Si nimis rara est, non
continet: si nimis crebra est, uehementer afficit: quia quo sepius acis
corpus transit, quoque plura loca iniectum uinculum mordet, eo maio-
res inflammationes oriuntur: magisque æstate. neutra etiam uim ul-
lam desiderat. sed eatenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua
sponte subsequitur. Ferè tamen fibulae latius uulnus esse patiuntur.
Sutura oras iungit: quæ ne ipsæ quidem inter se contingere ex toto
debent: ut si quid intus humoris concreuerit, sit qua emanet. Si quod
uulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet: deinde omni
uulneri primo imponenda est spongia ex aceto expressa. si sustinere
aliquis aceti uim non potest: uino utendum est. Leuis plaga iuuatur
etiam si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. sed ea quo-
cunque modo imposita est: dum madet, prodest, itaque ut inarescat, non
est committendum. Licetque sine peregrinis, *ἐν* conquisitis, *ἐν* compo-
sitis medicamentis uulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, im-
ponere medicamentum debet: quod sine seuo compositum sit ex his,
quæ cruentis uulneribus apta esse proposui. Maximèque si caro est:
barbarum: si nerui, uel cartilago, uel aliquid ex eminentibus, quales
aures, uel labra sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoque uiri-
de neruis idoneum est: eminentibusque partibus ea, quam graeci *πόλιν*
οὐραν uocant. Solet etiam colliso corpore exigua parte findi cutis. quod
ubi incidit, non alienum est, scalpello latius aperire: nisi muscoli, ner-
uique iuxta sint: quos incidi non expedit. ubi satis deductum est, me-
dicamentum imponendum est. At si id quod collisum est, quamuis pa-
rum diductum est: latius tamen aperiri propter neruos, aut musculos
non licet: adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extrahant, præ

Collisio

apueq; ex his id quod p^u r^o s^u vocari proposui. Non alienum est eti
am ubi unq; vulnus graue est, impositum, quo id innetur, insuper cir
cundare lanam succidam ex aceto, & oleo: uel cataplasma, si mollis
is locus est, quod leniter reprimat. Si nervosus, aut musculosus: quod
emolliat.

si locus mollis, siue
nervosus est, ubi
vulnus est, quid.

Quomodo vulnus ligari conueniat.

A scia uero ad vulnus deligandum lintea aptissima est: ea q;
f lata esse debet, ut semel iniecta non vulnus tantum, sed pau
lum utrinq; etiā oras eius comprehendat. Si ab altera par
te caro magis recessit, ab ea melius attrahitur. Si aeq; ab utraq; trāse
uersa comprehendere oras debet: aut si id vulneris ratio non pati
tur: media primum iniicienda est, ut tum in utraq; partem ducatur.
sic autem deliganda est: ut & contineat, neq; astringat. quod non
continetur, elabitur. quod nimis astrictum est, canero periclitatur.
Hyeme sæpius fascia circuire debet: æstate quotiens necesse est: tum ex
trema pars eius inferioribus acu assuenda est. nam nodus vulnus
lædit: nisi tamen longe est. illo neminem decipi decet, ut propriam ui
særum curationem requirat: de quibus supra posui. Nam plaga ipsa
curanda extrinsecus uel futura, uel alio medicinae genere est. In uisce
ribus nihil mouendum est: nisi aut si quid ex iocinere, aut liene, aut
pulmone duntaxat extremo dependeat: præcidatur. alioquin uul
nus interius ea uictus ratio, ea q; medicamenta sanabunt: quæ cuiq;
uisæri conuenire superiore libro proposui.

quomodo iniicienda
sit fascia.

Pul. uisceris

De ratione uictus, & notis uulnerum, curationibusq; eorum.

Is ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est: is q;
h si graue vulnus est: abstinere quantum uires patiuntur ante
inflammationē a cibo debet. bibere donec situm finiat aquā
calidam. uel si æstus est, neq; febris, neq; dolor est: et frigidam. adeo
tamen nihil perpetuum est. sed semper pro uiribus corporis æstiman
dum ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit:
tenuem scilicet & exiguum, qui tantum sustineat. Multiq; etiam ex
profluuio sanguinis inter morientes ante ullam curationem uino re
ficiendi sunt: quod alioquin inimicissimum uulneri est. nimis uero
intumescere uulnus, periculosum: nihil intumescere: periculosissimum
est. illud inditium est magnæ inflammationis: hoc emortui corpo
ris. Protinusq; si mens homini consistit: si nulla febris accessit: scire li
cet mature uulnus sanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet,

Nel p^u r^o s^u

inimicissimum

LIBER

si in magno vulnere, dum inflammatio est: permanet. Illa pernicio-
sa est, quæ uel leui vulnere superuenit: uel ultra tempus inflammatio-
nis durat: uel delirium mouet: uel si neruorum rigor, aut distentio, quæ
ex vulnere orta est: eam non finit. Vomitus quoque biliosus non uolun-
tarius, uel protinus ut percussus est aliquis, uel dum inflammatio ma-
net, malum signum est, in his duntaxat, quorum uel nerui uel etiam
neruosi loci uulnerati sunt. Sponte tamen uomere non alienum est, præ-
cipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neque protinus post cibum, neque
iam inflammatione orta: neque cum in superioribus partibus plaga est.
Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendumque: sa-
nities ex aqua frigida est: eademque: rursus iniicienda sunt. Quinto iam
die quantæ inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto
vulnere considerandus color est. Quod si liuidus, aut pallidus, aut va-
rius, aut niger est: scire licet malum uulnus esse. idque: quandoque: ani-
ma aduersum est terrere nos potest. album, aut rubicundum esse ulcus,
commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit.
bona signa sunt ubi hæc sine dolore tenuis et mollis est. Sed si gluti-
natur uulnus, aut leniter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ pri-
mo fuerunt. Si grauis inflammatio est, neque glutinandi spes est, ea quæ pus
moueant: aquæ quoque: calidæ necessarius usus est, ut et materiam dige-
rat: et duritiæ emolliat: et pus citet. Ea sic temperanda est, ut et
manu contingenti iocunda sit: usque: eo adhibenda, donec aliquid ex tu-
more minuisse, coloremque: ulceri magis naturalem reddidisse uideatur:
maximeque: si grande uulnus est, *τετραπλάσιον*: si in articulis, digitis,
locis cartilagineosis *πυρρῶδες*. Post id fomentum si lata plaga non pa-
tet: imponi protinus emplastrum debet: et si latius hiat, illud empla-
strum liquari ex irino unguento oportet: eoque: illita linamenta disponi
per plagam: deinde emplastrum supra dari, et super id succidam la-
nam: minusque: etiam, quam primo fasciæ astringendæ sunt.

Curaciones propriæ articulorum.

Propriæ quedam in articulis uisenda sunt: in quibus si præ-
cipue nervi sunt, qui continebant: debilitas eius partis sequitur.
Si id dubium est: et ex acuto telo plaga est: ea transversa
commodior est. Si retuso et graui est, nullum in figura discrimen est.
At uisendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo na-
scatur: albumque: et crassum diu fertur: neruum præcisum esse credibi-
le est. Magis quoque: maiores dolores, inflammationesque: quo maturius
excitæ sunt. Quauis autem non abscissus neruus est: tamen si cir-
ca tumor durus diu permanet: necesse est et diuturnum ulcus esse:

Et sano quoque eo tumorem permanere futurumque est, ut tarde membrum id extendatur uel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, ubi recuruato articulo curatio adhibita est, quam in recuruando eo, quod rectum continuerimus. Colla carum quoque membrum: quod ictum est ratione certa debet. Si glutinandum est, ut superius sit: si in inflammatione est: ut in neutram partem inclinatum sit. Si iam pus profluit, ut deuexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moueri et ambulare nisi sanis alienum est. Minus tamen his est periculosum, qui in capite uel brachijs, quam qui inferioribus partibus uulnerati sunt. Minimeque ambulatio conuenit: facine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo cubabit, tepidus esse debebit. Balneum quoque, dum parum uulnus purum est: inter res infestissimas est. Nam id et humidum et sordidum reddit: ex quibus ad cancerum transitus esse consuevit. Levis frictio recte adhibetur, sed his partibus, quae longius absunt a uulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

Inflammatione finita, uulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta. Supraque id, emplastrum, uel *εὐεραπύρανον* dandum est. Tum demum uero purum uulcus est: cum rubet, ac nimium neque siccum neque humidum est, ac quodcumque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est. Quod aut pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum est: id purum non est.

Quomodo uulnus implendum est.

Urgato, sequitur ut impleatur, iamque calida aqua etenus necessaria est, ut sanies remoueat. Lanae succida superuacua usus est. Lota melius arundatur. Ad implendum autem uulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua. Itaque ea adhiberi non alienum est, ut butyrum cum rosa: exigua mellis parte, aut cum eadem parte, aut cum eadem rosa *τετραπύρανον*, aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum. Cibi boni succi, uitae omnibus acerbis, sed iam plenioribus. Nam et auis, et uenatio, et suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienum est. Itemque usque ad cicatricem, si nerui, musculiue uulnerati sunt, etiam si alte caro, aut si plaga in summa cute generis tutioris est: potest non peruectus, modice tamen datum ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est: quod in neruosis locis musculosisque necessarium est: cerato quoque super uulnus utendum est. At si caro supercreuit, modice reprimat siatim linamentum, uehementius squama ceris. Si plus est quod tolli opus est: adhibenda sunt etiam uehementio-

vly pur

Caro relictus

percreuit, modice reprimat sicum linamentum, uehementius squama
 æris. Si plus est quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum uehe-
 mentiora, quæ corpus excedunt. Cicatricem post omnia hæc commode
 inducit lycum ex passō, aut lacte dilutum, uel etiam per se imposi-
 tum sicum linamentum.

De uulneribus: quæ extrinsecus per uulnera incidunt, curationibusq; eorū.

h. Ic ordo felicitis curationis est. Sed quædam tamen periculosa in-
 cidere consueverunt. Interdum enim uetustas ulcus occupat, indu-
 citurq; ei callus, & circum oræ crassæ liuent. post quæ quicquid me-
 dicamentorū ingeritur, parum proficit. quod ferè negligenter curato
 ulcери superuenit. Interdum uel ex nimia inflammatione, uel ob æstus
 immodicos, uel ob nimia frigora, uel quia nimis uulnus ascriptū est,
 uel quia corpus aut senile, aut mali habitus est cancer occupat. Id ge-
 nus à græcis diductum in species est, nostris uocabulis non est. Om-
 nis autem cancer non solum id corrumpit: quod occupauit, sed etiam
 serpit: deinde alijs, alijsq; signis decernitur. Nam modo super inflam-
 mationem rubor ulcus ambit. isq; cum dolore procedit. ἐπιστῆλας
 græci nominant. Modo ulcus nigrum est: quia caro eius corrupta est.
 Idq; uehementius etiam putrescendo intenditur. Vbi uulnus humi-
 dum est, & ex nigro ulcere humor pallidus fertur, maliq; odoris est,
 caruncula corruptæ, interdum etiam nervi ac membranae resoluun-
 tur, specillumq; demissum descendit, aut in latus, aut deorsum, eoq; ni-
 tio nonnunq; os quoq; afficitur. modo oritur ea: quàm græci ῥάγδα
 uar appellant. Priores in qualibet parte corporis fiunt. Hoc in pro-
 minentibus membris idest inter ungues & alas, uel inguinia, ferèq;
 in senibus, uel his, quorū corpus mali habitus est. Caro in ulcere uel
 nigra, uel liuida est: sed sicca & arida, proximaq; cutis plerunq;
 sub nigris pusulis impletur, deinde ei proxima uel pallida, uel liui-
 da, ferèq; rugosa sine sensu est. Vltior in inflammatione est, omniaq;
 ea simul serpunt, Vlcus: in locum pusulosum. Pusula: in eum, qui pal-
 let aut liuet. Pallor aut liuor: in id quod inflammatum est. Inflam-
 matio: in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta
 oritur, ingensq; sitis. quibusdam etiam delirium accedit. alij quatuor
 mentis suæ cōpotes sunt, balbutiendo tamen uix sensus suos explicantes.
 Incipit affici stomachus. Fit foedi spiritus ipse odor. Atq; initium
 eius quidem mali recipit curationem. Vbi uero penitus insedit, insa-
 nabile est. plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

Curatio ulceris.

a. C pericula quidem uulnerum hæc sunt. Vetus autem ulcus
 scarpello conijciendum est, exadendaq; eius oræ, & quicq;

Epulid.

De Uiceribus.

quid super eas linet, æque incidendum. Si varicula intus est: quæ his sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde ubi sanguis emissus, noua tumq; vulnus est, eadem curatio adhibenda: quæ in recentibus vulneribus exposita est. Si scalpello aliquis uti non uult: potest sanare id emplastrum: quod ex ladano fit, & cum ulcus sub eo exesum est: id, quo cicatrix inducitur.

Curatio erysipelorum.

D autem quod ἐρυσιπέλας vocari dixi: non solum vulnere se peruenire: sed sine hoc quoque oriri consuevit: atq; interdum periculum maius affert: utiq; si circa ceruices aut caput constitit. Oportet si vires patiuntur sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia, maximeq; cerussam solani succo: aut amoliam cretam aqua pluuiali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam cyresso adiecta, aut si tenerius corpus est: lenticulam. Quicquid impositum est: betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo. sulphuris. P. XI. cerussæ & croci, singulorum. P. XII. eaq; cum uino conterenda sunt, & id his illinendum: aut si durior locus est, solani folia contrita suille adipi miscenda sunt, & illita linteolo super iniicienda. At si nigrities est: neq; dum serpit: imponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedunt: repurgatumq; ulcus sic, ut cætera nutriendum est. Si magis putre est: iamq; proædit ac serpit: opus est uehementius erodentibus. Si ne hæc quidem euincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est: siccum est cum aduritur: post unctionem putris ulceris superponenda sunt, quæ crustas à uiuo resoluant, eas & ἱεὶ græci uocant. ubi exciderunt, purgandum ulcus maxime melle et resina uest: sed alijs quoque purgari potest: quibus purulenta curantur, eodemq; modo ad sanitatem perducendum est.

Curatio Gangrenæ.

Angrenam uero si nondum plane tenet, sed adhuc incipit: curare non difficillimum est, utiq; in corpore iuuenili, et magis etiam si musculi integri sunt: si nervi uel læsi non sunt: uel leuiter affecti sunt: neq; ullus magnus articulus nudatus est: aut carnis in eo loco paulum est: ideoq; non multum, quod putresceret, fuit, consistitq; eo loco uitium quod maxime fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est & intentione quadam proximū quoque locum male habet: usque eo sanum corpus conadere.

Vulnus uehes

o. ep. 2. u. 7. f. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

reg. m. m. s. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Males ep. 3. quæ p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Medicamenta uero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt: quæ pus
 mouere consuerunt. ideoq; ne aqua quidem calida. Grauiæ quoque:
 quanuis reprimantia, aliena sunt. Sed his quàm leuissimis opus est. su-
 perq; ea, quæ inflàmata sunt: utendum est refrigerantibus. Si nihilo
 magis malum constitit, uri id quod est inter integrũ ac uitiatum locum
 debet. Præcipueq; in hoc casu petendũ non à medicamentis solum, sed
 etiam à uictus ratione præsidium est. Neq; enim id malum nisi cor-
 rupti uitiosi q; corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, ab-
 stinentia utendum. Deinde danda quæ per cibum potionemq; aluum:
 ideoq; etiam corpus astringant, sed ea leuia. Postea si uitium constitit:
 imponi super uulnus eadem debent: quæ in putri ulcere præscripta
 sunt. Ac tum quoq; plenioribus cibis uti licebit ex media materia, sic
 tamen non nisi aluum corpusq; siccantibus. aqua uero pluuiali frigi-
 da. balneum nisi iam certa fiducia redditæ sanitatis est, alienum est,
 si quidem emollitum in eo uulnus cito rursus eodem malo afficitur.
 Solent uero nonnunq; nihil omnia auxilia proficere, ac nihilo minus
 serpere his cancer. Inter quæ miserum sed unicum auxilium est, ut cæ-
 tera pars corporis tuta sit, membrum quod paulatim emoritur, abscin-
 dere. Hæ grauissimorum uulnerum curationes sunt. Sed ne illa qui-
 dem negligenda, ubi integra cute interior pars collisa est, aut ubi dera-
 sum, ac tritum uel aliquid est, aut ubi surculus corpori infixus est, aut
 ubi tenue, sed altum uulnus insedit. In primo casu commodissimum
est malicorium ex uino coquere, interioremq; eius partem conterere,
et cerato miscere ex rosa facto, idq; supponere. deinde ubi cutis ipsa
 exasperata est, inducere lenè medicamentum. quale $\lambda\iota\tau\alpha\rho\alpha$ est. Dera-
 so uero detricto q; imponendum est emplastrum $\tau\epsilon\rho\rho\alpha\phi\alpha\rho\mu\alpha\kappa\iota\upsilon$, minus
 endusq; cibus, et uinum subtrahendum. Neq; id: quia non habebit
 altiores ictus, contemnendum erit. Si quidem ex eiusmodi casibus
 sæpe canceri fiunt. Quod si leuius id erit, et in parte exigua, contenti
 esse poterimus eodem leni medicamento. Surculum uero, si fieri potest,
 oportet uel manu, uel etiam ferramento eicere. Si uel præfractus est,
 uel altius descendit: quàm ut ita fieri possit, medicamento euocandus
 est. Optime autem educit super imposita arundinis radix, si tenera
 est, protinus contrita, si iam durior, ante in mulso decocta. Cui semper
 mel adijciendum est, aut aristolochia cum eodè melle. Pessima ex sur-
 culis arundo est, quia aspera est. Eademq; offensa etiam in filicis ha-
 stula est. Sed usu cognitum est utraq; aduersus alteram medicamen-
 tum esse. si contrita super imposita est. Facit autem idem in omnibus
 surculis quodcumq; medicamentum extrahedi uim habet. Idem altis
 tenuibusq; uulneribus aptissimum est. Priori rei Philocratis: huic He-
 cati

catei emplastrum maxime conuenit.

Quo modo cicatrix uulneri inducenda, purgandaq; sit.

Bi uero in quolibet uulnere uentum ad inducendum cicatricem est: quod per purgatis iam repletisq; ulceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentum, dum cito aliter, deinde cum iam continenda est: sicut imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet: quo et reprimatur cicatrix, et colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix siluestris cucumeris prestat. Idem compositio, quæ habet elaterij. P. XI. sumæ argenti. P. XII. unguenti pond. XIII. Quæ exapiuntur resina terebinthina: donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoq; cicatrices leniter purgât paribus portionibus mixta, ærugo, plumbum elotum, eademq; rosa cocta, siue ungitur cicatrix: quod in facie fieri potest: siue id ut emplastrum imponitur: quod in alijs partibus commodius est. At si uel excreuit cicatrix, uel concana est, stultum est decoris causa rursus et dolorem, et medicinam sustinere. Alioqui res utriq; succurri patitur: Si quidem utraq; cicatrix exulcerari scalpello potest. si medicamentum aliquis manuât: idem efficiunt compositiones hæ: quæ corpus exedunt. Cui exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniicienda sunt. Super concanam, implentia: donec utrunq; ulcus sanæ cuti æquetur, et tum cicatrix inducatur.

De uulneribus quæ per morsus inferuntur, eorumq; curationibus. Caput XXVII.

d Ixi de his uulneribus, quæ maxime per tela inferuntur. Sequitur ut de his dicam, quæ morfu fiunt, interdum hominis, interdum simiæ, sepe canis, nonnunquam ferorum animalium, aut serpentium. Omnis autem ferè morsus habet quoddam uirus. Itaq; si uehemens uulnus est: cucurbitula admouenda est. Si leuius: protinus emplastrum iniiciendum, præcipueq; Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, quæ aduersus morsus proposui. si ea non sunt. uiride alexandrinum. si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his quæ recentibus uulneribus accomodantur. Sal quoque his, præcipueq; ei, quod canis fecit, medicamentum est: si manus uulneri imponitur, superq; id duobus digitis uerberatur (Exsaniet enim) ac salsa mentum quoq; recte super id uulnus deligatur.

Aurelij Cor.

1

album plumbum

X

Vulnera ab
accidentibus accepta

fol. 69. est. Aug. ad
aliquid

Tiq; autem si rabiosus canis fuit, cucurbitula uirus eius ex-
 trahendum est. deinde si locus neq; nervosus, neq; musculo-
 sus est, uulnus id adurendum est. si uri non potest, sanguine
 homini mitti non alienum est. tum uiso quidem uulnere super im-
 ponenda, quæ cæteris istis sunt. ei uero quod expertum ignem nō est,
 ea medicamenta, quæ uehementer exedunt. post quæ nullo nouo ma-
 gisterio, sed iam supra posito, ulcus erit implendum: & ad sanitatem
 perduendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in bal-
 neum mittunt: ibiq; patiuntur desudare, dum uires corporis sinunt
 ulcere adaperto: quo magis ex eo quoq; uirus desillet. deinde multo
 mera coq; uino excipiunt. quod omnibus uenenis contrarium est. idq;
 cum ita per triduum factum est, tutus esse homo à periculo uidetur.
 Solet autem ex eo uulnere, ubi parum occisum est, aquæ timor nasci.
 ὕδρφοβος græci appellant. Miserrimum genus morbi, in quo simul
 æger & sitis, & aquæ metu cruciatur. quo oppressis in angusto spes
 est. Sed unicum tamen remedium est: nec opinantem in piscinam non
 ante ei prouisam proijcere. Et si natandi scientiam non habet modo
 mersum bibere pati, modo attollere. Si habet, interdum deprimere, ut
 inuitus quoq; aqua satietur. sic enim simul & sitis, & aquæ metus
 tollitur. Sed aliud periculum excipit: ne infirmum corpus in aqua fri-
 gida uexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina
 protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum autem præci-
 pue id quod primo loco posui. ubi id non est, aliud si nondum æger
 aquam horret, potui ex aqua dandum est: & si amaritudine offen-
 ditur: mel adijciendum est. Et si iam is morbus occupauit: per catapo-
 tia sumi potest.

Curationes communes aduersus omnes morsus serpentium.

Erpentium quoq; morsus non nimium distantem curatio-
 nem desiderant: quantum in ea multum antiqui uariarunt,
 ut in singula genera anguim singula medendi genera præ-
 ciperent: atq; alijs alia. sed in omnibus eadem maxime proficiunt.
 Igitur in primis super uulnus id membrum deligandum est: non ta-
 men nimium uehementer, ne torpeat. Dein uenenum extrahendū est.
 id cucurbitula optime facit. Neq; alienū est ante scalpello circa ul-
 nus incidere: quo plus uitiati iam sanguinis extrahatur. Si cucurbi-
 tula non est: quod tamen uix incidere potest: tum quodlibet simile uas
 quod idem possit. si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui uul-
 nus exsugat.

mus exsugat. Neq; hercules scientiam præcipuam habent hi qui psilli nominantur: sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam uenenum serpentis, ut quædam etiã uenatoria uenena, quibus galli præcipue untur: non gustu, sed in uulnere nocent. Ideoq; colubra ipsa tuto estur: ictus eius occidit: & si stupente ea, quod per quædam medicamenta circulatores faciunt: in os digitum quis indidit: neq; percussus est: nulla in ea salua noxa est. Ergo quisquis exemplum psilli secutus id uulnus exsuxerit, & ipse tutus erit: & tutum hominem præstabit. Illud ne intereat, ante debet attendere: ne quod in ginguis, palato ue, alia ue parte oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco calido collocandus est sic, ut id, quod percussum erit, in inferiorem partem inclinetur. si neq; qui exsugat: neq; cucurbitula est: sorbere oportet ius anserinum, uel ouillum, uel uitulinum, & uomere. Vinum autem galinaceum pullum per medium diuidere: & protinus calidum super uulnus imponere sic, ut pars interior corpori iungatur. Facit id etiã hædus, agnus ue discissus, & calida eius caro statim super uulnus imposita. emplastra quoq; quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumq; est uel ephesium, uel id quod ei subiectum est. præsensq; in aliquo antidoto præsidium est. sin id non est: necessarium est exsorbere potionem meri uini cum pipere, uel quidlibet aliud, quo calor mouendus est: ne humore intus coire patiatur. Nam maxima pars uenenum frigore interimit. Omnia etiam urinam mouentia, quia materiam extenuant: utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium,
& primo aduersus ictum Aspidis.

Acc aduersus oēs ictus cõmunia sunt. Vnus tamen ipse docuit, eum, quæ aspis percussit: acetum potius bibere debere.

Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri: qui cum ab hac ictus esset: et partim ob ipsum uulnus, partim ob immodicos æstus siti premeretur: ac locis siccis alium humorem nõ reperiret: acetum, quod forte secum habebat, ebibit: & liberatus est. Credo qm id, quantum refrigerandi uim habet, tamen habet etiã dissipandi. Quo fit ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo uerisimile est, spissescen-
tem quoq; intus humorem hominis ab eo discuti: & sic dari sanitatẽ.

Aduersus ictum scorpionis.

N quibusdam etiam alijs serpentibus certa quædã auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimũ medicamentum est. Quidam contritum cum uino bibunt: quidam eodẽ modo contritum super uulnus imponunt: quidã super prunã

Lethus scorpionis

eo imposito vulnus suffumigant undiq; ueste circumdata, ne is fumus dilabatur: tum carbonem eius, super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris, quam ἡλιοφύτιον græci vocant: semen, uel certe folia ex uino. Super vulnus uero etiam fursures ex aceto, uel ruta siluatica recte imponitur, uel cum melle sal tostus. Cognoui tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

Aduersus aranei & scorpionis ictum.

c T ad scorpionis autem & ad aranei ictum allium cum ruta recte miscetur, ex oleoq; contritum super imponitur.

Aduersus Ceraſtis, & Dipsæ, & Hæmorrhoidis ictum.

a T si Ceraſtes, aut Dipsas, aut Hæmorrhoids percussit: catapotium, quod ægyptiæ fabæ magnitudinem æquet, arefactum in duas portiones diuidendū est sic, ut ei ruta paulum adijciatur. Trifolium quoq; & mentastrum, & cum aceto panaces æque proficiunt. Costumq; & casia, et annamomū recte per potionem assimuntur.

Aduersus Cherſydri ictum & ceraſtis.

a Duerſus Cherſydri uero ictum, panacis, aut laser, quod sit scrupulorum. IIIS. XI. uel porri suavis cum hemina uini sumendus est, et edenda multa satureia. Imponendum autē super vulnus sterus caprinum ex aceto coctum, aut ex eodem hordeacea farina, aut ruta, uel nepeta cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoq; uulnere, quod ceraſtes fecit, æq; ualet.

Aduersus Phalangij ictum.

u Bi uero phalangium nocuit, præter eam curationem, quam manu redditur, sepe homo demittendus in solium est, dandusq; ei myrrhæ & uuae taminie par' modus ex passi hemina: uel radiculae semen, aut lolij radix ex uino, & super vulnus fursures ex aceto coctæ: imperandumq; ut is conquiescat.

Aduersus ictus italorū anguiū, qui minus terribiles peregrinis sunt.

u Erum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt, maximeq; æstuosus locis gignuntur. Italia, frigidior esq; regiones hac quoq; parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus quos satis proficit

Stomus Capri
Anglo nigro
Hydropis latus

herba betonica, uel cantabrica, uel centaurion, uel agrimonia, uel trixago, uel personina, uel marinae pastinacae singulae, binæ uel tritæ et cum uino potui datæ: & super uulnus impositæ. Illud ignorari nõ oportet, ois serpentis ictum & ieiuni, & ieiunio magis nocere. Ideoq; perniciosissimæ sunt, cum incubant. Vtilissimumq; est, ubi ex anguib; metus est, non ante progredi, quàm quid aliquis assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia uenena, uel cibo,
uel in potione assumpta.

On tam facile his opitulari est, qui uenenum, uel in cibo, uel in potione sumpserunt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non à cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto uomere. Deinde, ubi præcordia exhausit, bilere antidotum. si id non est, uel merum uinum.

Specialia remedia aduersus quædam uenena, & primo
aduersus cantharidas.

¶ Vnt tamen quædã remedia propria aduersus quædam uenena, maximeq; leuiora. Nam si cantharidas aliquis ebibit: pance cū lacte cōtusa, uel galbano, uino adiecto dari, uel lac p se debet.

Aduersus cicutam.

¶ I cicutã: uinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est: deinde is uomere cogendus. posteaq; laser ex uino dandum. Isq; si febre uacat: in calidum balneum mittendus. Si non uacat: unguendus ex calefactentibus est. post quæ quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum.

¶ I hyoscyamum: feruens mulsu bibendum est: aut quodlibet lac, maxime tamen asinum.

Aduersus cerussam.

¶ I cerussam: ius maluæ, uel ius glandis ex uino contritæ maxime profunt.

Aduersus sanguisugam si epota est: & lac quod intus coijt.

¶ I sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coijt, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto laser.

Aurelij Cor.

l iij

LIBER

Aduersus fungos inutiles.

I fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut epota, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi uero hi & specie quidem discerni possunt ab utilibus, & cocturae genere idonei fieri. Nam siue ex oleo inferuerunt, siue piri surculus cum his inferunt, omni noxa uacant.

De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.

Dustis quoque locis extrinsecus uis infertur. Itaque sequi uidetur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur folijs, aut lilij, aut lingue caninae, aut betæ in uetere uino, oleoque decoctis. Quorum quidlibet protinus impositum ad sanitatem perducit. Sed diuini quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimentiisque: primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculam exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticula cum melle farina, uel myrrha, uel uino: creta amolia cum thuris cortice contrita & aqua coacta, atque ubi usus necessitas incidit: aceto diluta. Ex insequentibus quælibet nitaxa. Sed idonea maxime est, quæ uel plumbi recrementum, uel uitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est: impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit, farina cum ruta, uel porro, uel marrubio, donec crusta cadant. Tum eruam cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit. Nouissime siccum linamentum.

De interioribus ulceribus, quæ aliqua corporum parte corrupta nascuntur. Cap. XXVIII.

De carbunculo, & eius curatione.

B his quæ extrinsecus incidunt ad ea ueniendum est, quæ interius corrupta aliqua corporum parte nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. eius hæc notæ sunt. Rubor est: superque eum non nimium pustula eminet: maxime nigra: interdum subliuida, aut pallida. In his sanies esse uidetur: infra color niger est. Ipsum corpus aridum & durius quam naturaliter oportet. Circa quem quasi crusta est: eaque inflammatione angitur: neque in eo loco lenari cutis potest: sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget: nonnunquam horror, aut febris oritur: aut utrumque. Idque uitium subter actis quasi quibusdam radicibus serpit: interdum celerius, interdum tardius: supra quoque procedens in albescit: deinde liuidum fit, circumque exiguae pustulae oriuntur. Et si circa stomachum, fauces uel

*His fungis confuso
linamentum ad
curand. pustulas
cutis. n. p. u.*

incidit, subito spiritum saepe elidit. Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id graue est (nam non sentit: quoniam ea caro mortua est) sinusque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde uulnus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta undique à uina carne diducta, quae trahit secum quicquid corruptum erat: purusque iam sinus curari potest implentibus. At si in summa cute uitium est: possunt succurrere quaedam uel exedentia tantum, uel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumque uero medicamentum positum est: si satis proficiet, protinus à uina corruptam partem resoluit. Certa quoque esse fiducia potest ferè, ut undique uitiosa caro excedat: qua huiusce rei medicamen exest. Si id non fit, medicamentum malo uincitur, utique ad usum properandum est: sed in eiusmodi casu abstinendum à cibo, à uino est. Aquam liberaliter bibere expedit: magisque ea seruanda sunt, si febricula quoque accessit.

De carcinomate, et eius curatione.

On idem periculum carcinoma affert, nisi imprudentia carantis agitata est. Id uitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas foeminarum. Et iecore autè, aut plene hoc nascitur. Circa locum, aliqua quasi puncta sentiuntur: isque immobilis, inaequalis tumet: interdum etiam torpet. Circa eum inflatae uenae quasi recurvantur: haecque pallent, aut liuent: nonnunquam etiam in quibusdam delitescent. Tactusque is locus alijs dolorem affert, in alijs cum non habet. Et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet: nonnunquam hisdem omnibus ulcus accedit. Interdumque nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quae uocantur graeci *κρόδυλα ματὰ*: aspredine quadam et magnitudine sua. Colorque eius ruber est, aut lenticulae similis neque tuto fertur. Nam protinus aut resolutio neruorum, aut dissentio insequitur. Saepe homo ictus et mutescit, atque eius anima deficit. Quibusdam etiam si id ipsum pressum est, quae circa sunt: intenduntur et intumescunt. Ob quae pessimum id genus est: ferèque primum id fit quod *κακόνες* à graecis nominatur. Deinde ex eo id carcinoma quod sine ulcere est. Deinde ulcus ex eo thymum. Tolli nihil nisi *κακόνες* potest: reliqua curationibus irritantur. Et quo maior uis adhibita est, eo magis quidam uisi sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro adusserunt: quidam scalpello exciderunt. Neque ulli unquam medicina proficit: sed adusta protinus cantharizata sunt et increuerunt, donec caderent. Exasa etiam post indu-

*hunc hunc hunc
apparet hunc hunc
fuit uelut affligit
hunc*

Expos. and up into the
 air, like a paper mill.
 Then the sun is
 Colored green, and
 then

e

九

inpergenda arida aloë oenanthe est: & si parum proficiat, chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne nudatus est: contegendus ante linteolo est: ne sub eo medicamento aduratur. Si ualidioribus etiam num remedijs opus est: ad eas compositiones ueniendum est, quæ uehementius adurunt. Quicquid autem inpergitur, auerso specillo infundi debet. Super danda cum melle sunt uel linamenta, uel oleæ folia ex uino decocta, uel marrubium: eaq; linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso. Circaq; qua tumor ex inflammatione est, imponenda quæ reprimant cataplasmata. si sub his nihil proficiatur: ferro locus aduri debet: diligenter nervus, si qui apparent: ante contectis. Adustum uel medicamentis, uel ferro corpus primum purgandū, deinde implendū esse: apparere cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne, & eius curatione.

supra f. 80.

Acer quoq; ignis malis ulceribus annumerari debet. eius due species sunt. Alterum est subrubicundum, aut mixtum rubore, atq; pallore: exasperatumq; p pustulas continuas, quarum nulla, altera maior est, sed plurimæ perexiguæ. In his semper ferè pus, & sepe rubor cum calore est: serpitq; id nonnunquam sanescente eo, quod primum uitiatum est: nonnunquam etiam exulcerato: ubi ruptis pustulis ulcus continuatur: humorq; exit: qui esse inter saniem, et pus uideri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueq; in plantis. Alterum autem est in summa cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, subliuidum, inæqualiter tamen, mediumq; sanescit extremis procedentibus: ac sæpe id quod iam sanum uidebitur, iterum exulceratur. At circa proxima cutis, quæ uitium receptura est: tumidior, & durior est: coloratq; habet ex rubro subnigrum. Atq; hoc quoq; malo fere corpora seniores tentantur: aut quæ mali habitus sunt, sed in cruribus maxime. Omnis autem sacer ignis ut minimum periculum habet ex his quæ serpunt: sic propè difficillime tollitur. Medicamentum eius fortuitum est: uno die febris, quæ humorem noxium absumat. Cuius quo crassius, & albidius est: eo periculi minus est. Prodest etiam infra os ulcerum lædi: quo plus puris exeat, & id, quod ibi corruptum corpus est: extrahat. sed tamen si febricula accessit, abstinencia, lectulo, alui ductione opus est. In omni uero sacro igni neq; lenibus, et glutinosiis cibis, neq; salis, & acris utendum est: sed his quæ inter utrunq; sunt: qualis est panis sine fermento, piscis, hedus, aues, exceptoq; apro omnis ferè uenatio. Si non est febricula, & gestatio utilis

LIBER

est, & ambulatio, & uinum austerū & balneum. Atq; in hoc quoq; genere potio magis liberalis esse, quā cibis debet. Ipsa autem ulcera si mediocriter serpunt: aqua calida. Si uehementius, uino calido fouenda sunt. Deinde acū pusula quæcūq; sunt aperiendæ. Tum imponenda ea: quæ putrem carnem exedunt. Vbi inflammatio sublata, ulcusq; purgatum est: imponi leue medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonea in uino acta atq; contrita. Potest emplastrum uel Hieræ, uel τρυφώπων, cui quinta pars thuris adiecta sit. Potest nigra hederæ ex uino austero acta. Ac si celeriter malum serpit: non aliud magis proficit. Purgato ulcere: quod in summa cute esse proposui: satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficiunt.

De Chironeo ulcere, & eius curatione.

Hironeum autem ulcus appellatur, quod & magnum est, et c
habet oras duas, collosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neq; in ulcere, neq; in eius humore est. Nulla inflammatio, dolor modicus est. nihil serpit: ideoq; nullum periculum affert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur: deinde iterum rumpitur: ulcusq; renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Super id imponi debet, quod & lene aliquid, & uehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa sit ex his. Squamæ æris: plumbi eloti combusti, singulorum. P. XIII. Cadmiæ, ceræ: singulorum. P. XVIII. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

De ulceribus quæ ex frigore in pedibus & manibus oriuntur, & eorum curationibus.

Iunt etiam ex frigore hiberno ulcera: maxime in pueris, et f
præcipue pedibus, digitisq; eorum, nonnunq; etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pusculæ oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est: nonnunquam humor exit: sed non multus, qui referre uel pus, uel saniem uidetur. In primis multa calida aqua fouendum est: in qua rapa deacta, aut si ea non sunt: aliquæ uerbenæ ex reprimentibus. Si nondum ad apertum ulcus: æs, q̄ maxime calidum quis pati potest, ad mouendum est. Si iam exulceratio est: imponi debet alumen æqua portione cum thure contritum, cum uino adiecto: aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est: hic quoq; melius lenia medicamenta proficiunt.

De struma, & eius curatione.

Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quedam ex pure & sanguine quasi glandulae oriuntur. Quae uel praecipue fatigare medicos solent: quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt, et siue ferro, siue medicamentis curantur. Plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoque post medicamento est opus. Quibus id quoque accedit: quod longo spatio detinent. Nascentur maxime in ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque foeminarum se repperisse chirurgicus Megeas auctor est. Propter haec et album ueratrum recte datur: atque etiam saepius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur: quae humorem, uel educant, uel dissipent: quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoque quidam utuntur: quae exedunt: crustaque eum locum astringunt: tunc uero ut ulcus curant. Quaecumque autem ratio curandi est: corpus puro ulcere exercendum atque alendum est: donec ad cicatricem perueniat. Quae cum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet, cum: si anguem edit: liberari.

De furunculo, & eius curatione.

Furunculus uero est tuberculum acutum cum inflatione & dolore, maximeque ubi iam in pus uertit. Qui ubi adaper tus est: & exit, super apparet pars carnis in pus uersa: pars corrupta subalbida, subrubra: quem uentriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quae maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est: sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cetera desunt: imponi debent primum non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde si non repressit: quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidem est, uel resina, uel fermentum. Expresso pure nulla ultra curatio necessaria est.

De phymate, & eius curatione.

Phyma uero nominatur tuberculum furunculo simile: sed rotundius & planius: saepe etiam maius. Nam furunculus oui dimidii magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit: sed inflammatio, dolorque sub eo minores sunt. Vbi euulsus est pus: eodem modo, apparet uentriculus:

Glandula indurata.

id est hellebori ablu

Anguis.

Phyma furunculo assimilatur.

*Carnē corrupta
i pus ueris*

quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta caro in pus uertitur. Id autem in pueris et sepius nascitur, et facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur, et difficilius curatur. Vbi ætas indurauit, ne nascatur quidem. Quibus uero medicamentis discenteretur, supra propositum est.

De phygelo, et eius curatione.

Phygelus quid

locus

figura

signa

Uterque autem est tumor non altus, latus, in quo quiddam pusulæ simile est. Dolor, distentioque uehemens est: et maior quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricitans: idque tarde maturescit, neque magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in uertice, aut in alis, aut inguinibus. Panem ad similitudinem figuræ nostri uocant, atque id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstravi. Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius uitium ad suppurationem spectans. Idque ferè fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius: maximusque eos, qui uentrem infestauerunt. Sepiusque oculis expositum est. Siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma uocari propositum: rubetque cum calore, et paulopost etiam cum duritia, magisque innocenter indolescit: et sitim, uigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest: maximeque ubi altius pus mouetur. Sed cum sitim, uigiliamque sentiuntur intus aliquæ punctiones, et quod desubito durius non est, melius est: et quantum non rubet: coloris tamen aliter mutatus est. quæ signa iam pure oriente nascuntur. Tumor, ruborque multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus is materiæ aditus est per cataplasmata, quæ simul et reprimunt, et refrigerant: qualia et aliàs et pauloante in erysipela propositum. Si iam durior est, ad ea ueniendum est, quæ digerant, et resoluant: qualis est ficus arida contusa, aut fex mixta cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit: aut cucumeris radix, cui ex farina duæ partes adiectæ sint, ante ex mulso decoctæ. Licet etiã miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, prope olim, uiscum: pòdusque adijcere myrrhæ dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque et malagmata idem efficiunt: quæ supra explicui. Quod per hæc discussum non est, necesse est maturescat: idque quocelerius fiat, imponenda est farina hordeacea, ex aqua cocta recte miscetur. Eadem autem hæc in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina, proprietatesque supra reddidi, recte fiunt. eademque omnium curatio. tantum modo distat. Crudum est autem, in quo magis quasi uenarum motus est, et grauitas, et ardor, et distentio, et dolor, et rubor, et durities. Et si maior abscessus est, horror,

Cura. i.

*Signa crudi
Tumoris*

aut etiam febricula permanet, Penitusq; condita suppuratio. Si pro his, quæ alibi cutis ostendit, punctiones sunt, ubi ista se remiserunt, iamq; is locus prurit, & aut sublividus, aut subalbidus est: matura suppuratio est: eaq; ubi vel per ipsa medicamenta, vel etiã ferro aperta est: pus debet emitti. Tum si qua in alis vel inguinibus sunt: sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoq; partibus, si una plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, æq; linamenta supernacua sunt. In reliquis parce tamen: nec, nisi plaga est, imponi debent. Commode uero vel super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle, aut malicarium ex uino coctum. Quæ & per se, & mixta idonea sunt. Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malua contrita: uel faenigræci lini uel semen ex passo coctum super dandum est. Quicquid deinde impositum est, non astringi sed modice deligari debet. Illo neminẽ decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam: conueniunt, quæ in uulneribus exposita sunt.

signa iã facti humoris.

Curatio. 2.

De fistulis & earum generibus, & curationibus.

Onnunquam autem ex eiusmodi abscessibus, & ex alijs ulcerum generibus fistulæ oriuntur. Id nomen est ulcero alto: angusto: collo. Fit in omni ferè parte corporis: habetq; quedam in singulis locis propria: prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem aliæ breues sunt: aliæ altius penetrant, aliæ rectæ intus feruntur, aliæ multoq; plures transuersæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplices uel ab uno ore intus orse: quæ tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur: aliæ rectæ: aliæ flexæ, & tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa: aut cartilaginem penetrant, aut ubi neutrum horum subest: ad interiora perueniunt. Aliæ deinde facile, aliæ cum difficultate curantur. Atq; etiam quedam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem, adiuuatq; ipsum corpus si iuuenile: si firmum est. Inimica, contraria his sunt. Itemq; si fistula os uel cartilaginem, uel neruum, uel musculos læsit: si articulum occupauit: si uel ad uescicam, uel ad pulmone, uel ad uulnam, uel ad grandes uenas, arterias uel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem penetrauit. Ad intestina quoq; eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit: si corpus uel ægrum, uel senile, uel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fi-

fistula quid?

Cum expedita i
fistula qualis?

stulam conuenit: ut quo tendat & quam alte perueniat, scire possi-
 mus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit. quod extracto spe-
 cillo patet. Si uero os in uicino est, id quod disci potest: si iam nec ne
 eo fistula penetravit, quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod ulti-
 mo specillo contingitur: intra carnem adhuc uitium est. Si magis id
 renitatur, ad os uentum est. ibi deinde si labitur specillum, nondum
 caries est. si non labitur, sed aequali inmititur: caries quidem, uerum
 adhuc leuis est. Si inaequale quoque et asperum subest: uehementius os
 exesum est. At cartilago ubi subhaesit, ipsa sedes docet: peruenitque
 esse ad eam ex renixu patet. Sed ex his quidem colliguntur fistula-
 rum sedes, spatia, noxae. Simples uero haec sint, an in plures partes
 diducantur: cognosci potest ex modo puris: cuius si plus fertur, quam
 quod simplicia spatio conuenit: plures sinus esse manifestum est. Cumque
 ferè iuxta sint, caro, & nervus, & aliqua nervosa: quales ferè tunicae,
 membranaeque sunt: genus quoque puris docebit, num plures sinus intus
 diuersa corporis genera perroserint. si quidem ex carne pus leue, al-
 bum, copiosius fertur. At ex nervoso loco: coloris quidem eiusdem,
 sed tenuius, & minus. Ex nervo, pingue & oleo non dissimile. Denique
 etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae pene-
 trarint: quia saepe cum quis aliter decubuit: aliterque membrum collo-
 cauit: pus ferè, quod iam desierat, iterum inapit: testaturque non solum
 aliud sinum esse ex quo descendat: sed etiam in aliam corporis partem
 eum tendere. Sed si & in carne & recens, & simplex est: ac neque
 rugosa, neque caua sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se
 immobile, non nisi cum toto corpore mouetur: satis proficiet empla-
 strum, quod recentibus uulneribus imponitur: dum habeat uel sale,
 uel alumen, uel squamam aeris, uel aeruginem, uel ex metallicis aliquid.
 ex quo: eo collirium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo ple-
 nius. Idque ea parte qua tenuius est: altera antecedente demitti oportet
 in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. quae in omnibus fistula-
 rum collirijs perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in lintolo su-
 perimponendum: superaque iniicienda spōgia est in acetum ante demissa.
 soluique quinto die satis est. genusque uictus adhibendum est: quo car-
 nem ali docui. Ac si longius a praecordiis fistula est: ex intervallo ieiunium
 radículas edisse: deinde uomere necessarium est. uetustate callo-
 sa sit fistula. Callus autem neminem fallit, quia durus est: & aut al-
 bus, aut pallidus. sed tum ualidioribus medicamentis opus est. Qua-
 le est, quod habet papaueris lacrymae. P. XI. gummi. P. XIII. cadmeae
 P. XIII. atramenti sutorij. P. XVIII. Ex quibus aqua coactis colliri-
 um fit. aut in quo sunt gallae. P. XI. aeruginis, sandaracae, aluminis

Callus

egyptij, singulorum. P. XI. atramenti sutorij combusti. P. XII. aut quod constat ex chalcitide, & saxo calcis quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est: adiicitur. eaq; melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, æruginis rase. P. XII. conterere: deinde ammoniac, thymamatis. P. XII. aceto liquare: eoq; infuso ex ærugine colligere. idq; ex primis medicamentis est. sed ut hæc maxime effectus sunt: sic cui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis prodere: aut quibus hæc maxime in effectum sunt, erodere. Satiusq; est uel papyrū intortum, uel aliquid ex penicillo in modum collirij astrictum eò illinere. ~~folia~~ quocq; cocta, & mixta cum calce callum exest. si quando uero longior & transversa fistula est: demisso specillo contra principium huius incidi commodissimum est: & collirium utrumq; demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multiplicem existimamus, sic tamen ut brevis, intraq; carne sit: collirio uti non debemus: quod unam partem curet: reliquas omittat. sed eadem medicamenta arida in calamentum scriptorium coniicienda sunt: isq; ori fistulæ aptandus: inspirandumq; ut ea medicamenta intus compellantur. aut eadem ex uino liquanda. vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callosior, ex aceto sunt: atq; intus infundendum quicquid inditum est. superponenda sunt quæ refrigerent, & reprimant. nam ferè quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neq; alienum est ubi quis resoluuerit, anteq; rursus alia medicamenta coniiciat: per oricularium clysterem fistulæ eluere. si plus puris fertur, uino. si callus durior est, aceto. si iam purgatur, mulso, uel aqua, in qua eruum coctum sit sic, ut huic quoq; mellis paulum adiiciatur. Ferè uero fit, ut ea tunica quæ inter ferrumentum, & integram carnem est, uicta medicamentis tota exeat: infraq; ulcus purum sit. quod ubi contigit, imponenda glutinantia sunt: præcipueq; sponsa melle cocto illita. Neq; ignoro multis placuisse linamentum in modum collirij compositum, tinctum melle demitti. sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neq; uerèdum est ne purum corpus puro corpori iunctum, non coeat: adiectis quoq; medicamentis ad id efficacibus: cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus: sanescendo in unum eos iungat.

De melicera.

St etiam ulceris genus: quod à faui similitudine ~~men~~ uenit: à græcis nominatur: idq; duas species habet. Alterum subalbidum fœruculo simile, sed maius, et cum dolore maiore. quod ubi maturescit, hêt foramina, p quæ fertur humor glutinosus, et

*Vini
aceto
Mulso
uino
Ald.*

LIBER

purulentus. Nec tamen ad iustam maturitatem peruenit. Si diuisum est, multo plus intus corrupti, quam in furunculo apparet, altiusq; descendit. Raro fit nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus emicans, durum, latum subuiride, subpallidum, magis exulceratum. Si quidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt: per quæ fertur humor glutinosus subpallidus: crassitudinem mellis aut visci referens: interdum olei. Si inciditur, uiridis intra cæro apparet. Dolor autem & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoq; febrem mouere consuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est: recte imponitur & ficus arida, & lini semen quod in uino coctum: & emplastra, ac malagmata materiam eductentia: aut quæ proprie huc pertinentia supra posui. Super alterum, & ea medicamenta & farina ex mulso cocta sic, ut ei dimidium resinæ terebinthinæ miscatur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & unæ taminie pars quarta fico adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt: totum ulcus usq; ad sanam carnem excidi oportet, & ulcere ablato super plagam medicamenta danda sunt: primum quæ pus citent: deinde quæ purgent: tum quæ impleant.

De acrochordone & Thymio, & Myrmecio, & Clauo, curationibusq; eorum.

1 **S**unt quædam uero uerrucis similia: quorum diuersa nomina ut uicia sunt: ἀκροχορδωνά græci uocant ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius coloris eiusdem: infra tenue: ad cutem latius: idq; modicum est: quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur: sed ferè plura, maximèq; in pueris, eaq; nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At thymion nominatur, quod super corpus quasi uerrucula eminet, ad cutem tenue: supra latius, subdurum, & in summo perasperum. Idq; summum colorem floris thymi representat. Vnde ei nomen est. Ibiq; facile finditur & eruentatur, nonnunquam aliquantum sanguinis fundit: ferèq; circa magnitudinem fabæ ægyptiæ est: raro maius: interdum per exiguum: modo unum, modo autem plura nascuntur, uel in talis, uel palmis, uel inferioribus pedum partibus. Pessima tamè in obscœnis sunt: maximèq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem uocantur, humiliora thymio durioraq; quæ radices altius exigunt, maioremq; dolorem mouent: infra lata: super autem tenuia: minus sanguinis mittunt: magnitudine uix unquam lupini modum

4
 pini modum excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam quidem etiam alibi: sed in pedibus tamen maxime nascitur: præcipue tamen ex contuso: quamvis interdum aliter, doloremque etiam, si non alias: tamen ingredienti mouet. ex his acrochordon: siue thymium sæpe etiam per se finiuntur: et quo minora sunt: eò magis Myrmecia et clauus sine curatione uix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. Thymio, clauoque excisis subter rotunda radícula nascitur: quæ penitus descendit ad carnem, eaque relicta idem rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inheret: ideoque ne excidi quidem sine exulceratione magna possunt. Clauum subinde deradere commodissimum est. Nam sine ulla ui sic emollescitur: ac si sanguinis quoque aliquid emissum est: sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circum purgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulueris paulum: quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera uero genera medicamentis adurenda sunt. Alijsque id quod ex fecæ uini, myrmecijs id quod ex alumine, et sandaraca fit: aptissimum. Sed ea: quæ circa sunt: folijs contegi debent: ne ipsa quoque exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus, et earum curationibus.

1
 Pustulæ maxime uernis temporibus oriuntur: earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus, partemue aspreto quædam fit similis his pustulis: quæ ex urtica, uel ex sudore nascuntur. et *ἔκταρα* uero græci uocant: eaque modo rubet: modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures similes uariis oriuntur, nonnunquam maiores pustulæ linidæ, aut pallidæ, aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato: subestque his humor. Vbi hæruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet *φλυκταῖνα* græce nominatur. sunt uel ex frigore, uel ex igni, uel ex medicamentis. Pseudiaction autem paulo durior, pustula est subalbida: acuta ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis uero nonnunquam etiam ulcera sunt, aut aridiora, aut humidiora, et modo tantum cum prurigine, modo etiam cum inflammatione aut dolore, Exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id euenit in ætate puerili, raro in medio corpore: sæpe in eminentibus partibus. Pessima pustula est: quæ *ἐπιρρυτὶς* uocatur. Ea colore uel sublinida, uel subnigra, uel alba esse consuevit. Circa hanc autem uehemens inflammatio est, et cum ad aperta

Aurelij Cor.

m

LIBER

est: reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est. Neque enim ea, faba maior est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus: et ferè nocturnum. Unde nomen quoque à græcis ei ἐπιπρωκτὶς impositum est. In omni uero pustularum curatione primum est, multum ambulare atque exerceri. si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuire: abstinere ab omnibus acerbis et extenuantibus: eademque nutrices facere oportet: si lactens puer ita affectus est. Præter hæc: is, qui iam robustus est: si pustulæ minuscule sunt: desudare in balneo debet, simulque super eas nitrum inspergere: oleoque unum miscere: et sic ungi. Tum descendere in solium. si nihil sic proficiatur, aut si maius pustularum genus occupauit: imponenda lenticula est: detractaque summa pellicula: ad medicamenta lenia transeundum. ἐπιπρωκτὶς post lenticulam recte herba quoque sanguinali, uel uiridi coriandro curatur. Ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fæni græci mixta sic, ut his inuicem rosa atque intubi suauis adiungatur: donec mellis crassitudo fiat. Proprie ad eas pustulas: quæ infantes male habent: lapidis: quem πυριτιν uocant P. XVIII. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adiungunturque olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustula debent: tum hoc illini.

De scabie, et eius curatione.

Scabies uero est humor cutis rubicundus: ex qua pustulæ oriuntur: quædam humidiores, quædam sicciores. Exit ex quibusdam sanies, fitque ex his continue exulceratio prurienti: ferpitque in quibusdam cito. Atque in alijs quidem ex toto desinit: in alijs uero certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaque eam: quæ talis est, ἀσπίς, idest scabie græci appellant. In hac quoque uictus ratio eadem: quæ supra necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est: quod fit ex spodio, croci, æruginis, singulorum P. XI. piperis albi: omphacii: singulorum P. XI. cadmeæ P. XVIII. Aut ubi iam exulceratio est: id quod fit ex sulphuris P. XI. ceræ P. XIII. picis liquidæ hemina: olei sextarijs duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum authorem refertur. Habet hoc farina lupinorum sextarium: nitri cyathos quattuor: picis liquidæ heminam: resinæ humidæ selibram: aceti cyathos tres. Crocum quoque licium, ærugo, myrrha, cinis æquis portionibus recte miscentur, et ex passo coquantur. Idque omnem pituitam ubique sustinet. At si nihil aliud

est, amittat ad tertiam partē decocta, uel sulphur pice liquida mixtū
sicut in pectoribus proposui: hominibus quoq; scabie laborantibus opi-
tulantur.

*vel sulphur a
manus & lno.*

De impetiginis speciebus & curationibus.

Impetiginis uero species sunt quattuor. Minime mala est,
quæ similitudine scabiem representat. Nam & rubet &
durior est, & exulcerata est & roditur. Distat autem ab ea
quia magis exulcerata est, & uariis similes pustulas habet, uideturq;
esse in ea quasi bullulæ quædam ex quibus interposito tempore squa-
mulæ resoluntur: certioribusq; hoc temporibus reuertitur. Alterum
genus peius est simile papulæ ferè: sed asperius, rubicundiusq;: figu-
ras uarias habens. Squamulæ ex summa cute discedunt: roseo maior
est: celerius & latius procedit: certioribusq; etiam nonnunquam pri-
or temporibus & fit et desinit: rubrica cognominatur. Tertia etiam
num deterior est. Nam & crassior est, & durior, et magis tumet: in
summa cute finditur: & uehementius rodit. Ipsa quoq; squamosa, sed
nigra procedit: & late & tarde eminus serpit. In temporibus, aut
oritur, aut desinit, neq; ex toto tollitur: nigra cognomen est. Quartum
genus est, quod curationem omnino non recipit: distans colore. Nam
subalbidum est & recenti cicatrici simile, squamulasq; habet palli-
das, quasdam subalidas, quasdam lenticulæ similes. quibus demptis
nonnunquam profluit sanguis. Alioquin uero humor eius albidus est,
cutis dura atq; fissæ est, proceditq; latius. Hæc uero omnia maximo
genera oriuntur in pedibus et manibus, atq; ungues quoq; infestant.
Medicamentum non aliud ualentius est, quam quod ad scabiem quoq;
pertinere sub authore. Protarcho retuli. Serapion autem nitri. P. XII.
sulphuris. P. XIII. exapiebat resina copiosa, eoq; utebatur.

Serapion.

De papulis, & earum curatione.

Papularum uero duo genera sunt. Altera est, in qua per mi-
nimas pustulas cutis exasperatur & rubet, leuiterq; rodi-
tur: medium habet pauxillo lenius: tarde serpit, idq; uitiū
maxime rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit. Alte-
ra autem est, quam ἀρτίαν, græci appellant. In qua similiter qui-
dem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturq; ac uehementius
& roditur & rubet: interdum etiam pilos remittit. Quæ minus
rotunda est: difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginē uertitur:

m ij

sed leuis papula, etiam si ieiuna salina quotidie defricatur: sanescit. Maior commodissime murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Vt uero ad composita medicamenta ueniamus, idem illud Protarchi tanto ualentius in his est, quanto minus in his uitij est: alterum ad idem Myronis: nitri rubri, thuris, singulorum. P. XI. cantharidum purgatum. P. XII. sulphuris ignem non experti tantundem, resinae terebinthinae liquidae. P. XXX. farinae lolij sext. iij: githiathos tres: pias cyndae sext.

De uitilignis speciebus, idest de Alpho & Mela, et leuce, & earum curatione.

Uitiligo quoque, quamuis per se nullum periculum affert: tamen foeda est, & ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. alphas uocatur, ubi color albus est fere subasper et non continuus, ut quaedam quasi guttae dispersae esse uideantur. Interdum etiam latus, & cum quibusdam intermissionibus serpit. melas colore ab hoc differt: quia niger est, & umbrae similis. Caetera eadem sunt. alium habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, & altius descendit, in eaque albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia haec serpunt. sed in alijs celerius, in alijs tardius. Alphos & Melas in quibusdam uarijs temporibus & oriuntur, & desinunt. Leuce quae occupauit: non facile dimittit. Priora curationem non difficillimam recipiunt: ultimum uix unquam sanescit: ac si quid ei uitio deceptum est: tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi. Si sanguis exit: quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est. Si humor albidus, sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id uero: quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure & thure sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem: quod ad Hirenium auihorē refertur. Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur adiecto aceto. His in sole uitiligo perungitur: deinde non ita multo post: ne nimis erodatur: eluitur. Proprie quidem Myrone auihore eos: quos alphas uocari dixi, hoc medicamento perungunt. sulphuris. P. p. Z. aluminis scissilis. P. p. Z. nitri. P. XIII. myrti radice contrita acetabulum miscent: deinde in balneo super uitilignem inspergunt farinam ex faba: tum haec inducunt. Hi uero, quos melanas uocari dixi: curantur: cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo ante sudorem insperguntur: tum genus id uitilignis defricatur.

LIBER SEXTVS.

De vitijs singularum corporis partium. Cap. I.

De capillis fluentibus.

Ixi de his vitijs, quæ per totum corpus orientia: medicamentorum auxilia desiderat. nunc ad ea veniam, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem sæpe radendo succurritur. adiicit enim vim quædam ad continendum ladanum cum oleo mixtum. nunc de his capillis loquor, qui post morbum ferè fluunt. nã quo minus caput quibusdã ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

Aurelij Cor.

De porrigine & eius curatione. Cap. II.

Orrigo autem est ubi inter pilos quædam quasi squamulæ surgunt, eæq; à cute resolvuntur, & interdù madent: multo sæpius siccæ sunt. Idq; euenit modo sine ulcere, modo ex ulcerato loco: huic quoq; modo malo odore, modo nullo accidente: ferèq; id in capillo fit, rarius in barba: aliquando etiam in superalio. ac neq; sine aliquo corporis vitio nascitur, neq; ex toto inutile est. nam bene integro capite non exit. Vbi aliquid in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi: quàm id quod nocet in aliam partem magis necessariam uerti. Commodius est ergo subinde pectendo repurgare: quàm id ex toto prohibere. si tamen ea res nimium offendit: quod humore sequente fieri potest, magisq; si id etiam mali odoris est, caput sæpe radendum est, dein id super adiuvandum aliquibus ex leuiter reprimentibus: quale est nitrum cum aceto, uel ladanum cum myrteo uino, uel myrobalanum cum uino. Si parum per hæc proficitur uehementioribus uti licet, cum eo, ut sciamus utiq; in recenti vitio id inutile esse.

De sycofi & eius curatione. Cap. III.

St etiam ulcus, quod à fici similitudine σύκοις à græcis nominatur. caro excrescit: & id quidem generale est. sub eo uero duæ species sunt. alterum ulcus durum & rotundum est, laterum humidum & inæquale. ex duro exiguum quiddam &

Aurelij Cor.

m iij

LIBER

glutinosum exit: ex humido plus, & mali odoris. Fit uero utrunq; in his partibus, quæ pilis conteguntur: sed id quidem, quod callosum & rotundum est, maxime in barba. Id uero quod humidum, præcipue est in capillo. Super utrunq; oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctum, aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum: terra quoq; erithrea ex aceto liquata recte illinitur.

De Arcis & earum curationibus. Cap. IIII.

Rearum quoq; duo genera sunt. commune utriq; est: quod emortua summa pellicula, pili primum extenuantur: dein de excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus et mali odoris, increscitq; utrunq; in alijs celeriter, in alijs tarde. Peius est quod densam cutem & subpinguem, & ex toto glabram facit: sed ea quæ ἀλωπεία nominatur sub qualibet figura dilatatur, fit et in capillo & in barba. Id uero quod à serpentis similitudine ὀφρύων appellatur: incipit ab occipito: duorum digitorum latitudinem non excedit: ad aures duobus capitibus serpit: quibusdam etiam ad frontem: donec se duo capita in priorem partem committant. Illud uitiū in qualibet ætate est: hoc ferè in infantibus. Illud uix unquam sine curatione: hoc per se sæpe finitur. quidam hæc genera arcarū calpello exasperant. quidam illinunt adurētia ex oleo, maximq; chartam combustam. quidam resinam terebinthinam cum taspia inducunt. sed nihil melius est, quàm nouacula quotidie radere: qua cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorū radiculæ. neq; ante oportet desistere, quàm frequentem pilū nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur: illini atramento scriptorio satis est.

De Varis, et Lenticulis, & Ephelide, & eorū curationibnt. Cap. V.

enè ineptiæ sunt: curare Varos, et Lenticulas, & Ephelidas. sed eripi tamen foeminis cura cultus sui non potest. Ex his autem quas supra proposui, vari, lenticulæq; uulgo notæ sunt: quamuis rarior ea species est, quàm ἑλὺς uero à plerisq; igno-
ratur: quæ nihil est: nisi asperitas quædam & durities mali coloris. cætera non nisi in facie, Lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. de qua per se scribere alio loco uisum operæ præcium non est. sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, cui nō mē-

nus quàm ipsa est: aluminis, scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum et nitrum, cum pares portiones habet, contritaq; ex aceto sunt: donec ad mellis crassitudinem uenerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis mane eluendū est: oleoq; leuiter unguendum. Ephediden tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia uero ista atq; etiā ad colorandas acutrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, crocomagmatis, cretæ amoliæ subcerulæ, nucum amara um, farinæ hordei atq; erui, struthi aibi: sertula campanæ seminis. quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquantur, illuntq; à uespere usq; mane eluuntur.

De oculorum morbis, curationibusq; eorum: & primo de his morbis qui lenibus medicamentis curantur. Cap. VI.

Ed hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus uero et uarijs casibus oculi nostri patitur. qui cum magnam partem ad uitæ simul & usum & dulcedinem conferant: summa cura tuendi sunt: protinus autem orta lippitudine quædam notæ sunt: ex quibus quid euenturum sit: colligere possimus. nam simul & lacryma, & tumor, & crassa pituita cœperint, si ea pituita lacrymæ mixta est: & ea lacryma calida est: pituita uero alba & mollis, tumor non durus: longæ ualeitudinis metus non est. at si lacryma multa & calida: pituita paulum, tumor modicus: idq; in uno oculo est: longum id, sed sine periculo futurum est. idq; lippitudinis genus minime cum dolore est, sed uix ante uigesimum diem tollitur: nonnunq; per duos menses durat: sed quandoq; finitur. si pituita alba et mollis esse incipit, lacrymæq; miscentur, aut si simul hæ utrunq; oculum inuaserunt: potest esse breuior, sed periculum ulcerum est. pituita autem si arida dolorem quidē mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit. tumor magnus si sine dolore est & siccus, sine ullo periculo est. si siccus quidem: sed cum dolore est, ferè exulcerat, & nonnunq; ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris, pupillis'ue est: ubi super magnum dolorem lacrymæ salæ, calidæq; eunt, aut etiam si timore infinito diu lacryma cum pituita profluit. peius etiam nunc est, ubi pituita calida, aut liuida est, lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit: nocturna uigilia urget. siquidem sub his oculis plerunq; rumpitur: notumq; est, ut tantum exulceretur. In-

m iij

Mel amara

oculus

tus ruptum oculum febricula inuat. Si foras iam ruptus procedit: si-
ne auxilio est: si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. at
si asperum, crassum est: etiam post curationem uestigium aliquod re-
linquit. *Curari* uero oculos sanguinis detractione, medicamento, bal-
neo, uino uetustissimus auctor Hippocrates memoriae prodidit. sed
eorum tempora & causas parum explicuit. In quibus medicinae sum-
ma est. neq; minus in abstinentia & alui ductione saepe auxilij est.
Hos igitur interdum inflammatio occupat: ubi cum tumore in his do-
lor est, sequiturq; pituitae cursus nonnunquam copiosior uel acrior:
nonnunq; utraq; parte moderatior. In eiusmodi casu prima omnium
sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet,
sic ut a sermone quoq; absteat. nullum cibum assumere: si fieri po-
test ne aquam quidem: sin minus, certe quam minimum eius. Quod
si graues dolores sunt: commodius secundo die: si tamen res urget: etiā
primo sanguis mittendus est: utiq; si in fronte uenae tumunt, si firmo
corpori materia superest. si uero minor impetus, minus acrem cura-
tionem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertio uel die ducti oportet.
At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. Sa-
tisq; est uti quiete & abstinentia. Neq; tamen in lippientibus longum
ieiunium necessarium est: ne pituita tenuior atq; acrior fiat. sed secū-
do die dari debet id quod lenissimum uideri potest ex his, quae pitui-
tam faciunt crassiores: qualia sunt oia sorbilia. Si minor uis urget:
pulticula quoq; aut panis ex lacte. Insequentibusq; diebus quantum
inflammationi detrahatur: tantum adijci cibis poterit. sed generis eius-
dem: utiq; ut nihil salsum, nihil acre, nihil ex his: quae extenuant, su-
matur: nihil potui praeter aquam. Et uictus quidem ratio talis: ma-
xime necessaria est. Protinus autem prima die. croci. P. XI. & farinae
candidae quam tenuissimae. P. XII. excipere oportet ovi albo: donec mel-
lis crassitudinem habeat: idq; in linteolum illinere & fronti agglu-
tinare, ut compressis uenis pituitae impetum cohibeat. si crocum non
est, thus idem facit: Linteolo an lana excipiat: nihil interest. Super
imungit uero oculi debent: sic ut croci quantum tribus digitis compre-
hendi potest: sumatur: myrrhae: ad fabae: papaueris lacrymae ad len-
ticulae magnitudinem. eaq; cum passo conterantur, & specillo super
oculum inducatur. Aliud ad idem: Myrrhae. P. XI. Mandragorae suc-
ci. P. XII. papaueris lacrymae. P. XII. foliorum rosae, acutae seminis:
singulorum. P. XIII. acaciae. P. XIII. gummi. P. XVIII. Et haec qui-
dem interdum. noctu uero: quo commodior quies ueniat: non alienum
est superimponere candidi panis interiorem partem ex uino suba-
ctam. Nam & pituitam reprimi: & siquid lacrymae prociessit, ab-
sorbet,

notandum est hoc diem
et si prius erat

hinc hinc
uenerunt

forbet: & oculum glutinari non patitur. Si graue id et durum propter magnum oculorum dolorem uidetur: oui & album & vitellus in uas disfundendum est, adiiciendumq; eò mulsi paulum: idq; digito permiscendum. Vbi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene apta. quæ id excipiat, superq; oculos imponi. Ea res & leuis est: & refrigerando pituitam coercet, & non exarescit, et glutinari oculum non patitur. Farina quoq; hordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta commode imponitur. neq; ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum uti expresso: si leuior impetus est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fasciæ deliganda sunt, ne per somnam cadant, et hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso commode potest, et cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat: eorum aliquid dandum est: quæ ἀνὰ δ' ὕπνου græci uocant. satisq; est puero, quod erui, uiro, quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum uero oculum primo die, nisi modica inflammatio est, nihil recte coniicitur. sæpe enim potius concitatur eò pituita, quàm mitigatur. A secundo die graui quoq; lippitudini per indita medicamentum recte succurritur, ubi uel iam sanguis missus, uel alius ducta est, aut ubi neutrum necessarium esse manifestum est.

De diuersis oculorum collirijs.

Ultæ autem, multorumq; auctorum colliria ad id apta sunt: nouisq; etiam nunc mixturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modice reprimentia facile et uarie miscantur. Ergo nobilissima exequar.

Philonis collirium.

St igitur Philonis quod habet cerussæ elotæ: spodij, gummi, singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ combustæ. P. XI. Illud scire oportet, hic quoq; omnia medicamenta, singula primum per se teri: deinde mixta iterum adiecta paulatim, uel aqua, uel alio humore: gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstare, ut ubi colliria facta inaruerunt, glutinata sint, neque fricantur.

Dionysij collirium.

Dionysij uero collirium est, papaueris lacrymæ combustæ donec tenerescat. P. XI. thuris combusti, gummi: singulorum. P. XII. spodij. P. XIII.

LIBER

Cleonis collirium.

Leonis nobile admodum: papaueris lacrymæ frictæ. P. XI. croci. P. XI. gummi. P. XI. quibus cum teruntur: adyctur rose succus. aliud eiusdem valentius: squamæ æris quod sômuæ appellant. P. XI. croci. P. XII. spodij. P. XIII. plumbi et eloti et combusti. P. XVI. gummi tantundem. eius aliud quoque idem est: maxime ubi multa piruita profluit. castorei. P. XX. aloes. P. XL. croci. P. XXI. myrrhæ. P. XII. lycij. P. XIII. cadmiæ curatæ. P. XVIII. sibi tantundem: acaciæ succi. P. XII. quod cum gummi misceat id quod habet liquidum in pixidecula seruatur. Theodotus uero huic compositioni adiecit papaueris lacrymæ combusti. P. X. æris combusti et eloti. P. XII. nucleos palmarum combustos numero. XX. gummi. P. XII.

Theodoti collirium, Acharistum appellatum.

Ipse Theodoti, quod à quibusdā Ἀχαρίστου nominatur: eiusmodi est. castorei: nardi indicæ: singulorum. P. XI. lycij. P. XII. papaueris lacrymæ tantundem: myrrhæ. P. XII. croci, cerussæ elotæ: aloes, singulorum. P. XIII. cadmiæ, botryodis elotæ æris combusti singulorum. P. XVIII. gummi. P. XVIII. acaciæ succi. P. XXX. sibi tantundem: quibus aqua pluvialis adyctur.

Cythion, uel tephron collirium.

Æter hæc ex frequentissimis collirijs est id quod quidam κυθίων: quidā à cinereo colore τέφρον appellant: amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ. P. XII. cerussæ elotæ. P. XVIII. spumæ elotæ. P. XXIII. quæ æque ex aqua pluviali conteruntur.

Euelpidis collirium, trygodes nominatum.

Euelpides autem, qui ætate nostra maximus fuit oculus medicus utebatur eo, quod ipse composuerat: τρυγώδης nominabat. castorei. P. XII. lycij, nardi, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. croci, myrrhæ, aloes, singulorum. P. XIII. æris combusti. P. XVIII. cadmiæ et sibi: singulorum. P. XII. acaciæ succi. P. XXXVI. gummi tantundem. quo grauior uero quæque inflammatio est: cō magis leniri medicamentum debet, adiecto uel albo oui, uel melle.

liebri lacte. at si neq; medicus, neq; medicamentum præsto est, sæpius
 utrunlibet horum in oculis peni. allo ad id ipsum facto infusum, id ma-
 lum lenit. Vbi uero aliquis releuatus est: iamq; cursus pituitæ consti-
 tit: reliquias fortasse leniores futuras discutiunt balneum, & uinum.
 Igitur lauari debet leniter ante ex oleo perfrictus, diutiusq; in cru-
 ribus & feminibus, multa; calida aqua fouere oculos: deinde per
 caput prius calida, tum egelida perfundi, à balneo cauere ne quo fri-
 gore afflatu ue lædatur. post hæc cibo paulo pleniore, quàm ex eorū
 dierum consuetudine uti, uitatis tamen oibus pituitam extenuantibus.
 uinū bibere lene: subausterū, modice uetus, neq; effuse, neq; timide,
 ut neq; cruditis ex eo, & tamen somnus fiat, lenianturq; intus laten-
 tia acria. Sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum perturba-
 tionem, quàm attulerat: quod incidere his solet: qui manente adhuc
 pituitæ cursu, festinarunt, quàm primū discedere debet: nihil eo die
 uini assumere: cibi minus etiam quàm pridie. deinde cum primum
 satis pituita substitit, iterum ad usum balnei redire. Solet tamen eueni-
 re nonnunquam siue tempestatum uitio, siue corporis, ut pluribus die-
 bus neq; dolor, neq; inflammatio, & minime pituitæ cursus finiatur.
 quod ubi incidit, iamq; ipsa uetustate res matura est, ab his hisdem
 auxilium petendum est: id est balneo ac uino. hæc enim ut in recen-
 tibus malis aliena sunt: quia concitare ea possunt & accendere, sic in
 ueteribus, quæ nullis alijs auxilijs cesserunt: admodum efficacia esse cō-
 suerunt. uidelicet hic quoq; ut alibi, cum secunda uana fuerint con-
 trarijs adiuantibus. Sed ante tonderi ad cutem conuenit. deinde in
 balneo aqua calida q̄ plurima caput atq; oculos fouere: tum utrunq;
 peni. allo detergere, & ungere caput irino unguento, continereq; in le-
 ctulo se, donec omnis calor qui conceptus est finiatur, desinatq; sudor,
 qui necessario in capite collectus est. tum ad idem cibi uiniq; genus ue-
 niendum sic, uti potiones meracæ sint: obtegendumq; caput & quie-
 scendum. sæpe enim post hæc grauis somnus, sæpe sudor, sæpe alui
 deiectio pituitæ cursum finit. Si leuatum malum est, quod aliquanto
 sæpius fit: per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas re-
 stituatur. si diebus hisdem aluus nihil reddit: ducenda est: quo magis
 superiores partes leuentur. Nonnunq̄ autem ingens inflammatio tan-
 to impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat: proprie enim ὀφθαλ-
 μος id, quoniam oculi prociunt, græci appellant. His utiq; si uires pa-
 tiuntur, sanguinē mitti: si id fieri non potest, aluum duci, longioremq;
 in diem indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis
 est. Ideoq; Cleonis collirio quidam, quod ex duobus ante positum est:
 utuntur. Sed optimum est Nilei. neq; de ullo magis inter omnes auc-
 ctiores conuenit.

LIBER

Nilei collirium omnium optimum.

D habet nardi india, papaueris lacrymae, singulorum. **P**
XI. gummi. **P.** **XI.** croci. **P.** **XII.** foliorum rosae recentium. **P.**
XIII. quae uel aqua pluuiatili, uel uino leni subaustero
 coquantur. Neq; alienum est malicorium, uel fertulam campanam ex
 uino coquere, deinde conterere: aut myrrham nigram cum rosae folijs
 miscere, aut hyoscyami folia cum oui cocti uitello, aut farinam cum
 acaciae succo, uel passo, aut mulso. quibus si folia quoq; papaueris adij-
 ciuntur, aliquanto ualentiora sunt. Horum aliquo preparato penicil-
 lo fouere oculos oportet ex aqua calida expresso: i qua ante mel myr-
 ri, uel rosae folia decocta sint. deinde ex illis aliquid imponi. praeter
 haec ab occipito in asa cute cucurbitula admouenda est. Quod si per
 haec restitutus oculus in sedem suam non est: eodemq; modo prolapsus
 permanet: scire oportet lumen esse amissum. deinde futurum ut in a-
 rescat is, aut in pus uertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo
 qui propior tempore est: incidi oculus debet: ut effuso pure et inflam-
 matio ac dolor finiatur: et intus tunicae residat quo minus foeda postea
 facies sit. Utendum deinde uel hisdem collirijs est ex lacte, aut ouo
 uel croco, cui album oui misceatur. Ac si induruit et sic mortuus
 est, ne in pus uerteretur: quatenus foede prominebit excidendum erit:
 sic ut hamo summa tunica apprehendatur, infra id deinde scalpel-
 lus incidat: tum eadem medicamenta erunt coniicienda: donec omnis
 dolor finiatur. Hisdem medicamentis in eo quoq; oculo utendum est:
 qui primum procidit: deinde per plura loca fissus est.

De carbunculis oculorum, et eorum curatione.

Olent etiam carbunculi ex inflammatione nasci: nonnunq;
In ipsis oculis, nonnunq; in palpebris: et in his ipsis ocu-
 lis modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu aliud
 ducenda est: cibus minuendus: lac potui dandū, ut acria quae laeserunt:
 leniatur. Quod ad cataplasmata et medicamenta pertinet: his uten-
 dum, quae aduersus inflammationes proposita sunt. Atq; hic quoq; Nilei
 collirium optimum est. si tamen carbunculus in exteriori palpebrae
 parte est, ad cataplasmata aptissimū est lini semen ex mulso coctum:
 aut si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum, et curatione earum.

Pustulae quoq; ex inflammationibus interdum oriuntur:
 quod si inter initia protinus incidit: magis etiam seruanda
 sunt quae de sanguine et quiete supra posui. sin serius quam ut sanguis

mitti possit: alius tamen ducenda est. si id quoque aliqua res inhibet, utique uictus ratio seruanda est. medicamentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei: quale Cleonis est.

φιλανθοῦς collirium ad pustulas oculorum.

Id quoque: quod philalethos uocatur: huic aptum est. Myrrhæ, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. plumbi eloti, terræ samie, quæ ἀσπὴρ uocatur: tragaethæ: singulorum. P. XIII. sibus costii, amyli: singulorum. P. XVI. spodij eloti, cerussæ elotæ, singulorum. P. XVIII. Quæ aqua plumbiutili excipiuntur. Vnus collirij, uel ex ouo, uel ex lacte est.

De ulceribus oculorum, & eorū curatione, & de διαβαλάνος collirio.

X pustulis ulcera interdum fiunt, ea quæ recentia æque lenibus medicamentis nutrienda sunt, & hisdem ferè quæ supra in pustulis posui. Fit quoque proprie ad hæc quod διαβαλάνος uocatur. Habet æris combusti, & eloti papaueris lacrymæ frictæ: singulorum. P. XI. spodij eloti, thuris, sibus combusti & eloti, myrrhæ gummi, singulorum. P. XII.

Curatio oculorum aliquo casu immutatorum.

Venit etiam ut oculi, uel ambo, uel singuli minores fiant, quam esse naturaliter debeant: Idque & acer pituitæ cursus in lippitudine efficiat, & continuati stentus, & ictus parum bene curati. In his quoque hisdem lenibus medicamentis: ex muliebri lacte utendum est. Cibus uero his, qui maxime corpus alere & implere consueverunt. Vitandaque: omnimodo causa: quæ lacrymas excitet: curaque: domesticorum: quorum etiam si quid tale inadiit: eius notitiæ subtrahendum: atque acris quoque medicamenta, et acres cibi non alio magis nomine his nocent: quam quod lacrymas mouent.

De pediculis palpebrarum.

Enus quoque uitij est: qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. Id φσιπάσιον græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat: raro non ultra procedit. Sed ferè tempore interposito pituitæ cursus acerrimus sequitur: exulceratisque uehementer oculis aciem quoque ipsam corrumpit. His alius ducenda, caput ad autem tondendū, diuque quotidie ieiunij perficiendum. His:

LIBER

ambulationibus, alijsq; exercitationibus diligenter utendum, gargarizandumq; ex mulso, in quo nepeta, & pinguis ficus decocta sit: saepe in balneo multa calida aqua fouendum caput. Vitandi acres cibi, laete uinoq; pingui utendum, bibendumq; liberalius, quam edendum est. Medicamenta uero intus quidem lenia danda sunt, ne acriorem pituitam concitent. Super ipsos uero pediculos alia, quae necare eos et prohibere: ne similes nascentur, possint. Ad id ipsum spumae natri. P. XI. sandaracae. P. XI. muae taminiae. P. XI. simul teruntur, adijciturq; uetus oleum pari portione atq; acetum donec ei mellis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & ualidioribus medicamentis curantur: & de Andree collirio, & de δια νει πατος.

h Astenus oculorum morbi lenibus medicamentis nutriuntur. Genera deinde alia sunt: quae diuersam curationem desiderant, fereq; in inflammationibus nata sunt, sed finitis quoq; his manentia. Atq; in primis in quibusdam perseverat tenuis pituita cursus: quibus alius ab inferiore parte euocanda est: demendum aliquid ex cibo: neq; alienum est illius frontem compositione Andree, Quae habet gummi. P. XI. cerussae, stibis, singulorum. P. XII. spumae argenti & coctae & elotae. P. XIII. Sed & ea spuma ex aqua pluuiali coquitur, & arida haec medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoq; super iniiciendum est ex farina, quae frigida aqua coacta sit: cuiq; aut acaciae suavis, aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoq; inciso uertice recte accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi uero eo debet, quod habet squamae aeris: papaueris lacrymae: singulorum. P. XI. ceruini cornus combustae, & eloti plumbi, eloti gummi: singulorum. P. XIII. iheris. P. XII. Hoc collirium: quia cornum habet, δια νει πατος nominatur. Quotienscunq; non adyto quod genus humoris adijciendum sit: aquam intelligi uolo.

Memigmenon Euelpidis collirium.

a D idem Euelpidis: quod μεμνιμένον nominabat. In eo papaueris lacrymae, et albi piperis singulae unciae sunt: gummi libra: aeris combustae. P. XI. Inter has autem curationes post intermissione aliquam profunt balneum & uinum. Cumq; omnibus lippientibus uitandi cibi sunt, qui extenuant, tum praecipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quae pituitam crassationem reddunt: sicut in hoc genere materiae maxime

promptum est: confugiendum est ad ea: quæ quia uentrem, corpus quoq; astringunt.

De oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, ueteribus, & de curationibus singulorum.

Tulcera, si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certe uetera esse consuevunt. Ex his supercrescentia collirio: quod *μεμικμένον* uocatur: optime reprimuntur. Sordida purgantur et eodem, ex eo, quod *σφαιριον* nominatur.

σφαιριον collirium.

h Abet æruginis. P. XIII. gummi tantundem: ammoniaci, minus sinopia: singulorum. P. XXVI. Quæ quidam ex aqua, quidam quo uehementiora sint, ex aceto terunt.

Phynon collirium Euelpidis.

i D quoq; Euelpidis, quod phynona appellabat, huic utile est Croci. P. XI. papaueris lacrymæ, gummi, singulorum. P. XII. æris combusti & eloti, myrrhæ: singulorum. P. XIII. piperis albi. P. XVI. Sed ante linium hoc, unguendum est.

sphæron collirium Euelpidis.

i D quoq; eiusdem, quod *sphæron* nominabat: eodem ualet. Lapidis hæmatitis eloti. P. XII. piperis grana sex: cadmiæ elotæ, myrrhæ, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XIII. croci. P. XIII. gummi. P. XVIII. Quæ cum uino amineo conteruntur.

Liquidum Euelpidis collirium.

l Iquidum quoq; medicamentum ad idẽ componebat: in quæ erant hæc. Eruginis. P. X. minus combusti, atramenti sutorij annamoni: singulorum. P. XIII. croci, nardi, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. myrrhæ. P. XII. æris combusti. P. XIII. canis ex odoribus. P. XIII. piperis grana. XV. Hæc ex uino austero teruntur. Deinde cum passi tribus heminis decoquuntur. donec corpus unum sit. Idq; medicamentum uetustate efficacius fit.

De cauis oculorum ulceribus, & curationibus.

c Quæ uero ulcera commodissime implent ex his quæ supra posita sunt, *sphæron*, & id quod *σφαιριον* uocatur. Idem *sphæron* uetusis ulceribus & uix ad matricem uenientibus optime succurrit.

LIBER

Hermonis collirium.

St etiam collirium, quod cum ad plura valeat: plurimum
 e tamen proficere in his ulceribus uidetur. Refertur ad her-
 monem authorem: habet piperis longi. P. XII. albi. P. XV.
 cinnamomi: costi: singulorum. P. XI. aramenti sutorij: nardi, casia, ca-
 storei: singulorum. P. XII. gallæ. P. XV. myrrhæ, croci, thuris, lycij, ce-
 russæ: singulorum. P. XVIII. papaueris, lacrymæ. P. XII. aloes: æris
 combusti, cadmiæ singulorum. P. XVI. acatiæ, stibis, gummi: singulo-
 rum. P. XXV.

De cicatricibus oculorum: quæ ex ulceribus factæ sunt: Et quomodo
 curari debeant: Et de Asclepia, et Canopite, Et Pyxino collirijs.

f Actæ uero ex ulceribus cicatrices duobus uitjs periclitan-
 tur: ne aut cæuæ, aut crassæ sint. Si cæuæ sunt, potest eas im-
 plere id, quod sphæron vocari dixi, uel id, quod asclepias
 nominatur: habet papaueris lacrymæ. P. XII. sagapeni, opopanaeis:
 singulorum. P. XIII. eruginis. P. XIII. cumini. P. VIII. piperis. P.
 XII. cadmiæ elotæ: cerussæ: singulorum. P. XVI. At si crassæ cica-
 trices sunt: extenuant uel smilion, uel Canopite collirium: quod habet
 cinnamomi, acatiæ: singulorum. P. XI. Cadmiæ elotæ, croci, myrrhæ:
 papaueris lacrymæ: gummi: singulorum. P. XII. piperis albi, thuris,
 singulorum. P. XIII. æris combusti. P. XVIII. cum aqua pluuiiali.
 uel Euelpidis Pyxinum: quod ex his constat. Salis fossilis. P. XIII.
 ammoniaci: thymiamatis. P. VIII. papaueris lacrymæ. P. XII. ce-
 russæ. P. XV. piperis albi, croci siculi: singulorum. XXXI gum-
 mi. P. XIII. cadmiæ elotæ. P. VIII. Maxime tollere cicatricem ui-
 detur id quod habet gummi. P. XII. eruginis. P. XI. croci magna-
 tis. P. XIII.

De alio genere inflammationis oculorum.

e St etiam genus inflammationis: in qua, si cui tument ac di-
 stenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti
 necessarium est: multaq; aqua calida caput, atq; oculos foue-
 re: gargarizari ex lenticula, uel ex fici cremore: inungi acerbis mudi-
 camentis, quæ supra comprehensa sunt: maximeq; eo quod sphæron
 nominatur, quod lapidem hæmatitem habet. Atq; alia quæq; utilia
 sunt, quæ ad extenuandam aspritudinem fiunt: de qua protinus di-
 cam. Hanc autem inflāmatio oculorum ferè sequitur: interdū maior,
 interdum

interdum leuior, nonnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit: deinde aspritudinem ipsam auget, fitq; ea in alijs breuis, in alijs longa, & quæ uix unquam finitur. In hoc genere ualetudinis quidam crassas, durasq; palpebras & ficulneo folio, & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt: uersaq; quotidie medicamentis suffricant. Quæ neq; nisi in magna: uetustaq; aspritudine, neque sæpe facienda sunt. Nam melius eodē, ratione uictus & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore, multaq; oculorum palpebras aqua calida fouebimus. Cibos autem sumimus acres, & extenuantes.

Cæsarianum collirium.

T medicamentum id quod cæsarianum uocatur, habet attrimenti sutorij. P. XI. mysi. P. X. piperis albi. P. XV. papaueris lacrymæ, gummi: singulorum. P. XII. cadmiæ lotæ P. XIII. subis. P. XVI. Satisq; constat hoc collirium aduersus omne genus oculorum ualetudinis idoneum esse, exceptis his, quæ lenibus nutriuntur.

Hieracis collirium.

D quocq; quod Hieracis nominatur ad aspritudinem potest. habet myrrhæ. P. XI. ammoniaci: thymamatis. P. XII. æruginis rase. P. XIII. cum aqua pluuiali. Ad idem idoneum est etiam id quod Canopite est: & id quod smilion uocatur, & id quod pyxinum, et id quod sphæron. Si composita medicamenta nō adsunt, felle caprino, uel quam optimo melle satis cōmode aspritudo curatur.

De Xerophthalmia.

St etiam genus aridæ lippitudinis: *Ξηροφθαλμία* & græci appellant: neq; tument, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, et cum dolore quodam grauescunt, & noctu prægrauī pituita inhaerescunt, quantoq; minor generis huius impetus: tanto finis manus expeditus est. In hoc uitio multum ambulare, multum exerceri, lauari sæpe, ibiq; desudare, multaq; frictione uti necessarium est. Cibi qui neq; implent, neq; nimium acres, apti sunt: sed inter hos medijs mane ubi concoxisse manifestum est, non alienum est ex sinapi garrire: tum deinde caput, atq; os diutius defricare.

Aurelij Cor.

Rhinion collirium.

Collirium uero aptissimum est, quod Rhinion uocatur. habet myrrhæ. P. XI. papaueris lacrymæ: acaciæ suat, pipis, gummi: singulorum. P. XI. lapidis hæmatitis: lapidis phrygii, lycii, lapidis scissilis singulorum. P. XII. æris combusti. P. XIII. ac pyxinum quoque eodem accommodatum est.

Ad oculos scabros colliria.

I uero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion id, quod supra positum est: potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rasæ: piperis longi, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XII. piperis albi, gummi, singulorum. P. XIII. admicæ cloræ, cerussæ, singulorum. P. XVI. nullum tamen melius est quam Euelpidis quod βασιλινδὸν nominabat. habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis asii, singulorum. P. XII. gummi. P. XIII. piperis albi. P. XIII. croci. P. XVI. psorici. P. XIII. Nulla autem per se materia est: quæ psoricum nominetur: sed chalcitidis aliquid, et admicæ dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idque in uas fictile additum, et contactu ficulneis folijs sub terra reponitur: sublaturque post dies uiginti rursus teritur, et sic appellatur. Verum in basilico quoque collirio conuenit ad omnes affectus oculorum id esse idoneum: qui non leuibus medicamentis curantur. Vbi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos leuant, et mel, et uinum. succurruntque et his, et aridæ lippitudini si quis panem ex uino subactum super oculum imponit. nam cum ferè sit humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos aut palpebras exasperat, sic et si quid prodit humoris: extrahitur, et si quid iuxta est, repellitur.

Ad caligationem oculorum, quæ propter lippitudinem oritur remedia et colliria.

Aligare uero oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac propter senectutem, imbecillitatem uel aliam consueverunt: si ex reliquijs lippitudinis id uitiū est, adiunat collirium, quod asclepias nominatur, adiunat id quod ex crocomagmate fit.

ῥιζὴ ὑπόκρου collirium.

Proprie etiam ad id componitur: quod ῥιζὴ ὑπόκρου uocant. habet piperis. P. XI. croci alici, papaueris lacrymæ, cerussæ, singulorum. P. XII. psorici, gummi: singulorum. P. XIII.

Ad caligationem oculorum, quæ propter senectutem, aut
aliam imbecillitatem fit.

T si ex senectute, aliaue imbecillitate id est, recte inungi po-
test, & melle quàm optimo, et cyprino, et oleo uetere. Como-
dissimum tamen est balsami partem unam: & olei ueteris,
aut cyprini partes duas, mellis quàm acerrimi partes tres miscere.
Vtilia quoq; huic medicamenta sunt, quæ ad caliginem proximè, quæq;
ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. Cuicumq; uero oca-
li caligabunt: huic opus erit multa ambulatione atq; exercitatione,
frequenti balneo, ubi tutum quidem corpus perficiendum est: præci-
pue tamen caput, & quidem irino donec insudet: uelandumq; postea;
nec detegendum antequam sudor, & calor domi conquierint. tum ci-
bis utendum acribus & extenuantibus, interpositisq; aliquibus die-
bus ex sinapi gargarizandum.

De suffusione oculorum.

Suffusio quoq; quam græci ὀφθαλμιασμία nominant: interdum
oculi potentia, qua cernit, se opponit. Quod si inueteraue-
rit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam
certis observationibus discutitur. sanguinem ex frõte uel naribus mit-
tere, in temporibus uenas adurere: gargarizando pituitam euocare:
suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. uictus
optimus est qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum, quæ paralysis dicitur.

C ne resolutio quidè oculorum: quàm παραλυσία græci no-
minant, alio uictus modo, uel alijs medicamentis curanda est.

Exposuisse tantum genus uirij satis est. Igitur interdum ene-
rit modo in altero oculo, modo in utroq; aut ex ictu aliquo, aut ex
morbo comitiali, aut ex distentione nervorum, qua uehementer oculus
ipse concussus est, ut his neq; quoquam intendi possit, nec omnino con-
sistat, sed huc illuc'ne sine ratione moueatur, ideòq; ne conspectum
quidem rerum præstet.

De mydriasi oculorum.

Non multū ab hoc malo distat id, quod μυδρίασι græci no-
cant. Pupilla effunditur, & dilatatur, aciesq; eius hebescit,
ac penè difficillime genus id imbecillitatis eliditur. i utraq;
uero id est, et paralysis, & mydriasi pugnandū est p eadē oia, quæ in
caligine oculorū præcepta sunt, paucis tantū mutatis: siq; ad caput

irino interdum acetum, interdum nitrum adiiciendum est: melle inu-
gi satis est. quidam in posteriore uitio calidis aquis usi, releuatiq;
quidam sine ulla manifesta causa subito obcaecati sunt. ex quibus nō
nulli cum aliquandiu nihil uidissent, repentina profusione alui, lumē
receperunt: quo minus alienum uideretur, ex recenti re & interposito
tempore medicamentis quoq; moliri deiectiones: quæ omnem noxiam
materiam in inferiora depellant.

De imbecillitate oculorum.

Ræter hæc imbecillitas oculorum est: ex qua quidam inter-
diu satis, noctu nihil cernunt: quod in foeminam bene respō-
dentibus menstruis non cadit: sed sic laborātes inungi oportet humore iocineris maxime hircini: si minus, caprini, ubi ad assum
coquitur, excepto: atq; eadi quoq; ipsum iecur debet. Licet tamen etiam
hysdem medicamentis non inutiliter uti, quæ uel cicatrices, uel aspri-
tudinem extenuant: quidam contrito semine portulacæ mel adiiciunt
eatenus ne id ex specillo desiller: eoq; inungunt. Exercitationibus, bal-
neo, frictionibus, gargarizationibus iisdem his quoq; utendum est.

Ad oculos qui extrinsecus offenduntur: cum sanguine suffusi sunt.

T hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus
uero interdum si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffun-
datur: nihil commodius est: quàm sanguine uel columbæ, uel
palumbi, uel hirundinis inungere: neq; id sine causa fit: cum horum
acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum rede-
at, celeberrimiq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut
per parietes, aut id herba chelidonio restitui: quod per se sanescit: eo-
rum ergo sanguis nostros quoq; oculos ab externo casu commodissime
tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime
effrax columbæ & illi ipsi & nobis supra percussum uero oculum
ad inflammationem leniendam non est alienum imponere etiam
cataplasmata: sed ammoniacus, uel quilibet alius quàm optimus teri
debet sic, ut ei paulatim oleum adijciatur, donec crassitudo strigmen-
ti fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea farina: quæ ex mulso
decocta sit. Facile autem recognitis oibus, quæ medica quoq; prodide-
runt: apparere cuilibet potest uix ullum ex his, quæ supra comprehē-
sa sunt: oculi uitium esse, quod non simplicibus quoq; & promptis re-
medijs submoueri possit.

Auris

b Actenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possint: ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum à luminibus natura nobis dedit: sed in his aliquanto maius periculum est: nam vitia oculorum intra ipsos nocet. Aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementia, mortemque precipitant: quo magis inter initia protinus succurrendum est: ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit: abstinere, & continere se debet. Postero die, si uehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere, & operire: at magnus cum febre, nigritiaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. si id aliquæ causæ prohibent, alius soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue foeni græci, siue lini, siue alia farina ex nullo decocta est. recte etiam subinde admouentur spogæ ex aqua calida expressæ. tum lenato dolore ceratum circumdari debet ex irino, aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa factum est, proficit. si uehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adijci cataplasmata debent papaueris corticis fricti atque contriti sic, ut ex his pars dimidia sit, eaque tunc simul ex passo mixto decoquatur. In aurē uero infundere aliquod medicamentum oportet, quod semper ante tepestieri conuenit: commodissimeque per strigilem instillatur. ubi auris repleta est: super lana mollis addenda est, quæ humorem intus contineat. & hæc quidem communia sunt. Medicamentum uero est & rosæ, & radicum harundinum succus, & oleum in quo lumbrici cocti sunt, et humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali persici expressus. composita uero ad inflammationem, doloremque leniendum hæc ferè sunt: castorei, papaueris lacrymæ pares portiones conteruntur: deinde adiicitur his passum. uel papaueris lacrymæ, croci, myrrhæ par modus sic teritur, ut inuicem modo rosa, modo passum instilletur, uel id, quod amarum in ægyptia faba est conteritur, & rosa adiecta: quibus myrrhæ quoque paulum à quibusdam miscetur, uel papaueris lacrymæ, aut thus cum muliebri lacte, uel amararum nucum cum rosæ succo, uel castorei, myrrhæ, papaueris, lacrymæ pares portiones cum passo: uel croci. P. XI. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum P. XII. quibus tum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, melis minus cyatho idque ex primis medicamentis est: uel papaueris lacryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis: quæ habet castorei opopanax: papaueris lacrymæ ex aceto, singulorum P. XII. spumæ lycij. P. XIII. quæ contrita passo excipiuntur donec cerati

Aurelij Cor.

n iij

*ung. irino
missio sang.
purgans.
cataplasma*

crassitudinem habeant: atq; ita reponuntur. ubi usus requiritur, rur-
 sus idem medicamentum adiecto passo, specillo teritur. Illud perpetuum
 est, quotienscunq; crassius medicamentum est, quam ut in aurem instil-
 lari possit, adiiciendum eum esse humorem, ex quo id componi debet:
 donec satis liquidum sit. si uero pus quoq; aures habent, recte lycium
 per se infunditur, aut irinum unguentum, aut porri succus cum melle,
 aut centaurea succus cum passo, aut dulcis punici mali succus in ipsius
 cortice tepesfactus, adiecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam misce-
 tur myrrhæ, quam stacten cognominant. P. XI. croci tantundem, nucis
 amaræ. XXV. mellis sesquicyathus, quæ contrita, cum utendum est, in
 cortice punici mali tepesiant. ea quoq; medicamenta. quæ oris exulce-
 rati causa componuntur, æq; ulcera aurium sanant: quæ si uetustiora
 sunt, et multa sanies fluit: apta compositio est, quæ ad auctorem Era-
 sistratum refertur: piperis. P. XI. croci. P. XI. myrrhæ, mysi cocti, sin-
 gulorum. P. XII. æris combusti. P. XII. hæc ex uino teruntur: deinde
 ubi inaruerunt, adiunguntur passi heminae tres, et simul coquantur:
 cum utendum est, adiicitur his mel, et uinum. Est etiam Isolemæi chi-
 rurgi medicamentum, quod habet lentisci. P. XI. gallæ. P. XI. ompha-
 cij. P. XI. succum punici mali. Est menophili ualidum admodum, quod
 ex his constat: piperis longi. P. XI. castorei. P. XII. myrrhæ, croci, pa-
 paueris lacrymæ, nardi syriaci, thuris, malicorij, ex ægyptia faba
 partis interioris, nucis amararum, mellis quam optimi, singulorum.
 P. XIII. quibus cum teruntur, adiicitur acetum quam acerrimum,
 donec crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis, cinnamomi, casia, sin-
 gulorum. P. XI. lycij, nardi, myrrhæ, singulorum. P. XI. aloes. P. XII.
 mellis cyathi tres, uini sextarius, ex quibus uinum cum lycio deco-
 quitur: deinde his alia miscentur: at si multum puris, malusq; odor
 est, æruginis rasæ, thuris, singulorum. P. XII. mellis cyathi duo, aceti
 quattuor simul incoquantur: ubi utendum est, dulce uinum misceatur,
 aut aluminis scissilis, papaueris lacrymæ, acaciæ sicut par pondus mi-
 scetur: hisq; adiicitur hyoscyami succi dimidio minor quam unius ex
 superioribus portio: eaq; trita ex uino diluuntur. per se quoq; hyo-
 scyami succus satis proficiat. Commune uero auxilium aduersus omnes
 aurium casus: iamq; usu comprobatum Asclepiades composuit. In eo
 sunt cinnamomi, casia, singulorum. P. XI. flores iunci rotundi, castorei,
 albi piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thu-
 ris masculi, nardi syriaci, myrrhæ pinguis, croci, spumæ nitri, singulo-
 rum. P. XII. quæ separatim contrita, rursus mixta ex aceto conterun-
 tur: atq; ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. eodem modo co-
 mune auxilium auribus laborantibus est. Polybi sphragis ex dulci ui-

no liquata: quæ compositio priore libello continetur. quod si et sanies profluit, et tumor est, non alienum est, mixto uino per oricularium clysterem eluere: et tum infundere uinum austum cum rosa mixtum: cui spodij paulum sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut herbe sanguinalis suum cum rosa, aut mali punia suum cum exigua parte myrrhæ: si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur: et tum aliquod ex his quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur: si magis pus profluit, et caput utique: tondendum est, et multa calida aqua perfundendum, et gargarizandum, et usque ad lassitudinem ambulandum, et cibo modico utendum est. si cruor quoque ex ulceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi, uel aqua, in qua rosa decocta sit, suco aut herbe sanguinalis, aut acacie adiecto. quod si super ulcera caro increuit, ea quoque mali odoris sanguine fundit, aqua tepida elui debet: tum infundi id, quod ex thure, et ærugine, et aceto, et melle fit: aut mel cum ærugine incoctum: squama quoque æris cum sandaraca contrita per fistulam recte insillatur.

Aduersus aurium uermes.

Bi uero uermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt: si longius, medicamentis enecandi: cauendumque, ne postea nascentur. ad utrumque proficit album uerratum cum aceto contritum: flui quoque aurem oportet uino, in quo marrubium decoctum sit. sic emortui uermes in primam auris partem prouocabuntur: unde facillime educi possunt.

Ad compressa aurium foramina.

In foramen auris compressum est, et intus crassa sanies subest, mel quam optimum addendum est: si id parum proficit, mellis cyatho et dimidio, æruginis rase. P. XII. adiacendum est: incoquendumque, et eo utendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis, et rosæ scrupuli duo. Item galbani. P. XII. myrrhæ cum melle, et fellis taurini, singulorum. P. XII. uini quantum satis est ad myrrham diluendam.

Ad grauem auditum.

Bi uero grauius aliquis audire cœpit, quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit: in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus: si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, uel porri suus, aut cum mulso nitri paulum: atque ubi crusta à corpore iam recedit,

LIBER

elunda auris aqua tepida est: quo facilius ea per se diducta, orici-
lario specillo protrahatur. si sordes æque molles sunt, eodem specillo
eximendæ sunt. at si duræ sunt: acetum, & cum eo nitri paululum
coniiciendum est. Cumq; emollitæ sunt, eodem modo elui aurem, purga-
riq; oportet. quod si capitis grauitas manet: attendendum idem, &
leniter, sed diu perfricandum est, adiecto uel irino, uel laureo oleo sic,
ut utrilibet paulum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterq;
post unctionem aqua calida caput fouendū: Cibisq; utendum ex im-
becillissima & media materia, magisq; assumendæ dilutæ potiones:
nonnunq; gargarizandum est. Infundendum autem in aurem casto-
reum cum aceto, & laureo oleo, & succo radicula corticis: aut cucu-
ris agrestis succus adiectis contritis rosæ folijs: immaturæ quoq; uinæ
succus cum rosa insillatus aduersus sordiditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra se ipsas.

Liud uitij genus est: ubi aures intra se ipsas sonant: atq; hoc
quoq; fit, ne externum sonum accipiant: lenissimum est, ubi
id ex grauedine est. peius: ubi ex morbis, capitis uel longis do-
loribus incidit. Pessimum: ubi magnis morbis uenientibus, maximeq;
comitali: prouenit. Si ex grauedine est: purgare aurem oportet, et spi-
ritum continere, donec inde humor aliquis expumet: si ex morbo uel
capitis dolore, quod ad exercitationē, frictionem, perfusionem, gargari-
zationemq; pertinet, eadem faciendæ sunt: cibus nō utendum nisi ex-
tenuantibus: in aurem dandus radiculae succus cum rosa, uel cum suc-
co radicis ex cucumere agresti, uel castoreum ex aceto et laureo oleo,
ueratrum quoq; cum aceto conteritur: deinde melle cocto excipitur, &
inde collirium factum in aurem demittitur: si sine his cepit, ideoq;
nouo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto uel iri-
no, uel laureo oleo, aut huic mixtum castoreū cum succo uacui ama-
rarum, aut myrrha & nitrum, cum rosa et aceto. Plus tamen in hoc
quoq; proficit uictus ratio: eademq; faciendæ sunt: quæ supra compre-
hendi: cum maiore quoq; diligentia, & præterea, donec huius sonus fi-
niatur, à uino abstinendum. quod si simul & sonus & inflammatio,
laureum oleum conicasse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus
exprimitur: quibus quidam uel castoreum, uel myrrham miscent.

Ad ea, quæ in aurem inciderunt extrahenda.

¶ Olet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus,
aliquod uel animal. Si pulex intus est: compellendum eò lanæ
paulum est, quo ipse is subit, & simul extrahitur: si non est secutus,
aliud uel

aliud ue animal est, specillum lana inuolutum in resina quam glutinosissimam, maximeq; terebinthinam demittendum, idq; in aurem conijciendum, ibiq; uertendum est. Vtiq; enim comprehendet & eximet: sin aliquid ex aume est: specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso, paulum recuruato: si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi: sternutamenta quoq; admota id commodè elidunt, aut oriculario clystere aqua uehementer intus compulsa: tabula quoq; collocatur media inhaerens capitibus utriusq; pendentibus, superq; eam homo deligatur in id latus uersus, cuius auris eo modo laborat sic, ut extra tabulam emineat. Tum malleo caput tabulae, quod à pedibus est, feritur: atq; ita concussa aure, id quod inest: excidit.

De narium morbis, & curationibus. Cap. VIII.

Nares.

Ares uero intus exulceratas fouere oportet uapore aquae calidae, idest spongia expressa atq; admota: fit & subiecto uase oris angust, calida aqua repleto. Post id fomentum illinenda ulcera sunt, aut plumbi cremēto, aut cerussa, aut argenti spumam cum quolibet horum aliquis conterit: eiq; dum teritur inuicem uinum & oleum myrteum adiāt, donec mellis crassitudinem fecerit. si autem ea ulcera circa nares sunt, pluresq; crustas, & odorem foedum habent, quod genus graeci ὀσείων appellant: sciri quidem debet, nix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen haec tentari possunt, ut caput ad aurem tondeatur, assidueq; uehementer perfricetur: multa calida aqua perfundatur: multa ei deambulatio sit: abus modicus: neq; acer, neq; ualentissimus: tum in nares ipsam mel cum eoque modo resinae terebinthinae conijciatur: quod specillo quoq; inuoluto lana fit, attrahaturq; spiritu is suauis, donec in ore gustus eius sentiat: sub his enim crustae resoluntur, quae tum per sternutamenta elidi debent: puris ulceribus uapor aquae calidae subiiciendus est: deinde adhibendum, aut lycium ex uino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut mentha, aut marrubij succus, aut atramentum sutorium, quod candens factum, deinde contritum sit, aut interior scyllae pars contrita sic, ut horum cuilibet mel adijciatur: cuius ceteris admodum exigua pars esse debet: in atramento sutorio tanta, ut ea mixtura liquida fiat, cum scylla utiq; pars maior: inuoluendumq; lana specillum est, & in eo medicamento intinguendum, eoq; ulcera implenda sunt: rursumq; linamentum inuolutum, & oblongum eodem medicamento illinendum, demittendumq; in nares est, & ab inferiore parte leniter deligandum: idq; per hyemem & uer bis die, per aestatem & autumnum

LIBER

inum, ter die fieri debet, interdum uero etiam in naribus carunculae quaedam similes muliebribus mammis nascuntur, haecque in partibus, quae carnosissimae sunt inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus: sub quibus ex toto consumuntur. Polypus uero est caruncula modo alba, modo subrubra, quae narium ossi inhaeret, et modo ad labra pendens narem implet, modo retro per id foramen, quo spiritus a naribus ad fauces descendit, adeo increfcit, uti post uiam conspicia possit, strangulatque hominem maxime austro aut euro flante: fereque mollis est, raro dura, etque magis spiritum impedit, et nares dilatat: quae fere non curatur: itaque attingi non debet. illud aliud genus, fere quidem ferro curatur, interdum tamen inarescit: si addita in narem per linamentum, aut penicillum ea compositio est, quae habet minij sinopici, chalcitis, calcis, sandaracae, singulorum. P. X. I. atramenti sutorij. P. XII.

Dentes

De dentium dolore, et curationibus. Cap. IX.

N dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, uinum ex toto circuncidendum est. et ubi quoque primo abstinendum, deinde eo modico, mollique utendum, ne mandentis dentes irriter: tum extrinsecus admouendus per spongiam uapor aquae calidae, imponendumque ceratum ex cyprino, aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputque uelandum est. quod si grauior is dolor est: utiliter et alius ducitur, et calida cataplasmata super maxillas iniiciuntur, et ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, saepiusque mutatur: cuius rei causa et quinq; folij radix in uino mixto coquitur, et hyoscyami radix, uel in posca, uel in uino mixto coquitur sic, ut paulum his salis adijciatur, et papaueris non nimium aridi cortices, et mandragorae radix eodem modo. sed in his tribus utique uitandum est, ne quod austum erit, deuoretur: ex populo quoque alba cortex radice in hunc usum in uino mixto recte coquitur, et in aceto cornu ceruinum rasum, et nepeta cum teda pingui: ac ficus item pinguis, uel in mulso, uel in aceto, et melle: ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. specillum quoque lana inuolutum in calidum oleum demittitur, eoque ipso dens fouetur. quinetiam quaedam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur: in quem usum ex malo punice acido, atque arido malicorij pars interior cum pari portione, et gallae et pinei corticis conteritur, misceturque his minium, etque contrita aqua pluuiali coguntur, aut panacis, papaueris lacrymae, peucedani, uuae taminiae sine seminibus

pares portiones conteruntur, aut galbani partes tres, papaueris lacrymæ pars quarta. Quicquid dentibus admotum est, nihilo minus supra maxillam ceratum, quale supra posui: esse debet: lana obtectum: quidam etiam myrrhæ, cardamomi, singulorum. P. XI. croci, pyretri: fcorum partes: singulorum. P. XIII. Sinapis. P. XVIII. contrita linteolo illinunt, imponuntq; in humero partis eius, qua dens dolet: si is superior est, à scapulis: si inferior, à pectore: idq; dolorem leuat: & cum leuauit, protinus submouendum est: si uero exesus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi res coegit, non est necesse: sed cum omnibus fomentis, quæ supra posita sunt, adijciendæ quædam ualentiores compositiones sunt, quæ dolorem leuant: quales hæc sunt. habet autem papaueris lacrymæ. P. XI. piperis. P. XII. pforeos. P. XX. quæ contrita galbano excipiuntur, idq; circundatur: aut Menemachi maxime ad maxillares dentes in qua sunt croci. P. XI. cardamomi, thuris, fuliginis: fcorum partes, pyretri, singulorum. P. XIII. sinapis. P. XVIII. Quidam autem immiscet pyretri, piperis, elaterij, singulorum. P. XI. aluminis scissilis: papaueris lacrymæ, unæ taminiæ, sulphuris ignem non experti, bituminis, lauri baatarum, sinapis, singulorum. P. XII. Quod si dolor eximi eum cogit, & piperis semen cortice liberatum, & eodem modo baata hederæ coniecta in id foramen, dentem findit, isq; forte stans exidet: & plani piscis quædam pastinacæ nostri, πορρωτὰ græci uocant, aculeus torretur: deinde conteritur, resinaq; excipitur, quæ denti circundata hunc soluit: & alumen scissile in id foramen coniectum dentem citat: sed id tamen inuolutum in lanula demitti commodius est, quia sic dente seruatō dolorem leuat. Hæc à medicis accepta sunt: sed agere stum experimento cognitum est, cum dens dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus uelli debere, & in peluem conijci, supraq; aquam infundi, collocariq; iuxta sedentem hominem undiq; ueste contextum: tum in peluem candentes filices demitti sic, ut aqua tegantur, hominemq; eum hiantē ore uaporem excipere, ut supra dictum est undique inclusum. nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idq; sæpe longiorem, sæpe annuam ualitudinem bonam præstat.

De tonsillis, & earum cura.

Cap. X.

¶ I uero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput uelandum est extrinsecus: is locus uapore calido fouendus, multa ambulatione utendum, caput in lecto sublime

*Medic. ingenua
Hæc. ylaris q;
Immo ut in
dignis & de
plumbis q;
infusa.*

Quod si dolor eximi eum cogit

Agere stum experimento

Tons. illa

LIBER

habendum, gargarizandumq; est ex reprimentibus. radix quoq; ea: quam dulcem appellant contusa & in passo, mulso'ue decocta idem præstat. leniterq; quibusdam medicamentis eas illini non alienū est: quæ hoc modo fiunt. ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit: tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum. P. XII. per se conteruntur, paulatimq; his adiunguntur vini lenis cyathi duo, mellis unus: deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur: aut eiusdē succi sextarius eodem modo coquitur, atq; eadem ratione trita ei adiunguntur hæc nardi. P. XV. omphacij. P. XI. cinnamomi, myrrhæ, cassiæ, singulorum. P. XI. eadem autem hæc & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus quoq; in hac ualitudine lenis esse debet ne exasperet, quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediat, in lecto conuiescendum, à cibo abstinendum, neq; assumendum quicquam præter aquam calidam est: alius quoq; ducenda est: gargarizandum ex fico & mulso: illinendum mel cum omphacio: intrinsecus admoendum, sed aliquanto diutius uapor aquæ calidæ, donec ea suppurent, et per se aperiantur: si pure substante non rumpuntur hi tumores, incidendi sunt: deinde ex mulso calido gargarizandum ex fico: at si modicus quidem tumor & exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adijciendum est: illinendaq; ulcera hoc medicamento. passi quamdulcissimi tres heminae ad unā coquantur: tum adijciatur thuris. P. XI. croci, myrrhæ: singulorum. P. XI. leniterq; oīa rursus feruescunt. ubi pura ulcera sunt, eodem furfurum cremore, uel lacte gargarizandum est. atq; hic quoq; abis lenibus opus est: quibus adijci dulce uinum potest.

De oris ulceribus, & curationibus, & quæ antheræ sint. Cap. XI.

Ulcera autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda sunt: optime his medicamentis curantur, quæ supra posita ex malis punicis fiunt: continendusq; saepe ore reprimens cremor, cui paulum mellis sit adiectum: utendum ambulationibus, et non acri cibo. simulatq; uero pura ulcera esse cœperunt, lenis humor, interdum etiam quàm optima aqua ore continenda est. prodestq; assumptum pyrum mitium, pleniorq; cibus, dum acribus uacet. inspergq; ulcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallæ immaturæ sit adiectum. si iam crustas habent, quales in adustis esse consuerunt, adhibendæ sunt hæc compositiones, quas græci ἀνθρακίς nominant. Iunci quadrati, myrrhæ, sanda-

sandaracæ, singulorum. P. XIII. aluminis pares portiones: aut croci, myrrhæ, singulorum. P. XII. iridis, aluminis, scissilis, sandaracæ: singulorum. P. XIII. iunci quadrati. P. XVIII. aut gallæ, myrrhæ: singulorum. P. XII. aluminis, scissilis. P. XII. rosæ foliorum. P. XIII. qui dam autem croci. P. X. aluminis, scissilis, myrrhæ: singulorum. P. XI. sandaracæ. P. XII. iunci quadrati. P. XIII. miscet. Priora arida insperguntur: hoc cum melle illinitur neq; ulceribus tantum, sed etiã tonsillis. Verũ ea longe periculosissima ulcera sunt, quas ἀπὸσας græci appellant, sed in pueris. hos enim sæpe consumunt: in uiris et mulieribus idem periculum non est. Hæc ulcera à gingivis incipiunt, deinde palatum, totumq; os occupant: tum ad unã, faucisq; descendunt. quibus obsessis non facile fit, ut puer convalescat. ac miserius etiam est: si lactans adhuc infans est: quo minus imperari remedium aliquod potest: sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisq; operibus, quæ superiores partes movet: mittenda in balneum, iubendaq; ibi calida aqua mammas perfundere: tum alenda cibis lenibus, & his qui facile non corrumpuntur. Potiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est: vini diluti. Ac si alius nutriti substitit: ducenda est. Si pituita eius in os coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera puni-genda sunt melle, cui rhus: quem syriacum vocant, aut amarae nuxes adiectæ sunt, vel mixtis inter se rosæ folijs aridis, pineis nucleis, mentæ colliculo, melle: vel eo medicamento, quod ex moris fit: quorum suavis eodem modo quo punici mali ad mellis crassitudinem coquitur: eademq; ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel miscetur: Neq; quicquam dandum, ad quod humor euocari possit. Si uero iam firmior puer est: gargarizare debet his ferè, quæ supra comprehensa sunt. at si lenia medicamenta in eo parum proficiunt: adhibenda sunt ea, quæ adurèdo crustas ulceribus induant: quale est scissile, alumen, vel chalatis, vel atramentum sutorium: prodest etiam fames & abstinentia quanta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera interdum caseus ex melle recte datur.

De gingivarum ulceribus. Cap. XII.

8 Inguæ quoq; ulcera non alijs medicamentis egent, quàm quæ prima parte superioris capitis exposita sunt: sed quæ in latere eius nascuntur: diutissime durant. Videndumq; est num contra dens aliquis acutor sit, qui sanescere sæpe ulcus eo loco non sinit: ideoq; limandus est. solent etiam interdum iuxta dentes in gingivis tubercula quædam oriri dolentia, τρποδόντιδας græci

LIBER

appellant. hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut inter se mixtis sale fossili, combusto cupresso, nepeta, deinde eluere os cremore lenticulæ, et inter hæc hiare: donec pituita satis profluat. In maiore uero inflammatione iisdem medicamentis utendum est: quæ ad ulcera oris supra posita sunt, et mollis linamenti paulum inuoluendum aliqua compositione ex his, quas ἀρόνπας uocari dixi, demittendumque id inter dentem, et gingiuam: quod si durior erit, et id prohibebit, extrinsecus admonendus erit spongiæ uapor calidus, imponendumque ceratū. Si suppuratio se ostendet: diutius eo uapore utendum erit, et continendum ore calidum mulsum, in quo ficus decocta sit: itemque subcrudum incidendum, ne si diutius ibi pus permanserit: os lædat. quod si maior is tumor est, commodius totus exaditur, sic, ut ex utraque parte dens liberetur. Pure exempto, si leuis plaga est, satis est ore calidam aquam continere, et extrinsecus fouere eodem uapore: si maior est, lenticulæ cremore: uti hisdem medicamentis, quibus cætera ulcera oris curantur: alia quoque ulcera in ginguis plerumque oriuntur: quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt. maxime tamen mandere ligustrum oportet, suumque cum ore continere. Fit etiam interdum, ut ex gingiæ ulcere, siue παροδόντις fuit, siue non fuit, diutius pus feratur: quod aut dente corrupto, aut fracto, uel aliter uiciato osse, maximeque id per fistulam uenire consuevit. ubi inadit, locus aperiendus, dens eximendus, testa ossis, si qua exassit recidenda est: si quid uiciosi est, radendum. post quæ quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est: si uero à dentibus gingiæ recedunt, eadem ἀρόνπας succurrunt. Vtile est etiam pira, aut mala non permatura mandere, et ore eum humorem continere. Idemque præstare non acre acetum in ore retentum potest.

De uua morbo et curatione.

Cap. XIII.

Ve uehemens inflammatio terrere quoque debet: itaque in hac et abstinentia necessaria est, et sanguis recte mittitur: et si id aliquares prohibet, alius utiliter ducitur, capuique super hæc uelandum, et sublimius habendum est: tum aqua gargariandum, in qua simul rubus, et lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa uua uel omphacio, uel galla, uel alumine scissili sic, ut cuilibet eorum mel adijciatur. Est etiam medicamentum huic aptum, quod Andronium appellatur. constat ex his: alumine scissili: squama aeris rubri: atramento sutorio, galla, myrrha, mysi: quæ per se contrita, mixtaque rursus paulatim adiecto uino austero teruntur, donec is mellis crassa

tudo sit. ubi horum aliquo illita una est: chelidonie quoque succo per cochlear illita una maxime prodest. Ferè multa pituita decurrit, cumque ea quieuit, ex uino calido gargarizandum: quod si minor in ea inflammatio: laser terere: eiusque adijcere frigidam aquam satis est, eamque aquam cochleario exceptam ipsi unæ subijcere, ac mediocriter eam tumentem aqua quoque frigida eodem modo subiecta reprimat. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, quæ uel cum laser, uel sine eo hac curatione unæ subiecta est.

De cancro oris. Cap. XV.

I quando autem ulcera oris cancer inuasit, primum considerandum est, num malus corporis habitus sit, eiusque occurrendum. deinde ipsa ulcera curanda. quod si in summa parte id uicium est: satis proficit arvensis humido ulcere arida inspersa, sicciore, cum exigua parte mellis illita: si paulo altius: chartæ combustæ partes duæ, auri pigmenti pars una: si penitus malum descendit: chartæ combustæ partes tres, auripigmenti, pars quarta, aut pares portiones salis fricti & iridis frictæ: aut item pares portiones chalcitidis, calas, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere: & super adurentia medicamenta imponere, ne uicinum, et sanum locum lædant, quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem coniungunt, donec tabescere desinat: deinde id acetum coquunt, donec exsiccat: cumque salem contritum inspergunt. quotiens autem medicamentum iniicitur, & ante, & post: os diluendum est uel cremore lentisculæ, uel aqua: in qua aut erui, aut oleæ, aut uerbena decoctæ sint sic, ut quilibet eorum paulum mellis misceatur. acetum quoque ex scylla retentum ore, satis aduersus hæc ulcera proficit: ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratum est, rursus mixtum acetum: sed & diu continere utrunlibet, & id bis, aut ter die facere, prout uehemens malum est, necessarium est. quod si puer est, cui id inadit: specillum lana inuolutum in medicamentum demittendum est, & super ulcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia deuoret. Et si dolor in gingiuis est, moventurque aliqui dentes: refici eos oportet: nam curationes uehementer impediunt. si nihil medicamenta proficiunt: ulcera erunt adurenda: quod tamen in labris ideo non est necessarium: quoniam ex cadere commodius est. et id quidem æque adustum, atque exasum sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur: impleri non potest. Gingivarum uero ossa, quæ hebetia sunt: in perpetuum ustione nudantur, neque enim postea caro increscit. Imponenda tamen adustus lentiscula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

(cum cancri oris)

*auri pigmenti .i.
mencid. uida
joha. Zaga. ac
301.*

LIBER

De parotibus, quæ sub auribus oriuntur. Cap. XVI.

Aec in capite ferè medicamentis egent. sub ipsis uero auri-
b^h bus oriri *παρωτίδες* solent, modo in secunda ualitudine ibi
inflammatione orta, modo post longas febres, illuc impetu
morbi conuerso. Id abscessus genus est: itaq; nullam nouam curatio-
nem desiderat: animaduersionem tantummodo hanc habet necessa-
riam: quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experi-
mentum est: si ex aduersa ualitudine illud inimicum est, maturariq;
& q̄ primum aperiri commodius est.

De umbilici prominentis curatione. Cap. XVII.

D umbilicos uero prominentes, ne manu, ferroq; utendum
a sit: ante tentandum est, ut abstineat: alius his ducatur, im-
ponatur super umbilicum id, quod ex his constat. Cicutæ, et
fuliginis: singulorum. P. XI. cerussæ elotæ. P. XIII. plumbi eloti. P. X
VIII. ovis duobus: quibus etiam solani succus adiçatur. Hoc dilutius
impositum esse oportet, & interim conuiescere hominem: cibo modi-
co uti sic, ut uidentur omnia instantia.

De obscenarum partium uicijs, & curationibus. Cap. XVIII.

Roxima sunt ea, quæ ad partes obscenas pertinent, quarū
p apud græcos uocabula & tolerabilius se habent, & accepta
iam usu sunt cum omni ferè medicorum uolumine atq; ser-
mone iactentur, apud nos fœdiora uerba ne consuetudine quidem ali-
qua uerecundius loquentium accommodata sunt: ut difficilis hæc ex-
planatio sit simul & pudorem & artis præcepta seruantibus. neq;
tamen ea res à scribendo deterrire me debuit. Primum ut omnia, quæ
salutaria accipi, comprehenderem: dein quia in uulgis eorum cura-
tio etiā præcipue cognoscenda est, quæ inuitissimus quisq; alteri osten-
dit.

De colicis morbis, & curationibus.

Citur si ex inflammatione coles intumuit: reduciq; summa
i cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fouen-
dus locus est. Vbi uero glans contacta est, oriculario quoq;
clystere inter eam cutemq; aqua calida inferenda est. Si mollita sic
& extenuata cutis ducenti paruit, expeditior reliqua curatio est: si
tumor

tumor uicit: imponenda est uel lenticula, uel marrubium, uel olea fo-
lia ex uino cocta sic, ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum
adijciatur: sursumq; coles ad uentrem deligandus est. quod in omni
curatione eius necessarium est, isq; homo continere se debet, & absti-
nere à cibo, & potione aqua tantum. si uindicta. à postero die rur-
sus adhibendum hisdem rationibus aqua fomentum est, & cum ui-
quoq; experiundum, an cutis sequatur: eaq; si non parebit, leuiter
summa scalpello concidenda erit: nā cū sanies profluxerit: extenuabi-
tur his locus, & facilius cutis ducetur. Siue autē hoc modo uicta erit,
siue nunquam repugnauerit, ulcera uel in cutis ulteriore parte, uel
in glande, ultra uel eam in cole reperientur, quae necesse est, aut pura
siccā uel sint, aut humida & purulenta. si siccā sunt, primum aqua
calida fouenda sunt: deinde imponendum lycium ex uino est, aut a-
murca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum: si leuis is humor est,
uino eluenda sunt: tum butyri & rosae mollis paulum, & resinae te-
rebinthinae pars quarta adijcienda est, eoq; utendum: aut si pus ex
his profluit, ante omnia elui mulso calido debet. tum imponi pipe-
ris. P. XI. myrrhae. P. XII. croci, mysi cocti, singulorum. P. XII. quae ex
uino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem
autem compositio tonsillis, unae madentiori, nariumq; ulceribus ac om-
modata est. Aliud ad eam, piperis. P. XI. myrrhae. P. XI. croci. P. XII.
mysi cocti. P. XI. aeris combusti. P. XII. quae primum ex uino austero
conteruntur, deinde ubi inaruerunt: iterum teruntur ex passis tribus
cyathis, & incoquantur: donec usq; crassitudinem habeant. Aerugo
quoq; cum cocto melle, & ea quae ad oris ulcera supra comprehensa
sunt, curant: aut Erasistrati compositio, aut Cratonis recte super puru-
lenta naturalia imponitur. folia quoq; olea ex nouem cyathis uini
coquuntur. his adijciatur aluminis scissilis. P. XIII. lycij. P. XVIII. mel-
lis sesquicyathus: ac si plus purus est, id medicamentum ex melle: si
minus, ex uino diluitur. Illud perpetuum est: post curationem, dum in-
flammatiō manet, quale supra positum est, cataplasma supra dare:
& quotidie ulcera eadem ratione curare: quod si pus & multum et
cum malo odore coepit profluere, elui cremore lenticulae debet sic, ut
ei mellis paulum adijciatur, aut olea, aut lentisci folia, uel marrubium
decoquendum est. eoq; humore eodem modo cum melle utendum, im-
ponendaq; eadem, aut etiam omphacum cum melle, aut id quod ex
aerugine & melle ad aures fit, aut compositio Andronis, aut ἀνδρονίς
sic, ut ei paulum mellis adijciatur. quidam ulcera omnia, de quibus
adhuc dictum est, lycio ex uino curant. Si uero ulcus latius atq; altius
serpit, eodem modo elui debet: imponi uero, aut aerugo, aut omphacum

cum melle, aut Andronis compositio, aut marrubij, myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ, singulorum. P. XI. minij sinopici. P. XII. quæ per se singula primum teruntur, deinde iuncta iterum melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudine habeant: tum in æneo vase leniter coquantur, ne super fluant: cum iâ guttæ indurescunt, vas ab igne remouetur, idq; medicamentum tum, pro ut opus est, aut ex melle, aut ex uino liquatur. Idem autem per se etiâ ad fistulas utile est. Solet etiam interdum ad nervos ulcus descendere: profluitq; pituita multa, sanies tenuis maliq; odoris, non cocta, aut aquæ similis, in qua caro recens lota est. doloresq; is locus, & punctiones habet: id genus quamuis inter purulentæ est, tamen lenibus medicamentis curandum est: quale est emplastrum tetrapharmacum ex rosa liquatum sic, ut thuris quoq; paulum ei misceatur: aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit. supra uero à me positum est. præcipueq; id ulcus multa calida aqua fouendum est, uelandumq; neq; frigori committendum. Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute exesus sic, ut glans excidat. sub quo casu cutis ipsa circuncidenda est. perpetuumq; est, quotiens glans, aut ex cole aliquid, uel excidit, uel absconditur: hanc non esse seruandam, ne confidat, ulceriq; agglutinetur, ac neq; reduci possit postea, & fortasse fistulam quoq; urinae claudat. Tubercula etiam, quæ quædam graeci uocant circa glandem oriuntur, quæ uel medicamentis, uel ferro aduruntur, & cum crustæ exciderunt, squama aeris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

De cancro, qui in cole nascitur, curatione.

Aec citra cancerum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum
 h in his quoq; uel præcipue ulcera infestat. incipit à nigritie, quæ si cutem occupauit: protinus specillū subiiciendum, eaq; incidenda est: deinde ora uulsellæ prehendendæ: tum quicquid corruptum est: excidendum sic, ut ex integro quoq; paulum demat, idq; adurendum. quotiens quid uisum est, id quoq; sequitur, ut imponenda lentacula sit: deinde ubi crustæ exciderunt, ulcera sic, ut alia curentur. at si cancer ipsum colem occupauit: inspergendæ aliqua sunt ex adurentibus, maximeq; id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. si medicamenta uincuntur, hic quoq; scalpello quicquid corruptum est sic, ut aliquid etiâ integri trahat, præcidi debet. illud quoq; æq; perpetuum est, exciso cancro uulnus esse adurendum: sed siue ex medicamentis, siue ex ferro crustæ occaluerunt, magnum periculum est, ne his decedentibus ex cole profusio sanguinis insequatur: ergo lō=gi quiete & immobili penè corpore opus est, donec ex ipso crustæ

puræ leniter resoluantur. at si uel uolens aliquis, uel imprudens, dum ingreditur immature, crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est: si hæc parum ualet, decurrendum est ad medicamentum, quæ sanguinem supprimunt. si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timide debet, neq; ullo postea motu dandus eidem periculo locus est.

De phagedæna in cole nascentis curatione.

Omniunquam etiam id genus ibi cancri, quod *phagedæna* à græcis nominatur, oriri solet, in quo minime differendum: sed protinus hysdem medicamentis occurrendum est, & si parum ualent: ferro adurendum. quædam etiam nigrities est, quæ nõ sentitur & serpit, ac si sustinuerimus usq; ad uesciam tendit: neq; succurri postea potest. si id in summa glande circa fistulæ urinæ est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde id ferro adurendum: si uero alte penetravit, quicquid occupatum est, præcidendum est. cæterum eadem, quæ in alijs canceris, faciendæ sũt.

De carbunculo qui in cole nascitur.

Calescit etiam in cole interdum aliquid: idq; omni penè sensu caret: quod ipsum quoq; excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est: deinde ipse quoq; medicamentis urendus, maximeq; chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle, aut ouillo stercore & contrito cum eodem melle: ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quæ ad ora ulceris componuntur.

De testiculorum morbis, & eorum curatione.

In testiculis uero si qua inflammatio sine ictu orta est: sanguis ex talo mittendus est: à cibo abstinendum: imponendum ex faba farina ex mulso cocta cum cumino contrito ex melle cocto, aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto: aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici farina ex mulsa cocta cū cypresso, aut lilij radix contrita, aut si ijdē induruerunt, imponi debet lini uel fœni græci semen ex mulso coctum, aut ex cyprino ceratum, aut similia ex uino contrita, cui paulū croci sit adiectum. si uetustior iā durities est, maxime proficiat cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, dein contrita. si ex ictu tument, sanguinē mitti necessariū est, magisq; si etiā liuent. Imponendū uero utrūlibet ex his quæ cum cumino componuntur, supraq; proposita sunt.

LIBER

aut ea compositio, quæ habet nitti cocti. P. XI. resinæ pineæ, gummi, singulorum. P. XII. uisæ taminæ sine seminibus. P. XIII. mellis quantum sat sit ad ea coquenda: quod si ex ictu testiculis aliquid desit, ferè pus quoque increfcit, neque aliter succurri potest, quam si inciso scroto, et pus emissum, et ipse testiculus excisus est.

De rhagadijs, et Condylomate, et hæmorrhoidibus, alijsque ani morbis, et curationibus eorum, et primo de rhagadijs.

Nus quoque multa, tædijque plena mala recipit: nec in se multum abhorrentes curationes habet: at primum in eo sepe et quidem pluribus locis cutis exciditur. *ῥαγάδες* græci vocant, id si recens est: quiescere homo debet et in aqua calida desidere. Columblina quoque ova coquenda sunt, et ubi induruerunt, purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus sic, ut invicem utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut *ῥοσῶδες* rosa diluendum est, aut hyssopum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto: aut eidem cerato liquido plumulum elotum adiucendum: aut resinæ terebinthinæ myrrha: aut spumæ argenti vetus oleum: et quolibet ex his id perungendum: si quicquid læsum est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum super dandum est: et quicquid ante adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem casu neque acris abis utendum, neque asperis, nec alium comprimentibus: ne aridum quidem quicquid satis utile est: nisi admodum paulum: liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt: nino leni uti nihil prohibet.

De condylomate.

Condyloma autem est tuberculum: quod ex quadam inflammatione nasci solet: id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos, potionesque pertinet: eadem servari debent, quæ proxime scripta sunt: hujusdem etiam omnis recte tuberculum id fovetur. sed desidere ante homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimantibus: tum recte imponitur, et lenticula cum exigua mellis parte, et fertula campana ex uino cocta, et rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto: et cum eodem cerato contritum, vel cotoneum malum, vel malicorij ex uino cocti pars interior, et chalcitis cocta, atque contrita: deinde hyssopo, ac rosa excepta: et ex ea compositione, quæ habet thuris. P. XI. aluminis fissilis. P. XII. cerusæ. P. XIII. spumæ argenti. P. XV. quibus dum teruntur: invicem rosa et vinum instillatur. unculum autem ei loco linteolum, aut panniculus quadratus est: qui ad

qui ad duo capita duas ansas, ab altera uero parte totidem fascias habet, cumq; subiectus est, ansis ad uentrem datis à posteriore parte in eas adductæ fasciæ coniunguntur, atq; ubi artatæ sunt: dexteriori sinistra, sinisteriori dextra procedit, circumdatæq; circa aluum inter se nouissime nodo deligantur. sed si uetus condyloma iam induruit, neq; sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat: æruginis. P. XII. myrrhæ. P. XIII. gummi. P. XVIII. thuris. P. XXII. stibis: papaueris lacrymæ, acaciæ, singulorū. P. XXVI. quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus proxime dixi: renouant. si hoc parum in condylomate proficit: adhiberi possunt etiam uehementius adurentia. ubi consumptus est tumor: ad medicamenta lenia transeundum est.

De hæmorrhoidibus.

Eritum autem uitium est, ora uenarum tanquam ex capitis
 t. lis quibusdam surgentia: quæ sæpe sanguinem fundunt, ac
 uopporas græci uocant. idq; etiam in ore uulvæ foemina-
 rum incidere consuevit. atq; in quibusdam parum tuto suppressitur,
 qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt. habet enim purgatio-
 nem hanc non morbum: ideoq; curati quidā cum sanguinis exitum
 non haberent: inclinata in præcordia ac uiscera materia subitis, et
 grauissimis morbis correpti sunt. si cui uero id nocet, is desidere in
 aqua ex uerbis debet: imponere maxime malicorium cum aridis
 rosæ folijs contritum: aut ex his aliqua, quæ sanguinem suppressunt.
 Solet autem oriri inflammatio, maxime ubi dura alius eum locum
 læsit. tum in aqua dulci desidendum est, et id fouendum ovis: im-
 pendi uitelli cum rosæ folijs ex passo subactis: idq; si intus est, digito
 illinendum, si extra super illitum panniculum imponendum est. ea
 quoq; medicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea
 sunt. Cibis uero in hoc casu hisdem quibus in prioribus utendum est:
 si ista parum iuuat, solent imposita medicamenta adurentia, ea capi-
 tula absumere. ac si iam uetustiora sunt, sub auctore Dionysio inspar-
 genda sandaraca est, deinde imponendum, quod ex his constat: squa-
 mæ eris, auripigmenti: singulorum. P. XV. saxi calcis. P. XVIII. poste-
 ro die acui compungendum. adustus capitulis fit cicatrix: quæ sangui-
 nem fundi prohibet. sed quotiens is suppressus est, ne quid periculi
 afferat, multa exercitatione digerenda materia est. prætereaq; et ui-
 ris et foeminis quibus menstrua non proueniunt, interdum ex bra-
 chio sanguis mittendus est.

Aurelij Cor.

o iij

plapsus am
*

Si anus, uel os uulue procidit, qua curatione utendum sit.

T si anus ipse uel os uulue procidit, (nā id quoq; interdum
a fit) considerari debet purum ne id sit: quod prouolutū est,
an humore mucoso circumdatum. si purum est, in aqua de-
sidere homo debet, aut salsa, aut cum uerbenis uel malicorio cocta:
si humidum, uino austero subluendum est, illinendumq; fœc uini com-
busta. ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponē-
daq; plantago contrita, uel folia salicis in aceto cocta, tum linteolum
et super lana æque deliganda cruribus inter se deuinctis.

De ulcere fungo simili in ano.

Vngo quoq; simile ulcus in eadem sede nasci solet. id si hy-
f ems est, egelida, si aliud tempus, frigida aqua fouendū est.
deinde squama æris inspergenda, supraq; ceratū ex myr-
teo factū. cui paulū squamæ, fuliginis, calcis, sit adiectum. si hac rōne
nō tollitur: uel medicamentis uehementioribus, uel ferro adurendū est.

De digitorum ulceribus. Cap. XIX.

Igitorum autem uetera ulcera commodissime curantur, aut
d lycio, aut myrrha cocta: cū utrilibet uinum adiectum est. in
hisdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore cō-
suevit. *ἰσχυρὸν* græci appellant. oportet alumen melinum rotundum
in aqua liquare donec mellis crassitudinem habeat: tum quantum
eius aridi fiat, tantundē mellis insundere, et radicula miscere, do-
nec similis croco colore fiat, eoq; illinere. quidam ad eundem usum
decoquere simul malua solet: cū paria pōdera aluminis aridi et mel-
lis misuerint. si hac ratione ea nō exaderunt: excidēda sunt: deinde
digni fouēdi aqua ex uerbenis, imponendumq; sup medicamentum
ita factum. chalcitis, malicoriū, squama æris exapiuntur fœc pingui
leniter cocto ex melle. aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris
ignē nō experti par modus cerato miscetur ex myrteo factō. aut æris
ginis rase. P. XI. squamæ. P. XII. mellis cyatho coguntur. aut pares
portiones miscentur: saxi calcas, chalcitidis, auripigmenti. quicquid ho-
rum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est: tertio die
digitus resoluendus est. si quid aridi est, iterum excidendum, similisq;
adhibenda curatio est. si non uincitur, purgandus scalpello, tenuibusq;
ferramentis adurendus est: et sicut reliqua usta curandus est. at ubi
scabri unguis sunt, circum aperiri debent: qua corpus contingunt. tūc
super eos ex hac cōpositione æque imponi sandaracæ, sulphuris, sin-
gulorum. P. XII. nitri, auripigmenti, singulorum. P. XIII. resinae liq-
dæ. P. XVIII. tertioq; id die resoluendū est. sub quo medicamento ui-
ciosi unguis cadunt, et in eorum locum meliores renascuntur.

De chirurgia, & qui in ea claruerint, & qualis esse chirurgus debeat, & quid in hoc libro describatur.

Chirurgia

Ertiam esse medicinae partē: quae manu curet, & vulgo notum, & a me propositum est. ea non quidem medicamenta atq; uictus rationē omittit, sed manu tamen plurimum praestat. estq; eius effectus inter omnes medicinae partes euentissimus. siquidem in morbis cum multum fortuna conferat: eademq; saepe salutaria, saepe uana sint: potest dubitari secunda uoletudo medicinae, an corporis beneficio contigerit: in his quoq; in quibus medicamentis maxime utimur: quamuis profectus euentior est: tamen sanitatem & per haec frustra quaeri, & sine his reddi saepe manifestum est. sicut in oculis quoque deprehendi potest: qui a medicis diu uexati sine his interdum sanescunt. at in ea parte, quae manu curat, euident est, omnem profectum, ut aliquid ab alijs adiungetur, hinc tamen plurimum trahere. Haec autem pars, cum sit uetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicinae Hippocrate, quam a prioribus exulta est: deinde posteaquam diducta ab alijs habere profissores suos coepit, in aegypto quoque increuit Rhiloxeno maxime auctore, qui pluribus uoluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque, & Sostratus, & Hieron, & Apollonij duo, & Hammonius alexandrinus: multiq; alij celebres uiri singuli quaedam repperierunt. ac Romae quoque non mediocres profissores, maximeq; nuper Tryphon pater, & Euelpistus: & ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Megetes quibusdam in melius mutatis aliquantum ei disciplinae adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiae propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremescente, eaq; non minus sinistra, quam dextra promptus: acie oculorum acris: claraq; animo intrepidus, immisericors sic, ut sanari uelit eum quem accipit, non ut clamore eius motus, uel magis quam res desiderat: properet, uel minus quam necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex uagitibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri: quid huic parti proprie uendicandum sit: quia uulnere quoq; ulcerumq; multorum curationes, quas alibi executus sum: chirurgi sibi uendicant. ego eundem quidem hominem posse omnia ista praestare concipio. atque ubi se diuise-

runt, cum laudo, qui quàm plurimū percipit. Ipse autē huic parti, ea reliquit: in quibus unius facit medicus: non accipit: & in quibus unius, ulceribus, uel plus perfici manu, quàm medicamento credo. tū quicquid ad ossa pertinet: quæ deinceps exequi aggrediar, dilatisq; in aliud nolumen ossibus, in hoc cætera explicabo: præpositisq; his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent: transibo.

De luxatis. Cap. I.

I Vxata igitur in quacunque parte corporis sunt, quàm primum sic curari debent, ut qua dolor est, eà scalpello cutis crebro incidatur: detergaturq; eodem aduerso profluens sanguis. quod si paulo tardius subuenitur, iamq; etiam rubor est, quæ rubet corpus, si tumor quoq; accessit, quacunque is est, id optimum auxilium est. tum super danda reprimentia sunt, maximeq; lana succida ex aceto, & olco. quod si lenior is casus est: possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoq; maxime ex sarmentis. si is non est, quilibet alius ex aceto uel etiā ex aqua coactus.

De his, quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, & curanda sunt. Cap. II.

U Erum hoc quidem promptum est. in his autem negotium maius est, quæ per se uicio intus orto intumescunt, & ad suppurationem spectant. ea omnia genera abscessum esse aliàs proposui, medicamentaq; eis idonea executus sum. nunc superest ut dicam in hisdem, quæ manu fieri debeant. ergo priusquam incidant: cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet: quæ quicquid illuc malæ, corruptæq; materiæ coijt: extrahat, idq; iterū, tertioq; recte fit, donec omne inditum inflammationis excidat. neq; tamen fas non est nihil cucurbitula agere. interdum enim sed raro quicquid abscedit, uelamento suo includitur. id antiqui tunicam nominabant. Meges quia tunica omnis nervosa est: dicit non nasci sub eo uicio nervum: quo atro consumeretur, sed subiecto iam uetustiore pure callum circumdari. quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet. neq; ulla res prohibet, etiam si callus est: tamen quia cingit: tunicam nominari. tum pure quoq; maturior hæc interdum esse cōsuevit. ideoq; quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutauit. ergo siue id inci-

dit, siue iam durities est: in hac auxilij nihil est. & ut alias scripse-
uel auertenda concurrens eò materia, uel digerenda, uel ad maturi-
tatem perducenda est. si priora contigerunt, nihil præter ea necessa-
rium est. si pus maturuit, in alis quidem, & in inguinibus raro secū-
dum est. item ubicunq; mediocris abscessus est. item quotiens in sum-
ma cute, uel etiam carne uitium est: nisi festinare curantis imbecilli-
tas cogit. satisq; est cataplasmata efficere, ut per se pus aperiatur:
nam ferè sine cicatrice potest esse is locus: qui expertus ferrum non
est, si autem altius malum est, considerari debet nervosus ne is lo-
cus sit: an non sit. nam si sine nervus est, cunctis ferramento ape-
riri debet. cuius hæc gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus eno-
candū patet: paruaq; postea cicatrix fit. at si nervi iuxta sunt: ignis
alienum est: ne uel distendantur hi, uel membrum debilitent. necessa-
ria uero opera scalpelli est. sed cætera etiam subcruda aperiri pos-
sunt. inter nervos uero ultima expectanda maturitas est: quæ cutem
extenuet: eiq; pus iungat: quo propius reperiatur. itemq; alia rectam
plagam desiderant in carne. quia ferè uehementer cutem extenuat.
tota ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi scalpellus admoue-
tur, id agendum est, ut quàm minimæ, & quàm paucissimæ plagæ
sint. cum eo tamen, ut necessitati succurramus, & in modo & in nu-
mero. nam maiores sinus latius, interdum etiam duabus aut pluri-
bus lineis incidendi sunt. dandaq; opera ut inuis sinus exitum ha-
beat, ne quis humor intus subsidat, qui proxima & adhuc sana ro-
dendo sinuet. est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit:
nam ubi post longos morbos totus corporis habitus uitiatu est, lateq;
se sinus diffudit, & in eo pars cutis pallet: scire licet eam iam emor-
tuam esse, & inutilem futuram. ideoq; excidere commodius est. ma-
xime si circa articulos maiores id euenit, cubantemq; ægrum flu-
ens aluus exhaurit: neq; per alimenta quicquam corpori accedit. sed
excidi ita debet, ut plaga ad similitudinem myrtei folij fiat, quo fa-
cilis sanescat. idq; perpetuum est. ubicunq; medicus ex quacunque
causa cutem excidit, pure effuso in alis, uel inguinibus, linamento opus
non est. spongia ex uino imponenda est. in cæteris partibus si æque
ea linamenta superna sunt: purgationis causa paulum mellis in-
fundendum, dein glutinantia super danda. si illa necessaria sunt:
super ea quoq; similiter dari spongia eodem modo ex uino expressa
debet. quando autem linamenti opus sit: quando nō sit: alias dictum
est. cætera eadem incisa suppuratione facienda sunt. quæ ubi per me-
dicamenta rupta est, facienda esse proposui.

LIBER

De bonis, malis'ue signis exluceratorum.

Cap. III.

P Rotinus autem quantum curatio efficiat, quantumq; aut spe-
rari, aut timeri debeat: ex quibusdam signis intelli- po-
test: fereq; hisdem, quæ in vulneribus exposita sunt. nam
bona signa sunt: somnum capere: facile spirare: siti non confici: cibum
non fastidire, si febricula fuit, ea uacare: itemq; habere pus albū, leue,
nō fædi odoris. Mala sunt, uigilia, spiritus grauitas: sitis: cibi fastidiū:
febris: pus nigrum, aut feculentum & fædi odoris. Item procedente
curatione eruptio sanguinis, aut si antequam sinus carne impleatur,
oræ carnosæ fiunt. illa quoq; ipsa carne hebetē nec firma deficere ta-
men animam uel ipsa curatione uel postea: pessimum omnium est. quin
etiam morbus ipse siue subito solutus est: deī suppuratio exorta est,
siue effuso pure permanet non iniuste terret. Est q; inter causas timo-
ris: si sensus in uulnere rodentiū non est. sed ut hæc ipsa fortuna huc
illuc'ue discernit: sic medici partium est: eniti ad reperiendam sanita-
tem. ergo quotiens ulcus resiliuerit: eluere id: si reprimendus humor ui-
debitur: uino ex aqua plumiati mixto, uel aqua in qua lentācula
cocta sit, debebit. si purgandum erit, mulso, rursusq; imponere eadē.
ubi iam repressus uidebitur humor ulcusq; purum erit, produci car-
nem conueniet et foueri uulnus pari portione uini ac mellis. superq;
imponi spongia ex uino & rosa tincta. per quæ cum adro produca-
tur: plus tamen, ut aliās quoq; dixi, uictus ratio eō confert. id est solu-
tis iam febribus, & cibi cupiditate reddita: balneum rarum. cotidia-
na, sed lenis gestatio, cibi, potionesq; corpori reficiendo. apteq; omnia
quæ per medicamenta suppuratione quoq; rupta sequuntur sed quia
magno malo uix sine ferro mueri licet: in hūc locū reseruata sunt.

De fistulis. Cap. IIII.

A Duersus fistulas quoq; si altius penetrant ut ad ultimas de-
mitti collirium non possit, si tortuose sunt, si multiplices,
maius in manu quam in medicamenti præsidium est: mi-
nusq; operæ est: si sub cute transuersæ feruntur, quam si rectæ intus
tendunt. igitur si sub cute transuersa fistula est: demitti specillum de-
bet, supraq; id ea incidi, si flexus reperiuntur, hi quoq; simul specil-
lo & ferro persequendi sunt. idemq; faciendum, si plures se quasi ra-
muli ostendunt. ubi ad fines fistulæ uentum est, excidendum ex toto
callus est, superq; fibulæ dandæ: & medicamentum quo glutinetur:

at si recta subter tendit, ubi quo, maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis incienda est, et æque glutinantia medicamenta super danda sunt. aut si corruptius ulcus, quod interdum osse uitiatum fit, ubi id quoque curatum est: pus monētia. solent autem inter costas fistulae subter exire. quod ubi incidit, eo loco costa ab utraq; parte decidenda, et eximenda est, nequid intus corruptum relinquatur. solent, ubi costas transierunt, septum id, quod transversum à superioribus visceribus intestina discernit: violare. quod intelligi et ex loco, et ex magnitudine doloris potest: et quia nonnunquam spiritus eò, cum humore quasi bulla intus prorumpit, maximeque si hunc ore ille continuit. in eo medicaminis locus nullus est. in cæteris uero quæ circa costas sanabilia sunt: pingua medicamenta inimica sunt. ceteris, quæ ad vulnera accommodantur, uti licet. optime tamen siat linimenta, uel si purgandum aliquid uidetur, in melle tincta imponuntur. uentri nullum os subest: sed ibi perniciosè admodum fistulae fiunt, adeo ut Sostratus insanabiles esse crediderit. id nò ex toto ita se habere usus ostendit. et quidē quod maxime mirum uideri potest: tutior fistula est contra iecur, et lienem, et uentriculum, quam contra intestina, non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locum faciat. cuius experimento moti quidam auctores parum modum rei cognouerunt. nam uentre sepe etiam telo perforatur, pro lapsaq; intestina conduntur, et oras uulneris suturae comprehendunt. quod quemadmodum fiat mox indicabo. itaq; etiam ubi tenuis fistula abdomen perfrumpit: excidere eam licet. suturaq; oras coniungere. si uero ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna ui, utiq; ab interiore parte sui non potest, qua quasi membrana quædam finit abdomen: quam *περιτόνειον* greci uocant. ergo ubi aliquis ingredi ac moueri cœpit: rumpitur illa sutura, atq; intestina soluantur. quo fit ut pereundum homini sit. sed non omni modo res ea desperationem habet. ideoq; tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

De ani fistulis.

Propriam etiam animaduersionem desiderant ea, quæ
 p in ano sunt. in has demisso specillo ad ultimum eius caput
 incidi cutis debet: dein nouo foramine specillum educa lino
 sequente: quod in aliam eius partem ob id ipsum perforatum conie-
 ctum sit. ibi limum prehendum, uinciendumq; cum altero capite est,
 ut laxè autem, quæ super fistulam est, teneat. idq; limum esse debet

crudum & duplex, triplex ue, sic tortum ut unitas facta sit. Interim autem licet negotia agere, ambulare, lauare, cibū capere perinde atq; sanissimo. tantummodo id līnum bis die saluo nodo ducendum est sic, ut subeat fistulam pars, quæ superior fuerit. neq; committendum est ut id līnum putrescat. sed tertio quoq; die nodus resoluendus est, et ad caput alterum, recens līnum alligandum est, eductoq; uetere, id in fistula cum simili nodo relinquendū. sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est: incidit, simulq; & id sanescit, quod à lino relictū est, & id quod ab eo mordetur: inciditur. hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est. qui festinat, astringere cutem lino debet, quo celerius fecit, noctuq; penicillo tenuia quædam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur: quod extenditur: sed hæc dolorem mouent. adijciatur celeritati sicut tormento quoque: si et līnum, & id quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinatur ex ijs, quibus callum exedi posui. poterit tamen fieri ut ad scalpelli curationem etiam illò loci ueniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est: igitur in hæc genera demisso specillo duabus lineis incidenda cutis est: ut media inter eas habundula tenuis admodum eijciatur, ne protinus ora coeant: sitq; locus aliquis linamentis: quæ quàm paucissima super iniicienda sunt, omniaq; eodem modo facienda, qui in abscessibus positus est. si uero ab uno ore plures sinus erunt: recta fistula scalpello erit incidenda, ab eo ceteræ, quæ iam patebunt lino excipiendæ. si intus aliqua procedet: quo ferrum tuto peruenire non poterit: collirium demittendum erit. cibus autem in omnibus eiusmodi casibus, siue manu, siue medicamentis agatur: dari debet humidus: potio liberalis, diuq; aqua ubi iam caro increscit. tum demum & balneis raris utendum erit, & cibis corpus implentibus.

De telis è corpore extrahendis. Cap. V.

Ela quoq; quæ illata corporibus intus hæserunt: magno negotio sæpe eijciuntur. suntq; quædam difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus in quas illa penetrarunt omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua uenit, aut ab ea, in qua tetendit. illic uiam, qua redeat: ipsum sibi fecit. hic à scalpello accipit. nam contra mucronē atro inciditur. sed si non altè telū insedit, et in summa carne est, aut certe magnas uenas, et loca nervosa non transiit, nihil melius est: quàm qua uenit id euellere. si uero plus est p quod telo reuertendū quàm quod perrupendum est: iamq; uenas, nervosq; id transiit: commodius est aperire quod superest, eaq; extrahere. nam & propius petitur, et tutius euellitur, et in maiore

membro si medium mucro trāsīt, facilius sanescit, quod peruium est.
 quia utrinq; medicamento fouetur: sed si retro telum recipiendum est:
 amplianda scalpello plaga est: quo facilius id sequatur: quoq; minor
 oriatur inflammatio, quæ maior fit: si ab illo ipso telo dum redit,
 corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur: laxius esse
 debet, quàm ut telo postea transeūte ampliatur. Summa autem utraq;
 parte ita habenda cura est, ne nervus, ne uena maior, ne arteria inci-
 datur. quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso
 est, abducendumq; scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum eximē-
 dum est: tum quoq; eodem modo, & eadē cura habita, ne sub eo, qđ
 eximetur, aliquid eorum lædatur: quæ tuenda esse proposui. Hæc cō-
 munia sunt: propria quædam in singulis telorum generibus subiiciē-
 da sunt: quæ protinus subiiciam: nihil tam facile in corpore quàm sa-
 gutta conditur, eademq; altissime insedit. hæc autem eueniunt, et quia
 magna ui fertur illa, & quia ipsa in angusto est. sæpius itaq; ab al-
 tera parte, quàm ex qua uenit, recipienda est: præcipueq; quia ferē
 spiculis cingitur, quæ magis laniant, si retro, q̄ si contra trahuntur:
 sed inde aperta uia caro diduci debet ferramento ad similitudinem
 facti græcæ litteræ 4. Deinde ubi apparuit: si mucro, si harundo in-
 heret propellenda est, donec ab altera parte apprehendi et extra-
 hi possit: si iam illa decidit, solumq; intus ferrum est, mucro uel digi-
 tis apprehendi, uel forfice, atq; ita educi debet: neq; alia ratio extra-
 hendi est, ubi ab ea parte qua uenit, euelli magis placuit: nam am-
 pliatio uulnere aut harundo, si inest, euellenda est, aut si ea non est,
 ferrum ipsum: quod si spicula apparuerunt, eaq; breuia & tenuia
 sunt: forfice ibi comminui debent, uacuumq; ab his telum educi, si ea
 maiora, ualentioraq; sunt, fissis scriptorijs calamus cōtegenda: ac ne-
 quid lacerent, sic euellenda sunt. & in sagittis quidem hæc obserua-
 tio est. Latum uero telum si conditum est, ab altera parte educanō ex-
 pedit, ne ingenti uulnere, ipsi quoq; ingens uulnus adiiciamus. euellē-
 dum est ergo genere quodam ferramenti, quod diocleum græci gra-
 phiscum uocant: quoniam auctorem Dioclen habet: quem inter pri-
 scos, maximosq; medicos fuisse iam posui. Lamina uel ferrea, uel ænea
 etiam ab altero capite duos utrinq; deorsum conuersos uncōs habet:
 ab altero duplicata alteribus, leuiterq; extrema in eam partem in-
 clinata, quæ sinuata est: insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perfo-
 rata est: hæc iuxta telum transuersa demittitur. deinde ubi ad imum
 mucronem uentum est: paulum torquetur, ut telum foramine suo exci-
 piat. cum in cauo mucro est, illico duo digiti subiecti partis alterius
 unās simul & ferramentum id extrahunt, et telum. Tertium genus

LIBER

telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute integrū intus insedit. in omnibus his latius vulnus aperiendum, idq; quod inest, ea qua uenit, forfice extrahendum est. Accedit uero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum uel ossi inhæsit, uel in articulo se inter duo ossa demersit: in osse usq; eo mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit: Et tum uel manu, uel forfice telum extrahendum est: quæ ratio in dentibus quoq; eijciendis est. Et uix unq; ita telum non sequitur. sed si morabitur, excuti quoq; ictum aliquo ferramento poterit. Vltimū est, ubi nō euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoq; foramine ad speciem littere † contra telum os excadere sic, ut lineæ quæ diducuntur, ad telum spectent. eo facto id necesse est labet, Et facile auferatur. Inter duo uero ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fascijs habenis'ue deliganda, Et per has in diuersas partes diducenda sunt, ut nervos distendant. quibus extētis laxius inter ossa spaciū est, ut sine difficultate telum recipiatur. illud uidendum est, sicut in alijs locis posui, ne quis nervus, aut uena, aut arteria à telo ledatur: dum id extra itur: eadem scilicet ratione quæ supra posita est. at si uenenato quoq; telo quis ictus est: hysdem omnibus si fieri potest etiam festinantius actis adijcenda curatio est: quæ uel epoto ueneno, uel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius extracto telo medicina non alia est, quàm quæ esset si corpore icto nihil inhæsisset. de qua satis alio loco dictum est.

De ganglijs, Et meliceride, Et atheromate, Et steatomate
capitis tuberculis. Caput VI.

h Acc uenire in qualibet parte corporis possunt. reliqua certas sedes habent: de quibus dicam orsus à capite. in hoc multa. uariaq; tubercula oriuntur: ganglia, meliceridas, et atheromata nominant: alijsq; etiam num uocabulis quædam alij discernunt, quibus ego steatomata quoq; adijciam. quæ quamuis Et in ceruice, Et in alis, et in lateribus oriri solent: per se tamen non posui, cum omnia ista mediocres differentias habeant: ac nec periculo terreant, neq; diuerso genere curentur. Omnia autem ista Et ex paruulo incipiunt, Et diu, paulatimq; increscunt: Et tunica sua includuntur: quædam ex his dura, ac renitentia: quædam mollia, cedentiaq; sunt, quædam spacio nudantur: quædam tecta capillo suo permanent: ferèq; sine dolore sunt. quid intus habeāt, ut coniectura præsagiri potest, sic ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest. maxime tamen in his quæ renitentur, aut lapillis quædam similia, aut concreti, confertiq;

pili reperiuntur. In his uero quæ cedunt, aut melli simile aliquid, aut tenui pulcra, aut quasi rase cartilagini, aut carni hebeti, & cruentæ: quibus aliqui colores esse consuerunt. ferèq; ganglia renituntur. atheromati subest quasi tenuis pulcra. meliceridi liquidior humor: ideoq; pressum circumfluit. steatomati pingue quiddam, idq; latissime patere consuevit, resoluitq; totam cutem superpositam sic, ut ea labet, cum in cæteris sit astrictior. omnia derasa ante si capillis continguntur, per medium oportet incidere: sed steatomatis tunica quoq; secunda est, ut effundatur quicquid intus coit: quia non facile à cute subiecta carne ea separetur: in cæteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba, & intenta se ostendit. tum scalpelli manubriolo diducenda à cute, & carne est: eijciendaq; cum eo quod intus tenet. si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus inhæsit, ne is lædatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. ubi tota exempta est, committendæ oræ, fibulaq; his iniicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. ubi uel tota tunica, uel aliquid ex ea relictum est: pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum uicijs quæ scalpello, & manu curantur. Cap. VII.

Ed ut hæc neq; genere uicij, neq; ratione curationis inter se multum distant sic, in oculis quæ manum postulant, et ipsa diuersa sunt, & aliter, aliterq; curantur. igitur in superioribus palpebris uesciæ nasci solent pingues, grauesq; quæ uix attollere oculos sinunt: leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Ferè uero in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atq; ita cute intenta, scalpello transuersam lineam incidere, suspensa leniter manu, ne uesciæ ipsa uulneretur: & ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat: tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere: facile autem sequitur. dein super ungi collirio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi super inunguntur. paucissimisq; diebus cicatrix la inducitur. molestius est ubi incisa uesciæ est. Effundit enim humore: neq; postea quia tenuis admodum est, potest colligi: si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

De crithe tuberculo palpebrarum.

i Ne eadem palpebra super pilorum locum tuberculū paruum nascitur, quod à similitudine ordeï à græcis *oripion* nominatur. tunica quiddam quod difficulter maturescit cōprehensum est. id uel calido pane, uel cera subide calefacta foueri oportet

LIBER

sic ne nimius is calor sit: sed facile ea parte sustineatur. hac enim ratione sepe discutitur: interdum concoquitur: si pus se ostēdit, scalpello diuidi debet, & quicquid intus humoris est, exprimi. Eodem deinde napore postea quoq; foueri, & super inungi, donec ad sanitatem perueniat.

De chalaſia palpebrarum.

Lia quoq; quedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur: sed neq; utiq; figuræ eiusdem, & mobilia simul, atq; digito huc uel illuc impelluntur: ideoq; ea χαλαſία uocant. hæc incidi debent: si sub cute sunt ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiori. dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt: ac si intus plaga est: inungendū primo lenibus: deinde acrioribus. si extra, super dandum emplastrum, quo id glutinetur.

De ungue oculorum, quod μέγριον à græcis uocatur.

Unguis uero, quod μέγριον græci uocant: est membranula nervosa oriens ab angulo, quæ nonnunquam ad pupillam quoq; peruenit, eiq; officit. sæpius à narium, interdum etiā à temporum parte nascitur. hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur: si inueterauit, iamq; ei crassitudo quoq; accessit: excidi debet. Post abstinentiam uero unius diei, uel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, uel sic aduersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. quidam si in sinistro oculo uicium est, aduersum. si in dextro: resupinum collocari uolunt. alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico: sed ab hoc: si ille aduersus est. inferiorem. si supinus: superiorem. tum idem medicus hamulum acutum paulum nucrone intus recuruato subijcere extremo ungui debet, eumq; infingere, atq; eā quoq; palpebram tradere alteri, ipse hamulo apprehenso lenare unguem, eumq; acui traicere linum trahente: deinde acum ponere: lini duo capita apprehendere, & per ea erecto ungue si qua parte oculo inhaeret manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulū ueniat: deinde inuicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. duplex enim periculum est: ne uel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum nix ullam recipiat curationem, uel ex angulo quoq; atruncula abscidatur, quæ si uehementius unguis ducatur, sequitur, ideoq; decipit: ac si abscissa est, pateſcat foramen: per quod postea semper humor descendit pu-

τάδ'α

radix graci vocant. Verus ergo anguli finis utiq; noscendus est, qui ubi satis constitit, non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus est: deinde excidenda ea membranula, ne quid ex angulo lædatur. Eo deinde ex melle linamentum super addum est: supraq; linteolum, & aut spongia, aut lana succida, proximisq; diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebre glutinentur. siquidem id quoq; tertium periculum accedit: eodemq; modo linamentum imponendum, ac nouissime inungendum collirio, quo ulcera ad cicatricem perducantur: sed ea curatio uerna esse debet, aut certe ante hyemem: de qua re ad plura loca pertinente semel dixisse satis erit. nam duo genera curationum sunt. alia in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit, sicut in vulneribus, & in fistulis. alia in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum, & facile est: sicut euenit in ijs, quæ & tarde increscunt, & dolore non cruciant: in his uer expectandum est. aut si quid magis pressit, melior tamen autumnus uel æstas, quàm hyems est. atq; is ipse medius, iam fractis æstatibus, nondum ortis frigoribus. quo magis autem necessaria pars erit quæ tractabitur, hoc quoq; maiori periculo subiecta est. et sæpe quo maior plaga facienda, eo magis hæc temporis ratio seruabitur.

De enchanti tuberculo.

e X curatione uero unguis ut dixi, uicia nascuntur: quæ ipsa alijs quoq; de causis oriri solent. interdum enim fit in angulo, parum ungue exaso, uel aliter tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur, & *Xartris* græce nominatur. excidi hamulo, & circumcidi debet, hic quoq; diligenter temperata manu, ne quid ex ipso abscedat. tum exiguum linamentum respergendum est uel cadmia, uel atramento sutorio: inq; eum angulum ductis palpebris inserendum: supraq; eodẽ modo deligandum. proximisq; diebus similiter nutriendum tantum, ut primis aqua egelida, uel etiam frigida foveatur.

De ancyloblepharo oculorum vicio.

i Nterdum inter se palpebræ coalescunt: apeririq; non potest
oculus. cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebræ cum
albo oculi cohærescant: scilicet cum in utroq; fuit ulcus ne-
gligenter curatum. sanescendo enim quod diduci potuit, et debuit, glu-
tinabit: ἀρροσθιζπος sub utroq; uicio græci uocant. Palpebræ tan-
tum inter se cohærentes non difficulter diducuntur, sed interdum fru-

Aurelij Cor.

P

stra: nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet: quia bene res
 sæpius cedit. igitur aduersum specillum inferendum, diducendæq; eò
 palpebræ sunt, deinde exigua penicilla interponenda, donec exulce-
 ratio eius loci finiatur. at ubi albo ipsius oculi palpebra inhæsit:
 Heraclides tarentinus auctor est, aduerso scalpello subsecare magna
 cum moderatione, ut neq; ex oculo, neq; ex palpebra quicquam absci-
 datur. ac si necesse est, ex palpebra potius. post hæc inungatur oculus
 medicamentis, quibus aspritudo curatur: quotidieq; palpebra uerta-
 tur, non solum ut ulceri medicamentum inducatur, sed etiam ne rur-
 sus inhæreat, ipsiq; etiam præcipiatur, ut sæpe eā duobus digitis at-
 tollat. ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoq; multa
 tentasse, neq; unq; profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhæ-
 serit, memoriæ prodit.

De ægylopa fistula oculorum.

Tiam num in angulo, qui naribus propior est, ex aliquo ui-
 cio quasi parua fistula aperitur, per quam pituita assidue
 desillat. αἰνύλωα græci vocant: idq; assidue male habet ocu-
 lum: nonnunquam etiam exeso osse usq; ad nares penetrat, idq; in-
 terdum naturam carcinomatis habet. ubi intentæ uenæ et recurua-
 tæ sunt: color pallet: cutis dura est, et leui tactu irritatur: inflama-
 tionemq; in eas partes, quæ coniunctæ sunt: euocat. ex his eos, qui qua-
 si carcinoma habent, curare periculosum est. nam mortem quoq; ea
 res maturat. eos uero quibus ad nares tendit, supernacuum, neq; enim
 sanescunt. at quibus id in angulo est: potest adhiberi curatio, cum eo
 ne ignotum sit, esse difficilem: quantoq; angulo propius id foramen
 est, tanto difficilior est. quoniam per angustum est in quo uersari ma-
 nus possit. recenti tamen remedi facilius est. sed hamulo summum
 eius foraminis excipiendum: deinde totum id cauum, sicut in fistulis
 dixi, usq; ad os excidendum, oculoq; et cæteris iunctis partibus bene
 obtectis, os ferramento adurendum est uehementius. quod si iam carie
 uexatum est, quo crassior his squama accedat, quidam adurētia im-
 ponunt, ut atramentum sutorium, uel chalcididem, uel æruginem ra-
 sam: quod et tardius et non idem facit. osse adusto curatio sequitur
 eadem, quæ in cæteris uestis.

De pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Illi uero, qui in palpebris sunt duabus de causis oculum irri-
 tare consueverunt. nam modo palpebræ superioris summa
 cutis relaxatur et procidit. quo fit ut eius pili ad ipsum oculum con-

uertantur: quia non simul cartilago quoque se remissu modo subordi-
 natur ali pilorum alius ordo subcreſcat, qui protinus intus ad oca-
 lum tendit. curationes, hæ sunt. si pili nati sunt qui non debuerunt: te-
 nuis acis ferrea ad similitudinem hastæ lata in ignem coniuncta est.
 deinde candens sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in conspe-
 ctum curantis ueniant, sub ipsis pilorum radiabus ab angulo mi-
 mittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ transueat. deinde ite-
 rum, tertioque usque ad alterum angulum. quo fit ut omnes pilorum ra-
 dices adustæ emoriantur. tum superimponendum medicamentum est,
 quod inflammationem prohibeat. atque ubi crustæ exciderunt, ad a-
 ttricem perducendum. facillime autem id genus sanescit. quidam autem
 acui transiuxta pilos in exteriorē partem palpebræ oportere, eamque
 transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem, atque ubi acis tra-
 sisset, in ipsius capilli sinum, qua duplicatur, pilum esse coniungendum, et
 per eum in superiorem palpebræ partem attrahendum, ibique corpo-
 ri agglutinandum, et imponendum medicamentum, quo foramen
 quoque glutinetur. sic enim fore ut his pilus in exteriorē partem po-
 stea spectet. id primum fieri non potest nisi in pilo longiore, cum fe-
 re breues eo loco nascantur. deinde si plures pili sunt, necesse est lon-
 gum tormentum: cum totiens acis transuet, magnam inflammationē
 moueat. Nonissime cum humor aliquis ibi subsit, oculo et ante per
 pilos, et tum per palpebræ foramina affecto, nix fieri potest ut glu-
 ten quo uinctus est pilus, non resoluitur. eoque fit ut is, eo unde ut ab-
 ductus est: redeat ea uero curatio, quæ palpebræ laxioris ab omni-
 bus frequentatur, nihil habet dubij. siquidem oportet contacto oculo
 mediam palpebræ autem, siue ea superior, siue inferior est: apprehē-
 dere digitis, ac leuare. tum considerare quantulo detracto futurum
 sit, ut naturaliter se habeat. siquidem hic quoque duo pericula circun-
 stant. si nimium fuerit excisum, ne contegi oculus non possit. si parum,
 ne nihil actum sit, et frustra sectus aliquis sit. qua deinde inciden-
 dum uidebitur, per duas lineas atramento notandum est sic, ut de in-
 teriore, quæ pilos continet et propiore ei linea aliquid relinquatur,
 quod apprehendere acis postea possit. his constitutis scalpellus adhi-
 bendus est. et si superior palpebra est: ante: si inferior, postea propi-
 us ipsis pilis incidendum. initiumque faciendum in sinistro oculo, ab eo
 angulo, qui tempore in dextro, ab eo qui naribus propior est, idque, quod
 inter duas lineas est. excidendum. deinde oræ uulneris inter se sim-
 pliciter sutura committendæ, operiendusque oculus est, et si parum pal-
 pebra descendet, laxanda utique. si nimium, aut astringenda, aut etiam
 rursus tenuis habentula ab ulteriore ora excidenda. ubi secta est, alia

LIBER

sutura adiicienda, quæ supra tres esse non debent. præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte ducti pili sursum spectent. idq; si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. inferior palpebra eo non eget. his factis sponsa ex aqua frigida expressa super deliganda est. postero die glutinans emplastrum injiciendum. quarto sutura tollenda est: & collirio, quod inflammationes reprimat, superinungendum.

De lagophthalmo oculorum.

n **N**onnumquam autem nimium sub hac curatione excisa cute evenit ut oculus non contegatur. idq; interdum etiam alia de causa fit: *αροφθαλμος* greci appellant. in quo si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest. si exiguum, mederi licet: paulum infra supercilium cutis incidenda est, lunata figura cornibus eius deorsum spectantibus. altitudo esse plagæ usq; ad cartilaginem debet, ipsa illa nihil læsa. nam si ea inassa est, palpebra concidit: neq; attolli postea potest. cute igitur tantum ducta fit, ut paulum in ima oculi ora descendat: hiantem scilicet super plagam, in quam lina-mentum coniiciendum est: quod & coniungi ductam autem prohibeat: & in medio carunculam citet: quæ ubi eum locum implevit, postea recte oculus operitur.

De ectropio.

n **T** superioris autem palpebræ vitium est, quod parum descendit, ideoq; oculus non contegit: sic inferioris, quod parum sursum attollitur, sed pendet, & hiat, neq; potest cum superiore committi. atq; id quoq; evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute: *εκτροπιο* greci vocant. si ex mala curatione est, eadem ratio medicinæ est, quæ supra posita est: plagæ tantum cornua ad maxillas non ad oculum convertenda sunt. si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum. at quarto die uapore aquæ calidæ fovendum, inungendumq; medicamentis ad cicatricem perducentibus.

De staphylomate oculi.

h **N**ec ferè circa oculum in angulis, palpebrisq; incidere consuerunt. in ipso autem oculo nonnumquam summa attollitur tunica siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & si-

milis figura acino fit. unde id $\sigma\alpha\upsilon\lambda\omega\mu\alpha$ græci uocant. curatio duplex est. altera ad ipsas radices per medium transuere, ac duo linea discente. deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex interiore astringere inter se: quæ paulatim secundo id excidunt. altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere: deinde spodium, aut cadmiā inficere. utrolibet autem facto album omī lana excipiendum & imponendum, posteaq; uapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis ungendus est.

De clauis oculorum.

Clauis autem uocantur, callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figuræ similitudine est. hos ad imam radicem perforare ac commodissimum est, infraq; eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

De natura oculorum, & eorum suffusione.

Suffusionis iam aliâs feci mentionem, quia cum recens incidit, medicamentis quoq; sæpe discutitur: sed ubi uetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. de qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. cuius cognitio cum ad plura loca pertineat, tum uel præcipue ad hunc pertinet. is igitur summus habet duas tunicas: ex quibus superior à græcis $\kappa\epsilon\pi\alpha\tau\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$ uocatur. ea, qua parte alba est satis crassa: pupillæ loco extenuatur. huic interior adiuncta est media parte: qua pupilla est: modico foramine concava, circa tenas ulteriores partibus ipsa quoq; plenior. quæ $\chi\omicron\phi\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$ à græcis nominatur. hæ duæ tunice cum interiora oculi cingant: rursus sub his coeunt: extenuataeq; & in unum coactæ per foramen quod inter ossa est: ad mēbra nam cerebri perueniunt, eoq; inherescunt. sub his autem, qua parte pupilla est, locus uacuus est. deinde infra rursus tenuissima tunica quam Herophilus $\alpha\pi\alpha\chi\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$ nominauit. Ea media subsidit, eoq; cauo continet quiddam, quod à uitri similitudine $\upsilon\alpha\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$ græci uocant. id neq; liquidum, neq; aridum est: sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color uel niger est, uel cæsius, cum summa tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiore parte membrana la includit. sub his gutta humoris est omī albo similis, à qua uidendi facultas proficiſcitur, $\mu\upsilon\varsigma\alpha\lambda\lambda\omicron\epsilon\iota\delta\epsilon\varsigma$ à græcis nominatur. igitur uel ex morbo, uel ex ictu concreſcit humor sub duabus tunicis, qua locum uacuum esse proposui: usq; paulatim indureſcens interiori potentiæ se opponit. uicijq; eius plures species sunt: quedam sanabiles: quedam

Aurelij Cor.

p iij

quæ curationem non admittunt. nam si exigua suffusio est, si immobilis: colorem uero habet marinæ aquæ, uel ferri nitentis, & à latere sensum aliquem fulgoris relinquit spes super est. si magna est, si nigra pars oculi amissa naturali figura in aliam uertit, si suffusioni color ceruleus est, aut auro similis, si labat, & hac, atq; illac mouetur, uix unquam succurritur. ferè uero peior est: quo ex grauiore morbo, maioribus uel capitis doloribus, uel ictu uehementiore orta est, neq; idonea curatio, si senilis ætas est, quæ sine nouo uicio tamen acie hebetem habet. at ne puerilis, quidem, sed inter hæc media ætas. oculus quoq; curationi neq; exiguus, neq; conatus, satis oportunus est, atq; ipsius suffusionis, quædam maturitas est. expectandum igitur est donec iam non fluere, sed durities quædam concreuisse uideatur. ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet: pridie ab omnibus abstinere. post hæc in aduerso sedili collocandus est loco lucido, lumine aduerso sic: ut contra medicus paulo altius sede at. à posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, & immobile id præstet. nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. quin etiam ipse oculus qui curabitur: immobilior faciendus est, super alterum lana imposita & deligata. curari uero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. tum acus admouenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaq; demittenda: sed recta est per summas duas tunicas medio loco inter nigrum oculi, & angulum tempori propiorem è regione mediæ suffusionis, sic ne quæ uena lædatur. neque tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur, ad quem cum uentum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest: quia prementi nihil renititur. ubi eò uentum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est, leuiterq; ibi uerti, & paulatim eà deducere infra regionem pupillæ debet. ubi deinde eam transit uehementius imprimi, ut inferiori parti insidat. si hæsit, curatio expleta est. si subinde redit, eadē acu magis concidenda, & in plures partes dissipanda est: quæ singulæ & facilius conduntur, & minus late offiunt. post hæc educenda acus recta est, imponendumq; est lana molli exceptum oui album, & supra: quod inflammationem coerceat: atque ita deuinciendum. post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium mediatamentorum inunctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primum liquido, ne maxillæ laborent, deinde inflammatione finita tali, qualis in uulneribus propositus est. quibus, ut aqua quoq; diutius bibatur, necessario accedit.

E pituitæ quoq; tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus
 d medicamentis agendum est, iam explicui. nunc ad ea ueni-
 am: quæ curationem ex manu postulant. animaduertimus
 autem quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore te-
 nuî madere, quæ res aspritudinem continuat, ex leuibus momētis in-
 flammationes et lippitudines excitat, totam deniq; uitam hominis in-
 festat. idq; in quibusdam nulla ope adiunari potest, in quibusdam sa-
 nabile est. quod primum discrimen est nosse oportet, ut alteri succur-
 ratur, alteri manus non iniiciatur. ac primum supernacua curatio
 est in his, qui ab infantibus id uicium habent, quia necessario mansu-
 rum est usque ad mortis diem: deinde non necessario etiam in his, q-
 bus non mulat, sed acris pituita est. si quidem manu nihil adiunatur.
 medicamentis & uictus ratione, quæ crassiorem pituitam reddit, ad
 sanitatem perueniunt. lata etiam capita uix medicinæ patent. tum in-
 ter est uenæ pituitam emittant: quæ inter caluariam & cutem sunt,
 an quæ inter membranam cerebri & caluariam. superiores ferè
 per tempora oculos rigant: inferiores per eas mēbranas, quæ ab occi-
 lis ad cerebrum tendunt. potest autem adhiberi remedium his: quæ su-
 pra os fluunt, non potest his, quæ sub osse. ac ne his quidem succurri-
 tur, quibus pituita utriq; descendit. quia leuata altera parte nihilo-
 minus altera infestat. quid sit autem hoc ratione cognoscitur. raso ca-
 pite ea medicamēta, quibus in lippitudine pituita suspēditur, à super
 alijs usq; ad uerticem illini debent. si sicut oculi esse coeperunt, appa-
 ret per eas uenas, quæ sub cute sunt, irrigari. si nihilominus madent,
 manifestum est sub osse descendere. si est humor, sed lenior, duplex ui-
 cium est. plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur: quos superiores
 uenæ exerceant, ideoq; pluribus etiam opitulari licet. idq; non in
 græcia tantummodo, sed in alijs quoq; gentibus celebre est, adeo ut nul-
 la medicinæ pars magis per nationes quoque exposita sit. reperi in
 græcia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent, duabus in occi-
 pitio rectis: una super eas transversa, dein duabus super aures, una
 inter eas item transversa, tribus inter uerticem & frontem rectis. re-
 perti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent: cogni-
 tisq; ex motu maxillarum musculorum inuicis, leniter super eos cutem
 inciderent. inductisq; per retusos hamos oris infererent linamen-
 ta, ut neque inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio
 caro ineresceret, quæ uenas ex quibus humor ad oculos transiret,
 astringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à

media aure ad mediam alteram aurem: deinde à naribus ad uerticem. tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguine fuso os ibidem adusserunt. nihilominus autem: et in temporibus & inter frontem atq; caluariam eminentibus uenis idem candens ferrum admouerunt. frequens curatio est uenas in temporibus adurere, quæ ferè quidem in eiusmodi malo tument. sed tamen ut inflentur, magisq; se ostendant. ceruix ante modice deliganda est, tenuibusq; ferramentis & retusis uenæ adurendæ, donec in oculis pituitæ cursus conquietetur. id enim signum est quasi ex cæcatorum itinerum per quæ humor ferebatur. ualentior tamen mediana est: ubi tenues conditæq; uenæ, ideoq; legi non possunt. eodem modo ceruice deligata: retentoq; ab ipso spiritu, quo magis uenæ prodeant: atramento notare eas contra tempora et inter uerticem ac frontem: deinde ceruice resoluta quæ notæ sunt uenas incidere & sanguinem mittere. ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem timide, ne subiecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem uero et uerticem, uehementer, ut sic squama ab offe recadat. efficacior tamē etiam nunc est asrorum curatio, qui uerticem usq; ad os adurunt sic, ut squamā remittat. sed nihil melius est quam quod in gallia quoq; comata sit. ubi uenas in temporibus et in superiore capitis parte legunt. adusta quomodo curanda sint iam explicui. nunc illud adiicio, neq; ut crustæ decedant: neq; ut ulcus impleatur adustis uenis esse properandum. ne uel sanguis erumpat, uel cito pus supprimatur, cum per hoc scisciscere eas partes opus sit: per illud exhauriri opus non sit. si quando tamen sanguis eruperit, infricanda medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ne adurant. quemadmodū autem uenæ deligendæ sint: quidq; lectis his faciendum sit, cum uenero ad crurum uarices dicam.

De aurium morbis, qui manu & scalpello curantur. Cap. VIII.

Errum ut oculi multiplicem curationem etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt: quæ in hac medicinæ parte tractentur. solet tamen euenire uel à primo natali die protinus, uel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, ideoq; audiendi usq; careat. quod ubi incidit: specillo tentandum est, alte ne id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. nam si alte est: prementi non cedit. si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur in ruorum & ex ea mortis periculum sit. hoc facile curatur nam qua cauum esse debet, uel medicamen-
tum

tum aliquod imponendum est ex adurentibus, uel candente ferro aperendum, uel etiam scalpello incidendum. cumq; id patefactum, etiam ulcus purum est: coniungenda eo pinna est illita medicamento cicatricem inducente, circaq; idem medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit ut ea remota postea facultas audiendi sit: at ubi aures in uiro puta, perforatae sunt, et offendunt, traicere id citius celeriter candente acu satis est, ut leniter eius ora exulceretur, aut etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere id quod purget, tum quod eum locum repleat, et sic cicatricem inducat. quod si magnus id foramen est, sicut solet esse in his, qui maiora pondera auribus gesserunt: incidere quod superest ad extremum oportet, supra deinde oras scalpello exulcerare, et postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. tertium est: si quid ibi curti est, sarcire. quae res cum in labris quoq; et naribus fieri possit: eandem autem rationem habeat, simul explicanda est.

Curta in auribus, labrisq; ac naribus, quomodo sarciri et curari possint. Cap. IX.

Vita igitur in his tribus, ac si qua parua parua sunt: curari possunt: si qua maiora sunt, aut non recipiunt curationem aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint. atq; in aure quidem et naribus deformitas sola timeri potest. in labris uero si nimium contracta sunt, usus quoq; necessarius iactura fit. quia minus facile et cibus assumitur, et sermo exptiatur. neq; enim creatur ibi corpus: sed ex uicino adducitur: quod in leui mutatione et nihil eripere, et fallere oculum potest: in magna non potest: neq; senile autem corpus, neq; quod mali habitus est, neq; in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinae idoneum est: quia nusquam celerius cancer occupat, aut difficiliter tollitur. ratio curationis eiusmodi est. id quod curatum est in quadratum redigere. ab interioribus eius angulis lineas transversas incidere, quae ceteriore partem ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea quae sic resoluiamus, in unum adducere: si non satis iunguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, et ad plagam conuersas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur. sic enim fit ut facilius quod adducitur, sequi possit: quod non ui cogendum est, sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, et demissum non multum recedat. interdum autem ab altera parte cutis haud omnino adducta, deformem quem reliquit locum reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta ha-

benda est. ergo neq; ex imis auribus, neq; ex medio naso imis uenarum partibus, neq; ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. utrinq; autem petemus: si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris deerit. quæ tamen interdum etiam duobus locis curata esse consuerunt. sed eadem ratio curandi est. si cartilago in eo quod incisum est, eminet: excidenda est. neque enim aut glutinatur, aut acutior traicitur. neq; longe tamen excidi debet: ne inter duas oras liberae cutis, utrinq; coitus puris fieri possit. tum iunctæ oræ inter se suendæ sunt utrinq; cute apprehensa, & qua priores lineæ sunt: ea quoq; suturæ iniiciendæ sunt. sicut locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. in ultiores uero lunatasq; plagas linamentum dandum est, ut cæro crescens uulnus impleat, summâq; cura quod ita sutum est, tuedum esse apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. ergo etiam tertio quoq; die fouendum erit uapore aquæ calidæ: rursumq; idem medicamentum iniiciendum, fereq; septimo die glutinatum est. tum suturæ eximi, & ulcus ad sanitatem perducendum debent.

De polypi curatione per ferrum. Cap. X.

Polypum uero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari iam alias posui. ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spatulæ factæ resolueri ab osse oportet adhibita diligentia, ne infra cartilago laedatur, in qua difficilis curatio est. ubi abscissus est, uno ferramento extrahendus est. tum implicitum linamentum, uel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis suppressitur: eoq; nares leniter implendæ. sanguine suppresso, linamento ulculum purgandum est. ubi purum est, eo pinna eodem modo quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

De ozæna. Cap. XI.

Id autem uitium, quod ὀζæνα à græcis uocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos chirurgos non reperi. Credo quia res raro ad sanitatem satis proficit: cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. apud quosdam tamē positum est uel futilem fistulam, uel eodem scriptorium calanum in nares esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum

esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse aerugine & melle. ubi purus est: lyco ad sanitatem perducendum. uel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius candens ferramentum admoeri. tum sui narem debere, & adustum quidem ulcus eadem ratione curari. suturam uero illini uel spuma argenti uel alio glutinante.

De ore uicij, quæ manu & ferro curantur.

Cap. XII.

De dentibus.

N ore quoque quædam manu curantur. ubi in primis dentes nonnunquam mouentur, modo propter radicem imbecillitatem, modo propter ginguarum arescentium uicium. oportet in utrolibet candens ferramentum ginguis admoeri, ut leuiter attingat, non ut insidat. adustæ ginguæ melle illinendæ, & mulso eluendæ sunt. ut pura ulcera esse ceperunt, arida medicamenta infricanda sunt ex his quæ reprimunt. si uero dens dolores mouet, eximique eum, quia medicamenta nihil adiuvant, placuit circumradi debet, ut gingua ab eo resoluatur. tum is concutiendus est. eaque facienda donec bene moueatur. nam dens hærens cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco mouetur. idque etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora oculis uel cõcutere. tum si fieri potest manus, si minus, forfice dens exapiendus. ac si exesus est, ante id foramen, uel linamento, uel bene accommodato plumbo replendum est ne sub forfice confringatur: recta uero forfex ducenda est, ne inflexis radicibus: os earum, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. neque ideo nullum eius rei periculum est, utique in dentibus breuibus, qui ferè longiores radices, habent. sæpe enim forfex cum dentem comprehendere non possit. aut frustra comprehendat, os ginguæprehendit & frangit. protinus autem ubi plus sanguinis profluit, scire licet aliquid ex osse fractum esse. ergo specillo conquirenda est testa, quæ recessit & uolsella protrahenda est. si non sequitur, inadi gingua debet, donec labans ossis testa recipiatur. quod si fractum statim non est, indurescat extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. sed imponendum calidum ex farina et fimo cataplasma est, donec ibi pus moueatur. tum inadi gingua debet. pus quoque multum profluens ossis fracti nota est. itaque etiam tum id extrahi conuenit. nonnunquam etiam eo lesio, fistula fit quæ eradi debet. Dens autem scaber, quæ parte niger est, radedus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui gallæ quarta pars & altera myrrha sit adiecta. continendumque ore crebro uinum meracum. atque

in eo casu uelandum caput, ambulatione multa, frictione capitis: cibo non acri utendum est. at si ex ictu uel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene hærent, uinciendi sunt. continendaq; ore reprimenda, ut uinum in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens nascitur, quam prior excidat, is qui cadere debuit circum purgandus, & euellendus est: is qui natus est in locum prioris quotidie digito adurgendus, donec ad iustam magnitudinem perueniat: quotienscunq; dente excepto radix relicta est, protinus ea quoq; ad id facta forfice, quam *πύλας* greci uocant: eximenda est. Tonsillas autem quæ post inflammationes induruerunt: *αγγίλλες* autem grecis appellantur: cum sub leuitunici sint, oportet digito circum radere & euellere: si ne sic quidem resoluantur, hamulo excipere, & scalpello excidere: tum ulcus aceto eluere, & illinere uulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

De uua.

Va si cum inflammatione descendit, doloriq; est, & sub rubicundi coloris: præcidi sine periculo non potest. solet enim multum sanguinem effundere. itaq; melius est his uti, quæ aliàs proposita sunt. si uero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra iustum modum à pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. itemq; si ima, liuida & crassa, summa, tenuis est. neq; quicquam commodius est quam uolsella prehendere, sub eaq; quod uolumus, excidere. neq; enim ullum periculum est, ne plus minusue præcidatur: cum liceat tantum infra uolsellam relinquere: quantum inutile esse manifestum est: idq; præcidere quo longior uua est, quam esse naturaliter debet. post curationem eadem facienda sunt, quæ in tonsillis proxime posui.

De lingua.

Inguæ uero quibusdam cum subiecta parte à primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidem possunt. horum extrema lingua uolsella prehenda est, sub eaq; membrana incidenda magna cura habita, ne uenæ quæ iuxta sunt: uolentur, et profusione sanguinis noceant. reliqua curatio uulneris in prioribus posita est: & pleriq; quidem, ubi consauerunt, loquuntur. ego autem cognoui qui succisa lingua, cum abunde super dentes eam promeretur, non tamen loquendi facultatem consecutus est. adeo in medicinæ etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod sequi conuenit.

¶ Vb lingua quoq; interdum aliquid abscedit, quod ferè consistit in tunica: doloresq; magnos mouet. quod si exiguum est, incidi semel satis est. si maius, summa cutis usq; ad tunicam excidenda est: deinde utrinq; oræ hamulus excipiendæ, & tunica undiq; circumdata liberanda est, magna diligentia per omnem cautionem habita, ne qua maior uena incidatur.

De labris.

¶ Abra autem sepe finduntur, eaq; res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur: qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat: sed has, si in summo sunt, medicamentis curare comodius est, quæ ad ulcera oris fiunt. si uero altius descenderunt, necessariū est tenui ferramento adurere: quod spathæ simile quasi transcurrere, non imprimi debet. postea faciendæ eadem sunt, quæ in auribus adustis exposita sunt.

De cernicis uicijs, & curatione. Cap. XIII.

¶ In cernice inter cutem, & asperam arteriam tumor incre-
scit: ῥορὸν ῥοιῶν γρæci uocant. quo modo caro hebes, modo humor aliquis melli, aquæ uel similis includitur: interdum etiam minutis ossibus pili immixti, ex quibus quicquid est quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica exæditur. quo facto siue humor est, profluit: siue quid densius, deinde digitis educitur: tum ulcus sub linamentis sanescit: sed scalpelli curatio breuior est. Medio tumore una linea inciditur usq; ad tunicam: deinde uiciosus sinus ab integro corpore digito separatur: totusq; cum uelamento suo eximitur. tum aceto, cui uel sale, uel nitrum aliquis adiecit, eluitur. oræq; una sutura iunguntur: cæteraq; eadem quæ in alijs suturis super injiciuntur. Leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia: linamentisq; id curandum est cæteris pus mouentibus.

De umbilicis uicijs. Cap. XIII.

¶ Vnt etiam circa umbilicum plura uicia, de quibus propter raritatem inter auctores parum constat. Verisimile est autem id à quoq; prætermisum, quod ipse non cognouerat: à nullo, id quod

non uiderat, fictum commune omnibus est, umbilicum indecore promnere. causæ requiruntur. meges tres has posuit. modo intestinum eò irrumperet. modo omentum. modo humorem. Sostratus nihil de omento dixit. duobus hisdem adiecit, carnem ibi interdum increſcere, eamq; modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit. sed eadem tria causatus spiritum quoq; interdum eò dixit irrumperet. Heron omnibus his quatuor positis, et omenti mentionem habuit, et eius quod simul et omentum et intestinum habuerit. quid autem horum sit, his indicij cognoscitur. ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus neque mollis est omni frigore comminuitur, non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit. sonat interdum, atq; ubi resupinatus est aliquis delapso intestino ipse desidit. ubi uero omentum est, cætera similia sunt, tumor mollior et ab una parte latus extenuatum in uentrem est. si quis apprehendit: elabitur. ubi utrumque est: inditta quoque mixta sunt, et inter utrumque mollities. at caro durior est, semperq; etiam resupinato corpore tumet, prementiq; non cedit, prioribus facile cedentibus. si uiciosa est easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. humor autem si premitur: circumfluit. at spiritus pressus cedit, sed protinus redit resupinato quoq; corpore tumorem in eadem figura tenet. ex his id quod ex spiritu uicium est, medicinam non admittit. caro quoq; carcinomati similis cum periculo tractatur. itaq; omittenda est. sana excidi debet, idq; uulnus linamentis curari. humorem quidam uel inciso summo tumore effundunt, et uulnus hisdem linamentis curant. in reliquis uariæ sententiæ sunt. ac resupinandum quidem corpus esse res ipsa testatur, ut in uterum, siue intestinum, siue omentum est, delabatur. sinus uero umbilici tum uacius à quibusdam duabus regulis exceptus est, uehementerq; earum capitibus deligatis ibi emoritur. à quibusdam id uicium acu traiecitatur duo lina ducente. deinde utriusq; lini duobus capitibus diuersæ partes astringuntur. quod in una quoq; oculi fit. nam sic id quod supra uinculum est, moritur. adiecerunt quidam, ut antequam uincerent: summum una linea incidere, excideremq; quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent. tum deinde uinxerunt. sed abunde est, iubere spiritum continere, ut tumor quantus maximus esse potest, se ostendat. tum imam basim eius atramento notare, resupinatoq; homine, digitis tumorem eum premere, ut si quid delapsum non est: manu cogatur. post hæc umbilicum attrahere, et qua nota atramenti est lino uehementer astringere. deinde partem superiorem aut medicamentis aut ferro adurere donec emoriatur. atq; ut cætera uisus uulnus nutri-

residq; non solum ubi intestinum uel omentum, uel utrunque est, sed etiam ubi humor est: optime proficit sed ante quædam uisenda sunt, ne quod ex uinulo periculum sit. nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est, sed à septimo ferè anno ad quartumdecimum. deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est. at quod mali habitus est, quodq; papulas, impetigines, similiaq; habet idoneum non est. leuibus quoq; tumoribus facile subuenitur. at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale & hibernum uitandum est. uer idoneum maxime est. ac prima æstas non aliena est. præter hæc abstinere pridie debet. neq; id satis est. sed alius quoq; ei ducenda est, quo facilius omnia quæ excesserunt, intra alium confidant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

Caput quintumdecimum.

Quam his qui hydropici sunt emitti oportere aliàs dixi. nunc quemadmodum id fiat dicendum est. quidam autem sub umbilico ferè quattuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato facere consuerunt. quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso. quia quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit. ferramentum autem demittitur: magna cura habita ne qua uena inadatur. id tale esse debet, ut ferè tertiam digiti partem latitudo nucronis impleat. demittendumq; ita est: ut membranam quoque transeat: qua cæro ab interiore parte finitur: cō tum plumbea aut ænea fistula coniicienda est, uel recuruatis in exteriorem partem labris, uel in media circum surgente, quadā mora ne tota intus delabi possit. huius ea pars quæ intra paulo longior esse debet, quàm quæ extra, ut ultra ulteriorem membranam procedat, per hanc effundendus humor est. atq; ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso lintolo fistula est, & in uulnere, si id uisum non est: relinquenda. deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquæ uestigium appareat. quidam tamen etiam non uisita cute protinus fistulam recipiunt, & super uulnus spongiam expressam deligant. deinde postero die rursus fistulam demittunt: quod recens uulnus paulum ductum patitur, ut siquid humoris superest, emittatur: idq; bis ita fecisse contenti sunt.

n Onnunquam autem uenter ictu aliquo perforatur: sequi-
 turq; ut intestina euoluantur. quod ubi incidit, protinus con-
 siderandum est, an integra ea sint, deinde an his color suus
 maneat. si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse iam
 retuli. latius intestinum sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod
 dubia spes, certa desperatione si potior. interdum enim glutinatur. tunc
 si utrumlibet intestinum liuidum, aut pallidum, aut nigrum est, qui-
 bus illud quoq; necessario accedit, ut sensu careat: medicina omnis ina-
 nis est. si uero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione suc-
 currendum est. Momento enim alienantur externo, & insueto spiritu
 circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. & si
 angustius vulnus est, quam ut intestina commode refundantur, inci-
 dendum est donec satis pateat. Ac si iam scitiora intestina sunt, perlu-
 enda aqua sunt: cui paulum admodum olei sit adiectum. tum mini-
 ster oras vulneris leniter diducere manibus suis, uel etiam duobus
 hamis membranæ interiori iniectis debet. medicus priora semper in-
 testina quæ posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singulorū
 locum seruet: repositis omnibus, leniter homo concutiendus est. quo fit
 ut per se singula intestina in suas sedes diducantur: & inibi considat.
 his conditis omentum quoq; considerandum est: ex quo si quid iam
 nigri, & emortui est, forfice excidi debet. si quid integrum est, leniter
 super intestina diduci. sutura autem neq; summæ cutis, neq; interioris
 membranæ per se satis proficit, sed utriusq;. & quidem duobus linis
 uincienda est spissior quam alibi, quia & rumpi facilius motu uen-
 tris potest, & non æque magnis inflammationibus pars ea exposita
 est. igitur in duas acus fila coniicienda, eaq; duabus manibus tenenda:
 & prius interiori membranæ sutura iniicienda est sic, ut sinistra
 manus in dexteriore ora, dextra in sinisteriore à principio vulne-
 ris orsa, ab interiori parte in exteriorem aciem immittat. quo fit, ut
 ab intestinis ea pars semper aciem longe sit, quæ retusa est: semel
 utraq; parte traiecta permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in
 dextra, quæ fuit in sinistra: ea ueniat in sinistram, quam dextra con-
 tinuit. iterumq; eodem modo per oras immittendæ sunt. Atq; ita ter-
 tio, et quarto: deincepsq; permutatis inter manus acibus includenda
 plaga. post hæc eadem fila, eademq; acus ad cutem transferendæ.
 similiq; ratione ei quoq; parti utraq; sutura iniicienda semper ab in-
 teriore parte acibus uenientibus semper inter manus traiectis. deim
 glutinantia iniicienda, quibus aut spongram, aut succidam lanam ex
 aceto

aceto impressam accedere debere manifestius est, quàm ut semper dicendum sit. impositis his leuiter deligari uenter debet.

De interiore parte abdominis rupta, & qua ratione curanda sit. Cap. XVII.

i Nterdum tamen uel ex ictu aliquo, uel retento diutius spiri-
tu, uel sub graui fasce interior abdominis membrana supe-
riore cute integra rumpitur. quod foeminis quoque ex utero
saepe euenire consuevit, sitque praecipue circa ilia. sequitur autem cum
superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intentae
cutis indecore intumescat. atque id quoque aliter ab alijs curatur. quidam
enim per acum duobus linis ad inam basim immisissis, sic utrinque
deuinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in una positum est,
ut quicquid super uinculum est, emoriatur. quidam medium tumorem
excidunt ad similitudinem myrtacei folij. quod semper eodem modo
seruandum esse iam posui, & tum oras sutura iungunt. commodissi-
mum est autem resupinato corpore, experiri manu qua parte is tu-
mor maxime cedat: quia necesse est ea parte rupta membrana sit,
quaque integra est, ea magis obnitatur. tum qua rupta uidebitur, im-
mittendae scalpello duae lineae sunt: ut exciso medio interior membra-
na utrinque recentem plagam habeat. quia quod uetus est: sutura non
coit loco patefacto. si qua parte membrana non nouam plagam, sed
ueterem habet: tenuis excidenda habena est, quae tantum ora eius ex-
ulceret. caetera, quae ad suturae reliquam curationem pertinent, supra
comprehensa sunt.

De uariis uentris.

p Ræter hæc euenit, ut in quorundam uentribus uarices sine
quarum, quia nulla alia curatio est: quàm quæ in cruribus
esse consuevit, tum eam partem explanaturus hanc quoque ediffero.

De testiculorum natura, & morbis eorum. Cap. XVIII.

u Enio autem ad ea: quæ in naturalibus partibus circa testicu-
los oriri solent. quæ quo facilius explicem, prius ipsius loci
natura paucis proponenda est. igitur testiculi simile quid-
dam medullis habent. nam sanguinem non emittunt, & omni sensu
carent. dolent autem in ictibus & inflammationibus tunicae, quibus
hi continentur. dependent uero ab inguinibus per singulos nervos quos
νεμωσι πάο græci nominant: cum quorum utroque binæ descendunt

Aurelij Cor.

9

Testiculi

Compositi

Et uena, Et arteria. hæ autem tunica conteguntur tenui, nervosa, si-
 ne sanguine alba, quæ ἐλασποειδὴς à græcis nominatur. super eā na-
 lentior tunica est: quæ interiori uehementer ima parte inhaeret, δ'ἀρ-
 τή græci uocant. Multæ deinde membranula uenas et arterias, eosq;
 nervos comprehendunt: atq; inter duas quoq; tunicas superioribus par-
 tibus leues, parvulaeq; sunt. hæcenus propria utriq; testiculo Et ue-
 lamenta, Et auxilia sunt. communis deinde utriq; omnibusq; interio-
 ribus sinus est, qui iam conspicitur à nobis, ὀρχέων græci, scrotum no-
 stri uocant, uq; ab ima parte medijs tunicis leuiter innexus est, à supe-
 riore tantum circumdatus est. sub hoc igitur plura uicia esse consue-
runt. quæ modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui,
modo his integris fiunt. siquidem interdum uel ex morbo primum
 inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur. uel ex ictu aliquo
 protinus rumpitur tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus in-
 testina debuit. tum pondere eo deuoluitur, aut omentum, aut etiam in-
 testinum. atq; ibi reperta uia, paulatim, aut ab inguinibus inferiores
 quoq; partes nisum subinde nervosas tunicas, Et ob id eius rei patien-
 tes diducit ἐντεροκοίλῃν, Et ἐπιπλοκοίλῃν græci uocant, apud nos in-
 decorum, sed commune his herniæ nomen est. deinde si descendit omē-
 tum, nunq; in scroto tumor tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc il-
 luc uel conuersum, aut aliquo modo collocatum. itemq; si retentus est spi-
 ritus, non magnopere increfcit. tactu uero inæqualis est, Et mollis, et
 lubricus. at si intestinum quoq; descendit, humor his sine inflamma-
tione modo minuitur, modo increfcit. estq; ferè sine dolore, Et cum
 conquiescit aliquis aut iacet, interdum ex toto desidit, interdum sic di-
 uiditur, ut in scroto exiguae reliquiae maneant. at si clamore Et facie-
 tate, Et si sub aliquo pondere is homo nixus est, crescit. frigore omni
 contrahitur: calore diffunditur. estq; tum scrotum, Et rotundum, Et
 tactu leue: idq; quod subest: lubricum est, si pressum est, ad inguen re-
 uertitur, demissumq; iterum cum quodā quasi murmure deuoluitur.
 Et id quidem in lenioribus malis euenit. nonnunq; autem stercore
 accepto uastus tumet, retroq; compelli non potest: affertq; tum dolore,
 Et scroto, Et inguinibus, Et abdomini: nonnunq; stomachus quoque
 affectus, primum ruffam bilem per os reddit, deinde uiridem, qui-
 busdam etiam nigram. integris uero membranis interdum eam par-
tem humor distringit. atq; eius quoq; species duæ sunt: nam uel inter
tunicas is increfcit, uel in membranis quæ ibi circa uenas Et arteri-
as sunt, ubi hæ grauatæ oculauerunt. ac ne ei quidem humori, qui
inter tunicas est, una sedes est. nam modo inter summam et mediam,
modo inter mediam Et imam consistit. græci communi nomine quic-

quid est ὄστρον appellant. nostri scilicet nullis discriminibus
 satis cognitis, hæc quoque sub eodem nomine, quo priora habent, signa
 autem quædam communia sunt, quædam propria. communia quibus
 humor deprehenditur. propria: quibus loci humorem subesse dici-
 mus. si tumor est nunquam ex toto se renattens: sed interdum leui-
 or, aut propter famem, aut propter febriculam, maximeque in pueris,
 hisque mollis est, si non nimius humor subest. at si his uehementer in-
 creuit, renittitur sic, ut uter repletus, & arte astrictus. uenæ quoque
 in scroto instantur, & si digito pressimus, adu humor, circumfluensque
 id quod non premitur, attollit, & tanquam in vitro continuè per scro-
 tum apparet: usque quantum in ipso est, sine dolore est. sedes autem
 eius sic deprehenditur: si inter summam, mediamque tunicam est, cum
 digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertens subit.
 scrotum ipsius & albidius est. si ducitur, aut nihil, aut paruum in-
 tenditur. testiculus ea parte neque uisu, neque tactu sentitur. at si sub me-
 dia tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior co-
 les sub tumore eo delitescat. præter hæc æque integris tunicis ramæ
 innascitur, ὀστρον ὀστρον græci appellant. uenæ intumescunt, hæc quoque
 intortæ, conglomeratæque ad superiorem partem, uel ipsum scrotum
 implent, uel mediam tunicam, uel imam: interdum etiam sub ima tu-
 nica circa ipsum testiculum, neruumque eius crescunt. ex his ea quæ
 in ipso scroto sunt, oculis patent. hæc uero quæ nudæ, imæue tunice
 insident, ut magis conditæ, non æquæ quidem cernuntur, sed tamen
 etiam uisui subiectæ sunt, præterquam quod & tumoris aliquid est
 pro uenarum magnitudine et modo, et id prementi magis renittitur,
 ac per ipsos uenarum toros inæquale est, & qua parte id est, testiculus
 magis infuso dependet. cum uero etiam super ipsum testiculum, ner-
 uumque eius id malum increuit, aliquanto longius testiculus ipse de-
 scendit, minorque altero fit, ut pote alimento amisso. Raro sed aliquan-
 do caro quoque inter tunicas increuit, ὄστρον ὀστρον græci uocant. inter-
 dum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque
 affert, & nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguina
 atque ilia peruenit: partesque hæc intumescunt. neruus, ex quo testiculus
 dependet, plenior fit, simulque indurescit super hæc, inguen quoque
 nonnunquam varices implent: ὄστρον ὀστρον appellant.

De testiculorum curationibus communibus, & primo de incisione, &
 curatione inguinis, uel scroti. Caput. XIX.

h Is cognitis de curatione dicendum est, in qua quædam commu-
 nia omnium sunt, quædam propria singulorum. prius de com-

q ü

LIBER

manibus dictam. loquar autem nunc de his, quæ scalpelli desiderant: nam quæ uel sanari non possint, uel aliter curari debeant, dicendum erit simul cum ad species singulas uenero. inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. in utraq; curatione homo ante tri-
 duum bibere aquam pridie: abstinere etiam à cibo debet, ipso autem die collocari supinus, deinde si inguen incidendum est, idq; iam pube contegitur, ante radendum est, & tum extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit: id incidendum sub imo uentre, quæ cum abdomine tunicae inferiores committuntur. aperiendum autem audacter est donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur: perueniaturq; ad eam, quæ media est plaga facta. foramen deorsum uersus subest. in id demittendus est sinistræ manus digitus index, ut diductis interuenientibus membranulis simul laxet. minister autem sinistra manu comprehenso scroto sursum uersus eum debet extendere: & quàm maxime ab inguini-
 bus abducere, primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes mem-
 branulas quæ super mediam tunicam sunt: si digito diducere non po-
 test, scalpello abscedat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ iunga-
 tur, digitoq; inde promatur, & super uentrem cum duabus suis tuni-
 cis collocetur. inde si quæ uicosa sunt, circumcidenda sunt. in quibus cum
 multæ uenæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores uero ante longiore lino deligandæ sunt, ne periculose sangui-
 nem fundant. sin media tunica uexata erit, aut sub ea malum incre-
 uerit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen præcadatur. infra
 tamen non tota demenda est. nam quod ad basim testiculi uehementer
 cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo nō potest.
 itaq; ibi relinquendum est. idem in ima quoq; tunica, si læsa est, faci-
 dum est. sed non à summa inguinis plaga, uerum infra paulum ea
 abscedenda, ne læsa abdominis membrana inflammationes moueat.
 neq; tamen nimium ex ea sursum relinquendum est, ne postea sinue-
 tur, & sedem eidem malo præstet. purgatus ita testiculus per ipsam
 plagam cum uenis, & arterijs, & neruo suo leuiter demittendus est,
 uidendumq; ne sanguis in scrotum descendat, ne ue concretus aliquo
 loco maneat. quæ ita fient, si uenis uinciendo medicus prospexerit. li-
 na quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere de-
 bebunt. quæ pure orto sine ullo dolore excidēt. ipsi autem plagæ inij-
 ciendæ duæ fibulæ sunt, & insuper medicamentum, quo glutinentur.
 solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix maior & latior fiat. quod ubi inadiit, linamenta super non ful-
 cienda, sed leuiter tantum ponenda sunt. supraq; ea quæ inflamma-
 tionem repellant, idest ex aceto, uel lana succida, uel spongia, cætera
 eadem

eadem: quæ ubi pus moueri debet, adhibenda sunt. at cum infra inci-
di oportet, resupinato homine subiicienda sub scroto sinistra manus est,
deinde id uehementer apprehendendum & incidendum. si parum-
lum est quod nocet, modice: ut tertia pars integra ad sustinendum te-
sticulum infra relinquatur. si maius est, etiam amplius, ut paulum
tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit: integrum mane-
at. sed primo rectus scalpellus quàm leuissima manu teneri debet, do-
nec scrotum ipsum diducat. tum inclinandus mucro est, ut transversa
membrana secet, quæ inter summam, mediamq; tunicam sunt. at si
uicium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet. si sub il-
la quoq; conditur, etiam illa incidenda est sic, ut tertia quoq; si illa ui-
cium tegit, ubicunq; repertum malum est, ministrum ab inferiore par-
te exprimere moderate scrotum oportet, medicum digito, manubriolo,
uel scalpello diductam inferiorem partem tunica extra collocare: de-
inde eam ferramento quo ad similitudinem curuum uocant, incide-
re sic, ut in eandem intrare duo digiti index & medius possint. his
deinde coniectis excipienda reliqua pars tunica, & inter digitos scal-
pellus immittendus est: eximendumq; aut effundendum quicquid est
noxium: quancunq; autem tunicam quis uolauit, illam quoq; debet
excidere, ac mediam quidem, ut supra dixi, quàm altissime ab ingui-
ne, imam autem paulo infra. cæterum anteq; excidantur, hæ quoque
uincari lino summe debent, & eius lini capita extra plagam relin-
quenda sunt, sicut in alijs quoq; uenis, quæ id requisierint. eo facto te-
sticulus intus reponendus est, oræq; scroti suturis inter se committen-
dæ, neq; paucis, ne parum glutinentur, & longior fiat curatio, neque
multis, ne inflammationem augeant. atq; hic quoq; uidendum est, ne
quid in scroto sanguinis maneat. tum imponenda glutinantia sunt.
siquædo autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidue concretum ex
eo decidit, incidi subter id debet, purgatoq; eo spongia acris aceto ma-
dens circumdari. deligatur autem uulnus omne, quod ex his causis fa-
ctum est. si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resoluen-
dum, sed bis die tantum aceto irroranda lana uel spongia. si dolor
est: tertia die resoluendum, et ubi fibulæ sunt, hæ incidende, ubi lina-
mentum id mutandum est, rosæq; & uino madefaciendum id, quod
imponitur. si inflammatio increseat, adiiciendum prioribus catapla-
sma ex lenticula & melle, uel ex malicorio, quod in austero uino co-
ctum sit, uel ex his mixtis. si sub his inflammatio non coquirit post
diem quintum multa calida aqua uulnus fouendum, donec scrotum
psum & extenuetur & rugosius fiat. tum imponendum catapla-
sma ex triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. quæ ipsa si robu-

Aurelij Cor.

q iij

stus curatur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt. neq; dubium est quodcunq; initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quæ pus mouent, imponenda sint. quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur. linamentumq; eatenus imponendum est, ut foramen tegat. inflammatione finita propter nervos priore cataplasmate, dein cerato utendum est. Hæc proprie ad eiusmodi vulnera pertinent. cætera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quæ in alio quoq; vulnere genere præcepimus.

De intestini curatione.

Cap. XX.

Is propositis ad singulas species ueniendum est: ac si cui par
h nulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experien-
da iunctura est. fascia eius rei causa fit: cui imo loco pila
assuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi il-
li subijcitur: deinde reliqua fasciæ pars arcu circumdatur. sub quo
sepe & intus compellitur intestinum: & inter se tunica glutinatur.
rursus si ætas processit, multumq; intestini descendisse ex tumore ma-
gno patet, adiungunturq; dolor, & uomitus quæ ex stercore, & ex cru-
ditate eo delapso ferè accidunt, scalpellum adhiberi sine pernitie non
posse manifestum est. leuandum tantummodo malum, & per alias
curationes extrahendum est. sanguis mitti ex brachio debet: deinde
si vires patiuntur, imperanda tridui abstinentia est: si minus certe
pro ui corporis quamlongissime. eodem uero tempore super haben-
dum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxe-
rit. Post hæc & farina hordeacea cum resina iniicienda, & his de-
mittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoq; adiectum sit: dan-
dumq; aliquid cibi lenis calidi. quidam etiam aluum ducunt. id du-
cere aliquid in scrotum potest: educere ex eo non potest. per ea uero
quæ supra scripta sunt, leuato malo si quando aliàs dolor reuerterit,
eadem erunt facienda. sine dolore quoq; si multa intestina prolapsa
sunt, secari superuacuum est: non quo excludi à scroto non possint, nisi
tamen id inflammatio prohibuit: sed quo repulsa inguinibus im-
morentur: ibiq; tumorem excitent: atq; ita fiat mali non finis, sed mu-
tatio. at in eo, quem scalpello curari oportebit, simul atq; ad mediam
tuniciam vulnus in inguine factum peruenerit, duobus hamulis ea iux-
ta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranis
lis medicus eam liberat. neq; enim cum periculo læditur, quæ exci-
denda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. ubi deducta autē
erit ab inguine, usq; ad testiculum incidi debet sic, ne his ipse lada-

tur: tum excidi. ferè tamen hanc curationem puerilis ætas & modica cum malum recipit. sic uir robustus est, maiusq; id uicium est, extra hi testiculum non debet: sed in sua sede permanere. id hoc modo fit. inguen eadem ratione usq; ad mediã tunicam scalpello aperitur: eaq; tunica eodem modo duobus hamis excipitur sic, ut à ministro testiculus eatenus contineatur, ne per uulnus exeat: tum ea tunica deorsum uersus scalpello inciditur: sub eaq; index digitus sinistræ manus ad innum testiculum demittitur, eumq; ad plagam compellit: deinde dextre manus duo digiti pollex, atq; index uenam, & arteriam, & nervum, tunicamq; eorum à superiore tunica diducunt. quod si aliqua membranulæ prohibent, scalpello resoluuntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. excisis quæ excidenda sunt, repositiq; testiculo ab ora quoq; eius uulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulo latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

De omenti curatione.

Cap. XXI.

¶ si omentum descendit, eodẽ quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen, diducendæq; tunicae sunt. considerandum autem est, maior ne is modus, an exiguus sit. nam quod paruulum est, super inguen in alium uel digito, uel aureso specillo repellendum est. si plus est, sinere oportet dependere quantum ex utero prolapsum est: idq; adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur, & exadat. quidam hic quoq; duo lina acui traiciunt, binisq; singulorum capitibus diuersas partes astringunt. sub quo æque, sed tardius emoriatur. adiicitur tamen hic quoq; celeritati, si omentum super uinculum illinitur medicamentis, quæ sic exedunt ne erodant, omnia græci uocant. Fuerunt etiam qui omentum forfice præciderent: quod in paruulo nõ est necessarium. si maius est, potest profusionem sanguinis facere: siquidem omentum quoq; uenis quibusdam etiam maioribus illigatum est. neq; uero si disscisso uentre id prolapsum forfice præciditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius auelli non possit: inde huc exemplum transferendum est. uulnus autem curari. si relictum omentum est, sutura debet. si id amplius fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est. si uero humor intus est, incidendum est: in pueris quidem inguen, nisi in his quoq; liquoris eius maior modus prohibet: in uiris uero, & ubicunq; multus humor subest scrotum. deinde si inguen incisum est, eo protractis tunicis humor effundi debet. si scrotum, & sub hoc protinus uicium est, nihil aliud quam humor est effundendus: abscedendæq; mē-

branae sunt, si quae cum continuerunt, deinde eluendū id ex aqua, quae uel salē adiectum, uel nitrum habeat. si sub media, ima uel tunica: totae hae extra scrotum collocandae, excidendaeque sunt.

De ramicis curatione.

Cap. XXII.

Amx autem, si super ipsum scrotum est, aduredus est tenuibus & acutis ferramentis: quae ipsis uenis insigantur: cum eo, ne amplius quam has urant, maximeque ubi inter se implicatae glomerantur, eo ferrum id admoendum est: tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est: utendumque eo uinculo, quod idoneum esse antea curationibus posui. tertio die lenticula cum melle imponenda est. post eiectionis crustis ulcera melle purganda: rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. quibus uero super mediam tunicam uenae tument incidendum inguen est, atque tunica promouenda, ab eaque uenae digito uel manubriolo scalpelli separanda. qua parte uero inhaerebunt: & ab superiore, et ab inferiore parte lino uincienda: tum sub ipsis uinculis praecidenda, reponendusque testiculus est. at ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, media excidi necesse est: deinde si duae tresue uenae tument, & ita pars aliqua obsidetur, ut maiore uicio uacet, idem faciendum, quod supra scriptum est, ut ab inguine & a testiculo deligatae uenae praecidantur: usque condatur. sin totum id ramex obsederit: per plagam demittendus digitus index erit: subiiciendusque uenis sic, ut paulatim protrahat aequ adducendo, donec is testiculus par alteri fiat. tum fibulae oris sic uincienda, ut simul eas quoque uenas comprehendant. id hoc modo fit. acus ab exteriori parte oram uulneris perforat. tum non per ipsam uenam, sed per membranam eius immittitur: per eamque in alteram oram compellitur. uenae uulnerari non debent, ne sanguinem fundant. membrana semper inter has uenas est, ac neque periculum affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. itaque etiam satis est duas fibulas esse. tum uenae quaecumque protractae sunt in ipsum inguen aduerso specillo comprehendi debent. soluendi fibulas tempus inflammatione finita, & purgato uulnere est, & una simul, & oras, & uenas cicatrix deuinciat. ubi uero inter imam tunicam et ipsum testiculum, nervumque eius ramex ortus est, una curatio est, quae totum testiculū abscidit. nam neque ad generationem quicquam is confert et omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. sed totum quoque inguen incidendum media tunica promouenda: atque excidenda est: idem in ima faciendum, nervusque ex quo testiculus dependet praecidendus. post id uenae

Arteriæ ad inguen lino deligandæ & infra uinculum abscondendæ sunt.

De carne, quæ inter tunicas testiculorum concreuit,
& de nervo indurato. Cap. XXIII.

Aro quoq; si quando inter tunicas concreuit: nihil dubij est,
quin eximenda sit: sed id ipso scroto inciso fieri commodius
est. at si nervus induruit, curari res neq; manu, neq; medi-
camento potest. Urgent enim febres ardentes, & aut uirides, aut nigri
uomitibus, præter hæc ingens sitis et lingue aspritudo, fereq; à die ter-
tio spumans bilis aluo cum rostone redditur. atq; neq; assumi facile ali-
bus, neq; contineri potest, neq; multo post extremæ partes frigescent:
tremor oritur: manus sine ratione extenduntur. deinde in fronte fri-
gidus sudor, eumq; mors sequitur.

De ramice inguinis. Cap. XXIII.

Bi uero in ipso inguine ramex est, si tumor modicus est, se-
mel incidi, si maior, duabus lineis debet, ut medium exci-
datur: deinde non extracto testiculo: sicut intestinis quoque
prolapsis interdum fieri docui: colligendæ uenæ uinciendæq; ubi tuni-
cis inherebunt, & sub his modis præcidendæ sunt. neq; quicquam
nouæ curationi ulneris eius requirit.

Ad tegendam glandem colis si nuda est. Cap. XXV.

B his ad ea transeundum est, quæ in cole ipso fiunt: in quo
si glans nuda est, nullq; aliquis eam decoris causa tegere,
fieri potest, sed expeditius in puero quàm in uiro: in eo, cui
id naturale est, quàm in eo, cui quarundam gentium more circunci-
sus est, in eo cui glans parua iuxtaq; eam cutis, spatiosior uero ipse
coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, qui-
bus id naturale est, eiusmodi est. cutis circa glandem apprehenditur,
et extenditur, donec illam ipsam condat, ibiq; deligatur. deinde iuxta
pubem in orbem tergis inciditur: donec coles nudetur, magna q; cura
cauetur ne uel urina iter, uel uenæ, quæ ibi sunt, incidantur. eo facto
cutis ad uinculum inclinatur, nudaturq; circa pubem uelut circulus:
eoq; linamenta dantur, ut caro increseat & id impleat, satisq; uela-
menti supra latitudo plagæ præstat: sed donec cicatrix sit, uinctum
esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. at in eo

LIBER

qui circumcissus est sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab inferiore cole est. non ita dolet, quia summo soluto deduci deorsum usque ad pubem manu potest. neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem. tum multa frigida aqua foveatur: emplastrumque circa datur, quod valentem inflammationem reprimat. proximisque diebus ut propè à fame victus est, ne forte eam partem sacietas excitet. ubi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube usque circum. super glandem autem aduerso emplastro imposito induci. sic enim fit, ut inferior pars glutinetur: superior ita sanescat, ne inhæreat.

Quomodo glans penis contacta aperiri possit.

Contra si glans ita contacta est, ut nudari non possit: quod uicium græci φίμωσις appellant, aperienda est. quod hoc modo fit. Subter à summa ora cutis inciditur, recta linea usque ad frenum: atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est sic, ut uertex eius ad frenum basis in tergo extremo sit. tum super danda linamenta sunt: aliaque medicamenta, quæ ad sanitatem producant. necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiescere. nam ambulatio atterendo, ulcus sordidum reddit.

Infibulandi ratio.

Infibulare quoque adolescentulos, interdum uocis, interdum uoletudinis causa quidam consueverunt: eiusque hæc ratio est. cutis quæ super glandem est, extenditur: notaturque utrinque lateribus atramento qua perforatur: deinde remittitur. si super glandem notæ reuertuntur, nimis apprehensum est, et ultra notari debet. si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulæ est: tum qua notæ sunt. cutis acu filum ducente transiit: eiusque filii capita inter se deligantur: quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatriculae fiant. ubi hæ confirmatæ sunt, exempto filo fibula additur: quæ quomelior, eò lenior est: sed hoc quidem sæpius inter supernuacia, quam inter necessaria est.

De urinae reddendæ difficultate, et de calculo, curationibusque eorum. Cap. XXVI.

Es uero interdum cogit emoliri manu urinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est: aut quia calculus, uel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. ac me-

diocris quoq; inflammatio sæpe eam reddi naturaliter prohibet. idq; non in uiris tantummodo, sed in foeminis quoq; interdum necessarium est. ergo aeneæ fistulae fiunt, quæ ut omni corpori ampliori, minoriq; sufficiant. ad mares tres, ad foeminas duæ medico habendæ sunt. ex uirilibus maxima decem et quinque est digitorum, media duodecim, minima nouem. ex mulieribus, maior nouem, minor sex. incuruas uero esse eas paulum, sed magis uiriles oportet, leuesq; admodum ac neq; nimis plenas, neq; nimis tenues. homo tum resupinus eo modo quo in curatione ani figuratur, super subsellum, aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra uero fistulam demittere in iter urinae debet. atq; ubi ad ceruicem uesicæ uentum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam uesicam compellere, eamq; urina reddita recipere. Foemina breuius urinae similiter, & rectius iter habet. quod mammæ simile inter imas oras super naturale positum non minus sæpe auxilio eget. aliquanto minus difficultatis exigit. nonnunq; etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, nō longe ab exitu inhaerescit. cum si fieri potest, oportet uellere, uel oriculario specillo, uel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. si id fieri non potuit, cutis extrema quam plurimum attrahenda, & condita glande lino uincienda est: deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est. tum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat: & urina naturaliter profluat.

Quæ curatio calculosis adhibeatur.

Ubi uesicæ uero, calculiq; facta mentio sit, locus ipse exigere uidetur ut subiiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. ad quam festinare cum præceps sit, nullo modo conuenit. ac neq; omni tempore, neq; in omni ætate, neq; in omni uicio id experiendum est: sed solo uere, in eo corpore quod iam nouē annos, nondū quatuordecim excessit: & si tantum mali subest, ut neq; medicamentis uinci possit, neq; etiam trahi posse uideatur, quo minus interposito aliquo spacio interimat. non quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat: sed quo sæpius utiq; in hoc fallat, in quo plura & genera, & tempora periculi sunt, quæ simul cum ipsa curatione proponā. Igitur ubi ultima experiri statutum est, ante aliquot diebus uictu corpus præparandū est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquā bibat. ambulādi uero

LIBER

inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad uesicæ cervicē descendat. quod an inaderit, digitis quoq; sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. ubi eius rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur. homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumq; eum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis cōprehendit, reductisq; eius cruribus ipsum quoq; iubet manibus ad suas poplites datis, eos quam maxime possit attrahere, simulq; ipse sic eos continet. quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo ualentes insidunt: quo & sedilia & interiora crura inter se delignantur, ne diduci possint. tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atq; alter prout confedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulq; ipse poplites suos attrahit. siue autem unus, siue duo continent super humeros eius suis pectoribus incumbunt. ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extensus, & in angustum compulsa uesica facilius calculus capi possit. Præter hæc etiam num à lateribus duo ualentes obijciuntur, qui circumstantes leuare uel unum, uel duos qui puerum continent non sinunt. Medicus deinde diligenter unguibus circumsis atq; sinistra manu duos eius digitos indicem & medium: leniter prius unum, deinde alterum in anum eius demittit, dextræq; digitos super innum abdomen leniter imponit: ne si utrinq; digiti circa calculum uehementer cōcurrerint, uesicam lædant. neq; uero festinanter in hac re, ut in pleurisiq; agendum est. sed ita ut quam maxime id tuto fiat. nam læsa uesica neruorum distentiones cum periculo mortis excitat. ac primum circa cervicem queritur calculus. ibi repertus minore negotio expellitur. & ideo dixi ne curandum quidem: nisi cum in hoc inditijs suis cognitum est. si uero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam uesicam dantur, paulatimq; dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur. atque ubi repertus est calculus, qui necesse est in manus incidat, eò curiosius deducitur. quo minor, leuiorq; est, ne effugiat, id est ne sæpius agitata uesica sit. ergo ultra calculum dextra semper manus eius opponitur, sinistræ digiti deorsum eum compellit donec ad cervicem peruenitur. in quā si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat. si planus sic, ut transuersus sit. si quadratus, ut duobus angulis sedeat. si altera parte plenior sic, ut prius ea, qua tenuior sit, euadat. in rotundo nihil interesse ex ipsa figura pater, nisi si leuior altera parte est, ut ea antecadat. cum id eò uenit, ut incidi super uesicæ cervicem iuxta anū cutis, plaga lunata usq; ad cervicē uesicæ debeat cornibus ad coxas spectantibus

paulum: deinde ea parte, qua strictior ima plaga est etiam num sub-
 cute altera transversa plaga facienda est, qua ceruix aperiatur: donec
 urina iter pateat sic, ut plaga paulo maior quam calculus sit. nam
 qui metu fistulae, quam illo loco *χορδα* graeci uocant, parum patefa-
 ciunt: cum maiore eodem periculo reuoluntur: quia calculus iter, cum
 ui promitur, facit: nisi accipit: idque etiam perniciosius est, si figura quoque
 calculi, uel asperitudo aliquid eo contulit. ex quo et sanguinis profu-
 sio, et distentio neruorum fieri potest. quae si quis euasit, multo tamen
 patientiorem fistulam habiturus est rupta ceruice, quam habuisset in-
 cisa. cum uero patefacta est, in conspectum calculus uenit, in cuius cor-
 pore nullum discrimen est. ipse si exiguus est, digitis ab altera parte
 propelli, ab altera protrahi potest. si maior: iniiciendus a superiore
 ei parte unius est eius rei causa factus. is est ad extremum tenuis, in
 semicirculi specie reclusae latitudinis, ab exteriori parte laeuis, qua cor-
 pori ingitur, ab interiori asper, qua calculum attingit. isque longior
 potius esse debet. nam breuis extrahendi uim habet. ubi iniectus est,
 in utrumque latus inclinandus est, ut appareat calculus, et teneatur,
 quia si apprehensus est, ille simul inclinatur: ideoque eo minimo opus
 est. ne cum adduci unius coeperit, calculus intus effugiat, hic in oram
 uulneris incidat, eamque conuulneret. in qua re quod periculum esset.
 iam supra proposui. ubi satis teneri calculum patet, eodem penè mo-
 mento triplex motus adhibendus est in utrumque latus, deinde extra,
 sic tamen ut leniter id fiat, paulumque primo calculus attrahatur. quo
 facto attollendus unius extremus est, uti intus magis maneat, facili-
 usque illum producat. quod si aliquando a superiore parte calculus pa-
 rum commode comprehendetur, a latere erit apprehendendus. haec
 est simplicissima curatio. sed uarietas rerum quasdam etiam num
 animaduersiones desiderat. sunt enim quidam non asperi tantum-
 modo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in ceruicem
 sine ullo periculo eximuntur. in uescia uero non tuto uel hi conquirun-
 tur, uel attrahuntur. quoniam ubi illam conuulnerant, ex disten-
 tione neruorum mortem maturant, multoque magis si spina aliqua ue-
 siccae inhaeret: eamque, cum duceretur: duplicauit. colligitur autem eo quod
 difficilius urina redditur, in ceruice calculus esse: eo quod cruenta de-
 stillat, illum esse spinosum: maximeque id sub digitis quoque experiri-
 dum est, neque adhibenda manus, nisi id constitit. ac tum quoque leniter
 intus digiti obijciendi, ne uolenter promouendo conuulnerent. tum
 inadèdum. multi hic quoque scalpello usi sunt. Meget, quoniam is infir-
 mor est: potestque in aliqua prominentia incidere, incisoque super illam
 corpore: qua cauum subest non secare, sed relinquere, quod iterum

LIBER

incidi necesse sit. ferramentum fecit rectum in summa parte labrosum, in ima semicirculatum, acutumq; id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat: ut simul cum carne, siquid ex calculo prominebat: incideret. quo consequebatur, ut semel quantum satis esset, aperiret. quocunq; autem modo cervice ea parte facta est, leniter extrahi quod asperum est, debet: nulla propter festinationem vi admota.

signa calculorum, uel harenosorum, uel mollium.

T calculus harenosus, & ante manifestus est: quoniam & urina quæ redditur, harenosa est, & in ipsa curatione, quoniam inter subiectos digitos neq; æque leniter renititur, & insuper dilatatur. item mollis calculus, & ex pluribus minutisq; sed inter se parum astrictis compositus indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamulas. hos omnis leniter permutatis subinde digitorum uicibus sic oportet abducere, ne uesicam lædant, ne uel intus aliqua dissipata reliquæ maneant. quæ postmodum curationi difficultatem faciant. quicquid autem ex his in conspectum uenit uel digitis, uel unco eximendum est. at si plures calculi sunt, singuli protrahi debet, sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur. si quidem in uesica difficulter inuenitur. inuentusq; celeriter effugit. ita longa inquisitione uesica læditur: excitatq; inflammationes mortiferas, adeo ut quidam secti cum diu frustra q; per digitos uesica esset agitata, decesserint. quibus accedit etiam quod exiguus calculus ad plagam urina postea promouente excidit. si quando autem is maior non uidetur nisi rupta cervice extrahi posse, findendus est. cuius repertor Ammonius ob id laboriosus cognominatus est: id hoc modo fit. uncus inijcitur calculo sic, ut facile eum concisum quoq; teneat, ne is retro reuoluetur. tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ prima parte tenui, sed retusa, quod admodum calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam uesicam per ferramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

De calculis foeminarum.

Hæ uero curationes in foeminis quoq; similes sunt, de quibus tamen parum proprie quædam dicenda sunt. siquidem in his ubi paruulus calculus est, scalpellus supernacius est, quia is urinam in cervicem non compellit: quæ & breuior q̃ in ma

ribus, & laxior est. ergo et per se saepe excidit, & si in primo quod est angustius inhaeret, eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. at in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. sed uirgini subijci digiti tanquam masulo mulieri per naturalia eius debent. tum uirgini quidem sub ima sinistiore ora. Mulieri uero inter urinae iter, & os pubis inadendum est sic, ut utroque loco plaga transuersa sit, neque terreri conuenit si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

Quae curatio calculo euulso habenda sit.

Calculo euulso, si ualens corpus est, neque magnopere uexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur: atque ingredi quoque eum paulum non alienum est, ut excidat, si quid intus concretionis sanguinis mansit. quod si per se non desistit, rursum ne uis omnis intereat, suppressi debet. idque protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. si quidem uis distentione neruorum periclitatur aliquis dum uescit eius agitur, sic alter metus excipitur remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis proficiat, ut occidat. quod ne incidat, desidere his debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. sub quo & sanguis ferè conque-scit, et astringitur uescit, ideoque minus inflammatur. quod si parum proficiat, agglutinanda cucurbitula est, & inguinibus, & coxis, & super pubem. ubi iam satis uel euocatus est sanguis, uel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxae paulum excitentur: ac super ulcus imponendum est duplex, aut triplex linteolum aceto madens. deinde interpositis duabus horis in solium is aquae calidae resupinus demittendus est sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cetera uestimentis circumdata sint, manibus tantummodo, pedibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. ex quo sudor multus oriri solet, quo spongia subinde facile detergendum est: finisque eius solum est donec infirmando offendat: tum multo is oleo perungendus, inducendusque hapsus lanae mollis tepido oleo repletus: qui pubem & coxas & inguina & plagam ipsam contextam eodem ante se linteolo protegat, hisque subinde oleo tepido madesciendus est, ut neque frigus ad uescit admittat, & neruos leniter molliat. quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur: ea plus pondere nocent, quae uescit urgendo uulnus irritant, quod calore proficiunt. ergo ne uinculum quidem ullum necessarium est: proximo die si spiritus diffusius redditur, si urina non excedit, si locus circa pubem mature intumuit. scire licet in uescit sanguinem concretum

remansisse. igitur demissis eodem modo digitis leuiter pertractanda uescia est, et discutienda, si qua coierunt. quo fit ut per uulnus postea procedant. non alienum etiam est oriculario clystere acetum nitro mixtum per plagam in uesciam compellere. nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coierunt. eaque facere etiam primo die conuenit. si timemus ne quid intus sit: maximaque ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit, cetera eadem facienda sunt, ut demittatur in solium: ut eodem modo panniculus eadem lana super iniiciatur: sed neque sepe, neque tandiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est, infirmus, quam ualens: leui quam grauiore inflammatione affectus, is cuius corpus digeritur, quam his cuius astrictum est. inter haec uero si somnus est, et aequalis spiritus, et madens lingua, et sitis modica, et uenter inus, sed et mediocris est cum febre modica dolor, scire licet recte procedere curationem. atque in his inflammatio fere quinto uel septimo die finitur. qua leuata solum supernacuum est. supini tantummodo uulnus aqua calida fouendum est, ut si quid urinae rodet, abluatur. imponenda autem medicamenta sunt pus mouentia, et si purgandum ulcus uidebitur, melle linendum. id si rodet, rosa temperabitur. huic curationi aptissimum uidetur *εὐρεσάριον* maior emplastrum. nam et seuum habet ad pus mouendum, et mel ad ulcus repurgandum: medulla etiam maximeque uitulina: quod in id ne fistula relinquatur, praecipue proficit. linamenta uero tum super ulcus non sunt necessaria, super medicamentum ad id continendum recte imponuntur. at ubi ulcus purgatum est: puro linamento ad cicatricem perducendum est. quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, uaria circa pericula oriuntur. quae praesagire protinus licet: si continua uigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis uehemens, si uenter inus tumet, si uulnus hiat, si tranfluens urina id non rodit, si similiter ante tertium diem quaedam liuida excidunt, si is aut nihil, aut tarde respondet, si uehementes dolores sunt, si post die quintum magnae febres urgent, et fastidium cibi permanet, si cubare in uentrem iocundius est. nihil tamen peius est distentione neruorum, et ante nonum diem uomitus bilis. sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinentia modicis et tempestiuis cibis, inter haec fomentis, de quibus supra scripsimus. oportet.

De cancro qui excisa uescia nascitur, et qua curatione uti debeat.

Caput XXVII.

p Roximus cancri metus est. is cognoscitur, si et per uulnus, et per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cumque eo quaedam à concreto

concreto sanguine non abhorrentia, tenuesq; aruncula lanulis similes: præter hæc si ora ulneris aridæ sunt: si dolent inguina: si febris non desuit, eaq; in noctem augetur: si inordinati horrores accedunt. Cõsiderandum autem est, in quam partem cancer is tendat. si ad colem indurescat his locus & rubet, & tactu dolorem exatrat, testiculiq; intumescunt. si in ipsam uesticam ani dolor sequitur, coxæ dure sunt, non facile crura extendi possunt. at si in alterutrum latus oculis id expositum est, paresq; utrinq; easdẽ notas sed minores habet. primum autem ad rem pertinet corpus recte iacere, ut superior pars semper eadem sit in quam uicium fertur. ita si ad colem it, supinus his collocari debet. si ad uesticam, in uentrem, si in latus, in id quod integrus est. Deinde ubi uetum fuerit ad curationem, homo in aquã demittetur: in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, aut myrtus, idemq; humor clystere intus adijcietur. tum super ponetur lentacula cum malicorio mixta, quæ utraq; ex uino decocta sint, uel rubus, aut olea folia eodem modo decocta, aliãq; medicamenta, quæ ad cohibendos, purgandosq; caneros proposuimus. ex quibus si qua erũt arida, per scriptorium calamum inspirabuntur. ubi stare cœperit cancer, mulso uulnus eluetur. uitabiturq; eo tempore ceratum quod ad recipiendum id malum corpus emollit, potius plumbum elotum cum uino inungetur. super quæ idem linteolo illitum imponetur: sub quibus perueniri ad sanitatem potest. cum eo tamen quod non ignoremus orto cancro sæpe affici stomachum, cui cum uestica quoddam consortium est: exq; eo fieri ut neq; retineatur cibus, neq; si quis retentus est, concoquatur: neq; corpus alatur: ideoq; ne uulnus quidem aut purgari, aut ali possit: quæ necessario mortem maturant. sed ut his succurri nullo modo potest, sic à primo tamen diu tenenda ratio curationis est. in qua quædam observatio ad cibum quoq; potionemq; pertinet necessaria est: nam cibus inter principia non nisi humidus dari debet. ubi uulnus purgatum est, ex media materia olera, & salsamenta semper aliena sunt. potione opus est non modica: nam si parum bibitur, accenditur uulnus, & uigilia urget, & uis corporis minuitur. si plus æquo assumitur, subinde uestica impletur, eõq; irritatur. non nisi aquam autem bibendam esse manifestus est, quã ut subinde dicendum sit. solet uero sub eiusmodi uictu uenire ut alius non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua uel foenum græcum, uel malua decocta sit idem humor rosa mixtus in ipsum uulnus oriculario clystere agendus est: ubi id rodit urina neq; purgari patitur. Ferè uero primo per uulnus exit hæc, deinde eo sanescente diuiditur, et pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur: quod in-

Aurelij Cor.

r.

terdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam ex acto
quoque anno fit. neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi
ubi aut uehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ, magnæque
caruncule, simulque nervosa aliqua exciderunt. sed ut uel nulla ibi
fistula, uel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum
est. Ergo cum iam ad cicatricem uulnus intendit, extētis iacere foemina
nibus, et cruribus oportet: nisi tamen molles, harenosi uel calculi fue
runt. sub his enim tardius uesica purgatur. Ideoque diutius plagam pa
tere necessarium est: et tum demum ubi iam nihil tale extra fertur,
ad cicatricem perducta quod si antequam uesica purgata est: orae se glu
tinant: dolorque, et inflammatio redierunt, uulnus digitis uel ad
uerso specillo diducendum est, ut torquentibus exitus detur: hisque effu
sis tum diutius pura urina descendat. tum demum quæ cicatricem in
ducant, imponenda sunt: extendique ut supra docui pedes quam ma
xime iuncti. quod si fistulæ metus ex his causis, quas proposui, subesse
uidebitur, quo facilius claudatur ea, uel certe coaguletur, in anum
quoque danda plumbea fistula est: extentisque cruribus foemina, taliisque
inter se deligandi sunt, donec qualis futura est, cicatrix sit.

Si naturalia foeminarum concubitus non admittunt, quo
modo curari conueniat. Cap. XXVIII.

T hoc quidem commune esse maribus, et foeminis potest
e proprie uero quedam ad foeminas pertinent, ut in primis:
quod earum naturalia nonnunquam inter se glutinatis oris
concubitus non admittunt. idque interdum euenit protinus in utero
matris: interdum exulceratione in his partibus facta, et per malam
curationem his oris sanescendo iunctis. si ex utero est, membrana ori
uulue opposita est. si ex ulcere, caro id repleuit. oportet autem mem
branam duabus lineis inter se transuersis incidere ad similitudinē
litteræ X. magna cura habita ne urina iter uioletur. deinde undique
eam membranam excidere: ac si caro increuit, necessarium est recta
linea patefacere. tum ab ora, uel uulsella, uel hamo apprehensam tan
quam habenulam excidere: et intus implicatum in longitudinem li
namentum, ὡς μινιον græci uocant, in aceto tinctum demittere: su
praque succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die soluere
ulcus, et sicut alia ulcera curare. cumque iam ad sanitatem tendet,
plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamque
intus dare. supraque idem medicamentum inijcere, donec ad cicatricē
plaga perueniat.

Qua curatione partus emortuus ex utero excutitur. Cap. XXIX.

Bi concipit autem aliqua si iam propè maturus partus in-
 tus emortuus est, neq; ex cadere per se potest, adhibenda cu-
 ratio est, quæ numerari inter difficillimas potest. nam &
 summam prudentiam, moderationemq; desiderat: & maximum pe-
 riculum affert. sed ante omnia uulvæ natura mirabilis, cum in mul-
 tis alijs, tum in hac re quoq; facile cognoscitur. oportet autem ante o-
 mnia resupinam mulierem transuerso lecto sic collocare, ut feminibus
 eius ipsius ilia comprimantur. quo fit ut & inus uenter in conspe-
 ctu medici sit: & infans ad os uulvæ compellatur: quæ emortuo par-
 tu id comprimit: ex intervallo uero paulum dehiscere. hac occasione
 usus medicus unctæ manus indicem digitum primum debet infere-
 re, atq; ibi continere, donec iterum ad os aperiatur: rursusq; alterum
 digitum demittere debebit, & per easdē occasionēs alios, donec tota
 esse intus manus possit. ad cuius rei facultatem multum confert &
 magnitudo uulvæ, & uis nervorum eius, & corporis totius habitus,
 & mentis etiam robur: cum presertim intus nonnunq; etiā duæ ma-
 nus dari debeant. pertinet etiā ad rem quācalidissimum esse inuē-
 uentrem, & extrema corporis, neq; dum inflammationem coepisse,
 sed recenti re protinus adhiberi medicinam. nam si corpus iam in-
 tumuit, neq; demitti manus, neq; educi infans nisi agerrime potest, se-
 quiturq; sæpe cum uomitu & cum tremore mortifera nervorum di-
 stentio. uerum intus emortuo corpori manus injecta protinus habitū
 eius sentit. nam aut in caput, aut in pedes conuersum est, aut in trās-
 uersum iacet: ferè tamen sic, ut uel manus eius, uel pes in propinquo
 sit. Medici uero propositum est, ut eum manu dirigat uel in manus,
 uel etiam in pedes. si forte aliter compositus est, ac si nihil aliud est,
 manus uel pes apprehensus, corpus rectius reddit: nam manus in ca-
 put, pes in pedes eum conuertet. tam si caput proximum est, demitti
 debet uncus undiq; leuis acuminis breuis, qui uel oculo, uel auri, uel
 ori, interdum etiam fronti recte inijcitur, deinde attractus infantem
 educit: neq; tamen quolibet his tempore extrahi debet. nam si com-
 presso uulvæ ore id tentatum est, nō emittente eo infans abruptitur:
 & unci acumen in ipsum os uulvæ delabitur: sequiturq; nervorum
 distentio, & ingens periculum mortis. igitur compressa uulua, conge-
 scere. hiante, leniter trahere oportet: & per has occasionēs paulatim
 eum educere. trahere autē dextra manus uncum, sinistra intus pos-
 ta infantem ipsum: simulq; dirigere eum debet. Solet etiam euenire,
 ut is infans humore distendatur: exq; eo profuāt fœdi odoris sanies.

LIBER

quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut effuso humore extenuetur. tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. nam uncus iniectus facile hebeti corpusculo eleuabitur. in quo quid periculi sit, supra positum. sed in pedes quoque conuersus infans non diffuculter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commode educatur. si uero transuersus est, neque dirigi potuit, uncus alae iniiciendus, paulatimque attrahendus est. sub quo fere cernix replicatur, retroque caput, ac reliquum corpus spectat. remedio est cernix praecisa, ut separatim utraque pars auferatur, id unco fit, qui priori similis in anteriorem tantum partem per totam aciem exacuitur: tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia fere maiore parte extracta, caput in uacuum uuluum prolabitur, extrahi que sine summo periculo non potest: si tamen id incidit, super uentrem mulieris duplici panniculo iniecto, ualens homo non imperitus a sinistro latere eius debet assistere, et super ipsum uentrem eius duas manus imponere, alteraque alteram premere. quo fit ut illud caput ad os uulvae compellatur. idque eadem ratione quae supra posita est, unco extrahitur. at si pes alter iuxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid protractum est, paulatim abscidendum est: et si clunes os uulvae urgere coeperunt, iterum retro repellendae sunt. conquiescitque pes eius adducendus. aliaeque etiam num difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, concisus eximi debeat. quotiens autem infans protractus est, tradendus ministro est. is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas secundas uocat. quod uelamentum infantis intus fuit. hisque ultimis apprehensis uenas, membranulasque omnes eadem ratione manu diducere a uulua, totumque illud extrahere. et si quid intus praeterea concreti sanguinis remanet, tum compressis in unum feminibus, illa conclauis collocanda est, modicum calorem sine ullo praestatu habente. super ipsum uentrem eius imponenda lana succida in aceto, et rosa tincta. reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, et in his uulneribus, quae in nervosis locis sunt, adhibeatur.

De ani uicijs, et eorum curatione. Cap. XXX.

Ni quoque uicia ubi medicamentis non uincuntur, manus auxilium desiderant. ergo si qua scissa in eo uetustate induruerunt, iamque callum habent, commodissimum est ducere alium: tum spongiam calidam admouere, ut relaxentur illa, et foras prodeant. ubi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, et ulcera remouere.

remouere. deinde imponere linamentum molle, & super linteolum illitum melle, locumq; eum molli lana implere & ita uincere altero die, deincepsq; cæteris lenibus medicamentis uti: quæ ad recentia eadē uicia necessaria esse aliàs proposui: & utiq; per primos dies sorbitionibus eum sustinere paulatim: deinde cibis adijcere aliquid generis tamen eius, quod eodem loco præceptum est. si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit incidendum est, ne anus ipse suppuret. neq; tamen ante properandum est. nam si crudum incisum est, inflammationis multum accedit: & puris aliquanto amplius conatatur. his quoque uulneribus lenibus cibis, hisdemq; medicamentis opus est.

De condylomatum curatione.

Tubercula, quæ *νοδὺλώματα* appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur. alius ante omnia ducitur. tum uolsella tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. quod ubi factum est eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. tantummodo si quid increſcit squama æris contrahendum est. ora etiam uenarum fundentia sanguinem sic tolluntur. ubi sanguini, qui effluit, sanies adijcitur: alius acrius ducitur, quo magis ora promoucantur. eoq; fit, ut omnes uenæ, quasi capitula cōspiciantur. tum si capitulum exiguum est, basimq; tenuem habet, astringendum lino paulum supra est, quam ubi cum ano committitur. imponenda spongia aqua calida est, donec id libeat. deinde aut ungue, aut scalpello supra nodum id exulcerandum est. quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur. interdum etiam urinae difficultas. si id maius est, & basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est: paulumq; supra basim incidendum: neq; relinquendum quicquam ex eo capitulo: neq; quicquam ex ano demendum est. quod consequitur his, qui neq; nimium, neq; parum hamos ducit. qua incisum est, acis debet immitti: infraq; eam lino id capitulum alligari: si duo, triaue sunt, unum quodq; primum curandum est. si plura, non omnia simul, ne tempore eodem undiq; teneræ cicatrices sint. si sanguis profluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum. ungenda fœmina, & inguina, & quicquid iuxta ulcus est. ceratumq; superandum est. farina ordeacea calida implendusq; is locus est. sic deligandus est. postero die is desidere in aqua calida debet: eodemq; cataplasmate foveri. ac bis die, & ante curationem, & post eam ceruices, ac femina liquido cerato perungenda sunt: tepidoq; is loco continendus. interpositis quinque, aut sex diebus oriculario specillo linamenta edu-

Aurelij Cor.

r iij

LIBER

enda. si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. tum leni-
bus medicamentis hisdemq; quæ alibi posui, ulcera ad sanitatem per-
ducenda. finito uicio quemadmodum agendum esset, iâ aliâs superius
exposui.

De uaricum curatione. Cap. XXXI.

Varices
X
B his ad crura proximus transitus est. in qbus orti uarices
non difficili ratione tolluntur. huc autem et earum uenu-
larum, quæ in capite nocent, et eorum uaricum, qui in uen-
tre sunt, curationem distuli: quoniam ubiq; eadem est. igitur uena ois,
quæ noxia est, aut adusta tabescit: aut manu exciditur. si recta est,
si quamuis trāsuerſa, tamen simplex: si modica est, melius aduritur. si
curua est et uelut in orbes quosdam implicatur, pluresq; inter se
inuoluuntur, utilius eximere est: adurendi ratio hæc est. cutis super
inciditur. tum patefacta uena tenui, et retuso ferramento candente
modice præmitur: nitaturq; ne plage ipsius oræ adurantur: quas re-
ducere hamulis facile est. id interpositis ferè quaternis digitis per. to-
tum uaricem fit: et tum superimponitur medicamentum, quo adusta
sanantur: at exciditur hoc modo. cute eadem ratione super uenam in-
cisa hamulo oræ excipiuntur: scalpelloq; undiq; à corpore uena didu-
citur: caueturq; ne inter hæc ipsa lædatur: eiq; retusus hamulus subi-
citur, interpositoq; eodem ferè spacio. quod supra positum est, in eadē
uena idem fit, quæ quo tendat, facile hamulo extento cognoscitur. ubi
iâ idem, quacumq; uarices sunt, factum est, uno loco adducta per
hamulum uena præciditur: deinde qua proximus hamus est, attra-
hitur, et euellitur: ibi rursus absciditur. ac sic undiq; uariabus cru-
re liberato, tum plagarum oræ committuntur: et super emplastrum
glutinans inijcitur.

Curatio digitorum cohærentium. Cap. XXXII.

Amund n.
effund n.
T si digiti uel in utero protinus, uel propter communē exul-
cerationem postea cohæserunt, scalpello diducuntur. dein se-
paratim uterq; non pingui emplastro circumdatur. atq; ita
per se uterq; sanescit. si uero sit ulcus in digito, posteaq; male indu-
cta cicatrix circum eum reddit, primū malagma tentandum est.
dein si id nihil prodest, quod et in ueteri cicatrice, et ubi nerui læsi
sunt, euenire consuevit: uidere oportet nerui ne id uicium, an cutis sit.
si nerui est, attingi non debet, neq; enim sanabile est. si cutis, tota cicat-
rix excidenda est: quæ ferè callosa efficit, ut extendi digitem non
patiatur: tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

Angrena inter ungues, alasq; aut inguina nasci: Et si quan-
do medicamenta unguuntur, membrum præcidi oportere, alio
loco mihi dictum est. sed id quoq; cum periculo summo fit
nam sæpe in ipso opere, vel profusione sanguinis, vel animæ defectio-
ne moriuntur. uerum hic quoq; nihil interest an satis tutum præsi-
dium sit: quod unicum est. igitur inter sanam, uitiatamq; partem in-
cidenda scalpello caro usq; ad os est sic, ut neq; contra ipsum articu-
lum id fiat: Et potius ex sana parte aliquid excidatur, quam ex æ-
gra relinquatur. ubi ad os uentum est, reducenda ab eo sana caro, Et
circa os subsecunda est, ut ea quoq; parte aliquid os nudetur: dein id
ferrula præcidendum est, quam proxime sanæ carni etiam inhaeren-
ti. ac tum frons ossis, quam seruula exasperauit, leuanda est, supraq;
inducenda cutis, quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet ut quæ
maxime undiq; os contegat. quo cutis inducta non fuerit id linamen-
tis erit contegendum, Et super id spongia ex aceto deliganda. cætera
postea sic faciēda, ut in uulneribus, in quibus pus moueri debet, præ-
ceptum est.

LIBER OCTAVVS.

De positu, Et figura totius humani corporis. Caput primum.

Vperest ea pars, quæ ad ossa pertinet. quæ quo faci-
lius accipi possit, prius positus, figurasq; eorum indi-
cabo. Igitur caluaria incipit ex interiore parte conca-
ua, extrinsecus gibba, utrinq; leuis, Et qua cerebri
membranam contegit. Et qua cute capillum gignente
contegitur. eaq; simplex ab occipitio Et temporibus, duplex usque in
uerticem à fronte est. ossaq; eius ab exterioribus partibus dura, ab
interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. interq; ea
uene discurrunt, quas his alimentum subministrare credibile est. ra-
ro autem caluaria solida sine suturis est. locis tamen æstuosius facilius
inuenitur. Et id caput firmissimum, atq; à dolore tutissimum est: ex
cæteris, quo suturæ pauciores sunt, eo capitis ualetudo commodior est.
neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem: fere
tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discret-
unt. tertia ad aures per uerticem tendens, occipitium à summo ca-
pite diducit. quarta ab eodem uertice per medium caput ad frontem

r iiij

LIBER

procedit, eaq; modo sub imo capillo desinit: modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. ex his ceterae quidem suturae in unguem committuntur. haec uero quae super aures transuersae sunt, totis oris paulatim extenuantur: atq; ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. crassissimum uero in capite os post aurem est, quia capillus ut uerisimile est, ob id ipsum non gignitur. sub his quoq; musculis, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatam positum est. at facies suturam habet maximam, quae a tempore incipiens per medios oculos, naresq; transuersa peruenit ad alterum tempus: à qua breues duae sub interioribus angulis deorsum spectant. et malarum quoq; in summa parte singulae transuersas suturas habent. à medijsq; naribus, aut superiorum dentium ginguis per medium palatum una procedit: aliaq; transuersa idem palatum secat. et suturae quidem in plurimis haec sunt. foramina autem intra caput maxima oculorum sunt: deinde narium, tum quae in auribus habemus: ex his quae oculorum sunt, recta, simpliciaq; ad cerebrum tendunt. narium duo foramina osse medio discernuntur. siquidem haec primum à supercilijs, angulisq; oculorum osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagine uersae quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quoq; molliuntur. sed ea foramina quae à summis ad imas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera diuiduntur. aliaq; ex his ad fauces peruia spiritum et reddunt, et accipiunt: alia ad cerebrum tendunt. In ultima parte in multa, et tenuia foramina dissipantur, per quae sensus odoris nobis datur: in aure quoq; primo rectum, et simplex iter procedendo flexuosum fit. quod ipsum iuxta cerebrum in multa et tenuia foramina diducatur, per quae facultas audiendi est: iuxtaq; ea duo paruuli quasi sinus sunt. superq; eos finitur os: quod transuersum à genis tendens ab inferioribus ossibus sustinetur: iugale appellari potest ab eadem similitudine à qua id graeci *ζυγώδες* appellant. maxilla uero est molle os, eaq; una est, cuius eadem et media, et etiam ima pars mentum est: à quo utrinq; procedit ad tempora: solaq; ea mouetur. nam malarum cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. uerum ipsius maxillae partes extremae quasi bicornes sunt. alter procerus intra latior uertice ipso tenuatur: longiusq; procedens sub osse iugali subit: et super id temporum musculus illigatur. alter breuior, et rotundior, et in eo sinus qui iuxta foramina auris est, cardinis modo fit: ibiq; huc, et illuc se inclinans, maxillae facultatem motus praestat. duriores osse dentes sunt. quorum pars maxillae, pars superiori ossi malarum haeret. ex his quaterni primi quia secant, *τετρωνοι* à graecis nominantur. hi deinde

quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. ultra quos utrinque
 ferè maxillares quaterni sunt, præterque in his, in quibus tres ultimi, qui
 sero gigni solent: non increuerunt. ex his priores singulis radicibus,
 maxillares utique binis, quidam etiam ternis, quaternis ueniantur.
 Fereque longior radix breuiorem dentem edit: rectique dentis recta etiam
 radix, curui flexa est: exque eadem radice in pueris nouus dens subit:
 qui multo sæpius priorem expellit: interdum tamen supra, infra uerum
 se ostendit. caput autem spina excipit. ea constat ex uertebis qua-
 tuor et uiginti. septem in cervice sunt: duodecim ad costas. reliquæ
 quinque sunt proximæ costas. hæc teretes, breuesque ab utroque latere pro-
 cessus duos exigunt. mediæ perforatæ, quæ spinæ medulla cerebro com-
 missa descendit. circa quoque per duos processus tenuibus canis peruiæ,
 per quæ à membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. om-
 nesque uertebæ exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis
 processibus parum desidenti sinus habent: ab inferiore alios deor-
 sum uersus processus tenuibus, cuius peruiæ per quæ à membrana ce-
 rebri similes membranulæ deducuntur. omnesque uertebæ exceptis
 tribus summis à superiore parte in ipsis processibus parum desiden-
 tis sinus habent: ab inferiore alios deorsum uersus processus exigunt.
 summa igitur protinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis
 eius processibus. quo fit, ut caput sursum deorsum uersum tuberculis
 exasperetur: secunda superiori parti inferiore. quæ ad arcum perti-
 net, pars summa angustiore orbe finitur. Itaque superior summæ cir-
 cundata, in latera quoque caput moueri sinit. tertia eodem modo secun-
 dam excipit: ex quo facilis cervice mobilitas est. ac ne sustinere quidem
 caput posset, nisi utrinque recti, ualentesque nervi collum continerent: quos
 ζέροντας græci appellant. siquidem horum inter omnes flexus alter
 semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. iamque uerte-
 bra tertia tubercula quæ inferiori inserantur, exigit. cæteræ proces-
 sibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur: ac per sinus
 quos utrinque habent, superiores accipiunt: multisque nervis, et multa
 cartilagine continentur. ac sic uno flexu modico in promptum dato,
 cæteris negocijs homo, et rectus insistit: et aliquid ad necessaria ope-
 ra curuatur. infra ceruicem uero summa costa contra humeros sita
 est: inde undecim inferiores usque ad imum pectus perueniunt: hæque
 primis partibus rotundæ, et leniter quasi capitulatæ uertebrearum
 transversis processibus ibi quoque paulum insinuatæ inhaerent. inde
 pateant: et in exteriorem partem recuruatæ, paulatim in cartilagi-
 nem degenerant. eaque parte rursus in interiora leniter flexe commit-
 tuntur cum osse pectoris. quod ualens, et durum à faucibus incipit, ab

LIBER

utroque latere lunatum, & à præcordijs iam ipsum quoque cartilagine
mollitiam terminatur. sub costis uero prioribus, quinque quas uocant græ
ci nominant, breues, tenuioresque, atque ipsæ quoque paulatim in cartila
ginem uersæ, extremis abdominis partibus inhaerescunt. imaque ex
his maiore iam parte nihil nisi cartilago est. rursus à cervice duo la
ta ossa utrinque ad scapulas tendunt. nostri scapula aperta, ὠμωπλά
τος græci nominant. ea in summis uerticibus sinuata, ab his triangu
la, paulatimque lateſcentia ad spinam tendunt: & quo latiora quaque
parte sunt hoc hebetiora, acque ipsa quoque in imo cartilaginosa poste
riore parte uelut innatant, quoniam nisi in summo nulli ossi inhae
rescunt. ibi uero ualidis musculis, nervisque constricta sunt. at à sum
ma costa paulo interius quam ubi ea media est, os excreſcit: ibi quidē
tenue, procedens uero quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius,
latiusque, & paulatim in exteriora curuatum. quod propius, altera
uerticis parte modice intumescens, sustinet ingulum. id autem ipsum
recuruum, ac neque inter durissima ossa numerandum: altero capite
in eo quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit, paulūque
motu brachij mouetur: & cum lato osse scapularum infra caput, eius
nervis, & cartilagini connectitur. hinc humerus incipit extremis
utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla cartilaginofus. medius
teres, durus, medulloſus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem,
interiorem & exteriorem partem. prior autem pars est quæ à pecto
re est, posterior quæ ab scapulis, interior quæ ad latus tendit: exteri
or quæ ab eo recedit. quod ad omnes articulos pertinere in ulteriori
bus patebit. superius autem humeri caput rotundius quam cætera
ossa, de quibus adhuc dixi, uerticillatis scapularum ossibus paruo ex
cessu inseritur: ac maiore parte ex transitu nervus deligatur. at infe
rius duos processus habet: inter quos quod medium est, magis etiā ex
tremis partibus sinuatur. quæ res sedem brachio præstat: quod con
stat ex ossibus duobus. radius, quam ῥαδις græci appellant, supe
rior, breuiorque, & primo tenuior rotundo, & leniter curuo, capite exi
guum humeri tuberculum recipit: atque ibi nervus, & cartilagine conti
nietur. cubitus inferior, longiorque, & primo plenior in summo capite,
duobus quasi uerticibus extantibus in sinu humeri, quem inter duos
processus eius esse proposui, se inserit. primo uero duobus radijs bra
chij ossa iuncta paulatim dirimuntur: rursusque ad manū coeunt mo
do crassitudinis mutato: siquidem ibi radius plenior, cubitus admodū
tenuis est. dein radius in caput cartilaginofum consurgens, in uerti
cem eius sinuatur. cubitus rotundus in extremo, parte altera paulū
procedit. ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet. plu

rima ossa in cartilaginem desinere: nullum articulum non sic finiri. neque enim aut moveri posset, nisi leui inniteretur: aut cum carne, nervisque coniungi, nisi ea media quaedam materia committeret. in manus vero prima palmæ pars ex multis, minutisque ossibus constat, quorum numerus incertus est. sed oblonga omnia, et triacula structura quadam inter se connectuntur: cum inuicem superior, alterius angulus, alterius planities sit: eoque fit ex his unius ossis paulum in interiora concaui species. uerum ex manu duo exigui processus in sinus radii coniunguntur. tum ex altera parte recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent, à quibus ipsi digiti oriuntur: qui ex ossibus ternis constant: omniumque eadem ratio est. interius os in uerticem sinuatur: recipitque exterioris exiguum tuberculum, nervique ea continent, à quibus orti ungues indurescunt. ideoque non ossi, sed carni magis radicibus suis inherere. ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt. imma uero spina in coxarum osse discedit, quod transversum, longeque ualentissimum uuluum, uesciam, rectum intestinum tuetur, idque ab exteriori parte gibbum ad spinam, resupinatum à lateribus, id est in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus oritur os quod pectinem uocat. idque super intestina sub pube transversum uentrem firmat rectius in uiris: recurvatum magis in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat. inde foemina oriuntur: quorum capita rotundiora etiam quam humerorum sunt, cum illa ex ceteris rotundissima sint. infra uero duo os processus à priore, et à posteriore parte habent. dein dura, et medullosa, et ab exteriori parte gibba habent: rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt: superiora in sinus coxae sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, coniunguntur. tum infra inrorsus leniter intendunt, quo aequalius superiora membra sustineant. atque in eo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint: quae commissura osse paruo molli cartilaginoso tegitur: patellam uocant. haec super innatans, nec ulli ossi inherens, sed carne, et nervis deligata, pauloque magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur ipsum autem crus est ex ossibus duobus. et enim per omnia femur humero, crus uero brachio simile est. adeo ut habitus quoque, et decor alterius ex altero cognoscatur. quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. uerum alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod ipsum quoque sura recte nominatur. id breuius, supraque tenuius ad ipsos talos intumescit. alterum à priore parte positum, cui tibiae nomen est, longius, et in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur: sicut cum humero cubitus. atque ea quoque ossa infra, supraque coniunguntur.

LIBER

Ita media ut in brachio dehiscunt. excipitur autē crus infra ossa ex transuerso talorum, idq; ipsum super os calas situm est, quod quadā parte sinuatur: quadam excessus habet: & procedentia ex talo recipit: & in sinum eius inseritur. idq; sine medulla durum, magisq; in posteriorem partem proiectum teretem ibi figuram representat. cætera ossa pedis ad eorum quæ in manu sunt similitudinem instructa sunt. plantæ palmæ, digiti digitis, ungues unguibus respondens.

Ossa uiciata, & corrupta quibus signis cognoscantur: & quæ ratione curentur. Cap. II.

Mne autem os ubi iniuria accessit, aut uiciatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur. id quod uiciatum est, primo ferè pingue fit: deinde uel nigrum, uel cariosum: quæ super natis grauibus ulceribus, aut fistulis: hisq; uel longa uetustate, uel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet autem ante omnia os nudare ulcere exciso: & si latius eius uicium est, quàm ulcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os undiq; pateat: tum id quod pingue est semel, iterum uel satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo statu secedat: aut eradere donec iā aliquid cruoris ostendatur: quæ integrioris nota est. nam necesse est aridum sit id, quod uiciatum est. idem in cartilagine quoq; læsa faciendum est. siquidem ea quoq; scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquitur. deinde siue os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. neque alia facienda sunt ubi caries, nigrities uel in summo osse est. siquidem id uel paulo diutius eodem ferramento adurendum, uel radendum est. qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum debet, ut & agat aliquid: & maturius desinat. finis est, cum uel ad album os, uel ad solidum uentum est. albo finiri ex nigritie uitium, soliditate quadam ex carie manifestum est: accedere etiam cruoris aliquid integro supra dictum est. si quando autem altius descenderit, utrunlibet dubium est: in carie quidem expedita cognitio est. specillum tenue in foramen demittitur. quod magis, minus uel intrando, uel in summo cariam esse, uel altius descendisse testatur. nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore, & ex febre. quæ ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest: manifestior tamen ad acta terebra fit. nam finis uicij est, ubi scobis nigra esse desit. igitur si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est: quæ altitudine uicium æquent. tum in ea foramina demittenda candētia ferramenta sunt: donec inde sicum os ex toto fiat. simul enim post hæc & resoluetur ab infirioe osse quodcumq; uiciatū

est: & his sinus carne replebitur: & humor aut nullus postea fertur, aut mediocris. sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. atque idem in carie quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. sed quod totum uiciatum, totum eximendum est. si inferior pars integra est, catenus quod corruptum est, excidi debet. item siue capitis, siue pectoris os, siue costae cariola est, inutilis uicio est: & excidendi necessitas est. neque audiendi sunt qui osse nudato diem tertium expectant, ut tunc excidant. ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. itaque quantum fieri potest eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum: et omni uicio liberandum est. longeq; pernitiosissimum est, quod in osse pectoris est: quia uix etiam si recte cessit, curatio uera sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur, & de modiolis, & terebra ferramentis ad id paratis. Cap. III.

Exciditur uero os duobus modis: si paruum est, quod laesum est, modiolis, quem *χοιρίδιον* graeci uocant. si spaciosus, terebris. utriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum, teres est imus oris ferratum, per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duo genera sunt: alterum simile ei quo fabri utuntur. alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit: atque iterum ab alio principio paulo minus quam equaliter sursum procedit. si uicium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. & si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clauum recipiat, ut eo insistente circumactus modiolus delabi non possit. deinde uis habena quasi terebra conuertitur. estque quidam premendi modus, ut & foretur, & circumagatur. quia si leuiter imprimitur, parum proficit. si grauiter, non mouetur. neque alienum est instillare paulum rosei uel lactis, quo magis lubrico circumagatur. quod ipsum tamen si copiosius est, aciem ferramenti hebetat. at ubi iam iter modiolis pressum est, medius clauus educitur: & ille per se agitur. deinde cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur. at si latius uicium est, quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. ea foramen fit in ipso sine uiciosi ossis atque integri: deinde alterum non ita longe. tertiumque donec totus is locus, qui excidendus est, his clauis cinctus sit. atque ibi quoque quatenus terebra agenda sit, scobis significat. tunc ex alio foramine ab altero foramine ad alterum malleolo ada-

LIBER

etus: id quod inter utrumque medium est, excidit: ac sic ambitus similis
 ei fit, qui in angustiore orbem modiolio imprimitur. utro modo ue-
 ro id circumductum est, idem exasorius scalper in osse corrupto pla-
 nus summam quamque testam læsit, donec integrum os relinquatur.
 Vix unquam nigrities integrum, caries per totum os perrumpit: ma-
 ximeque ubi uitiata caluaria est. Id quoque signi specillo significatur, qui
 depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet: et ob id
 renitens aliquid inuenit, et madens exit. si peruium inuenit, altius
 descendens inter os, et membranam nihil oppositum inuenit: educa-
 turque sicut, non quo non subsit aliqua vitiosa sanies, sed quoniam
 ibi, ut in latiore sede diffusa sit. Siue autem nigrities, quam terebra
 detexit: siue caries, quam specillum ostendit, os transit: modiolii quidem
 usus ferè superuacuis est: quia latius pateat necesse est, quod iam alte
 processit. terebra uero ea, quam secundo loco posui utendum, eaque ne
 nimis incutiat, subinde in aquam frigidam demittenda est sed tum
 maiore cura agendum est: cum iam aut simplex os dimidium perfo-
 ratum est: aut in duplici, superius illud, spatium ipsum, hoc sanguis
 significat. ergo tum lentius ducenda habena: suspendendaque magis sini-
 stra manus est, et sæpius attollenda: et foraminis altitudo conside-
 randa: ut quandoque os perrumpitur sentiamus: neque periclitemur,
 ne mucrone cerebri membrana lædatur: ex quo graues inflammatio-
 nes cum periculo mortis oriuntur. factis foraminibus eodem modo me-
 dia sæpe, sed multo circumspectius excidenda sunt: ne forte angulus
 scalpri eandem membranam uolet: donec fiat aditus, per quam me-
 branæ custos immittatur: *μνηστροπύλακα* græci uocant. lamina aenea
 est firma, paulum resina, ab exteriori parte læuis, quæ demissa est,
 ut exterior pars eius cerebro propior sit. subinde ei subiungatur quod
 scalpri discutiendum est. ac si excipit eius angulum, ultra transire
 non patitur: eoque et audacius, et tutius scalprium malleolo subinde
 medius ferit, donec exasum undique os eadem lamina leuetur: tollique
 sine ulla noxa cerebri potest. Vbi totum os eiectum est, circumraden-
 da, leuandaque sunt ora: et si quid scobis membranæ insedit, colligen-
 dum. ubi superiori parte sublata, inferior relicta est, non ora tantum,
 sed os quoque totum lauandum est: ut sine noxa postea cutis increseat.
 quæ aspero osse innascens protinus non sanitatem, sed novos dolores
 mouet. patfacto cerebro qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fra-
 cta ossa perueniero. si basis aliqua seruata est, superimponenda sunt
 medicamenta non pingua, quæ recentibus uulneribus accommodan-
 tur: supraque imponenda lana succida oleo, atque aceto madens. ubi te-
 pus processit, ab ipso ore caro increstat, eaque factum manu sinum co-

plet. si quod etiam os adustum est, à parte sana recedit: subitq; inter integram atq; emortuam partem caruncula: quæ quod abscissit, expellat. eaq; ferè quia testa tenuis, & angusta est: squama, idest ætis à græcis nominatur. Potest etiam euenire, ut ex ictu neq; findatur os, neq; perfringatur: sed summum tamē collidatur, exaspereturq;: quod ubi incidit, radi, & lauari satis est. hæc quauis maxime sunt in capite, tamen cæteris quoq; ossibus communia sunt: ut ubicunq; idem incidet, eodem remedio sit utendum atq; cum ea fracta, fissa, forata, collisa sint: quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. de quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

De caluariæ curatione.

Cap. IIII.

Citur ubi ea pertusa, protinus requirendum est, num bilis homo uenerit: num oculi eius obæcati sint: num obmutuerit: num per nares, aures uel sanguis ei effluerit: num ceciderit: num sine sensu quasi dormiens iacuerit. hæc enim non nisi osse fracto eueniunt. atq; ubi inciderunt, scire licet necessariam, sed diffiilem curationem esse. si uero etiam torpor accessit, si mens non constat, si nervorum uel resolutio, uel distentio secuta est: uerisimile est etiam cerebri membranam esse uiolatam: eoq; in angusto magis spes est. at si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari an os fractum sit. & protinus considerandum est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit. et hoc ipso leni, an aspero, mediocri, an uastiore: uehementer, an leniter. quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei resitisse credibile est. sed nihil tamen melius est, quàm certiore id nota explorare. ergo qua plaga est, demitti specillum oportet, neq; nimis tenue, neq; acutum: ne cum in quosdam sinus naturales incidet, opinionem fracti ossis frustra faciat: neq; nimis plenum, ne parua læ rimulæ fallant. ubi specillum ad os uenit, nihil nisi lene, & lubrum occurrit: integrum id uideri potest. si quid asperi est, utique quasuture non sint, fractum os esse testatur. à futuris se deceptum esse Hippocrates memoriæ prodidit more scilicet magnorū uirorū, & si duciā magnarū rerum habentium. nam leuia ingenia, quia nihil habent: nihil sibi detrahunt. magno ingenio, multaq; nihilominus habeturo conuenit etiā simplex ueri erroris confessio, præcipueq; in eo misterio quod utilitatis causa posteris traditur. ne qui decipiatur eadē rōne, qua quis ante deceptus est. sed hæc quidem aliquā memoria magni professoris uti interponeremus effecit. potest aut futura eo no-

Hippo: à futuris
deceptum.

LIBER

mine fallere. quæ æque aspera est, ut aliquis hanc esset, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc verisimile est. ergo eo nomine decipi non oportet: sed os aperire tutissimum est. nam neque utique certa sedes ut supra posui, futurarum est: et potest idem, et natura liter commissum, et ictu fissum esse: iuxta uero aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit uehementior, quamuis specillo nihil inuenitur: tamen aperire commodius est. at si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os attramentum scriptorium est: deinde scalpro id detrahendum. nigritiem enim continet si quid fissum est. solet etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, et os altera fiderit. itaque si grauius aliquis percussus est, si mala inditia subsecuta sunt, neque ea parte quæ cutis discussa est, rima reperitur: non incommodum est parte altera considerare, nunquis locus mollior sit, et tumeat: eumque aperire. si quidem ibi fissum os reperietur. nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiam si frustra detecta est. os fractum nisi succursum est, grauib. inflammationibus afficit: difficiliusque postea tractatur. raro, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem totum integrum maneat: intus uero ex ictu uena aliqua in cerebri membrana rupta, aliquid sanguinis mittat. isque ibi concretus magnos dolores moueat: oculos quibus obceat. sed ferè contra id dolor est, et eo loco cute incisa pallidum os reperitur. ideoque id quoque os excidendum est. quacumque autem de causa curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid læsum est, in conspectu sit. in quo ipso uidentur, nequid ex ipsa membrana, quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur. si quidem hæc scalpro, te rebris uero lacerata uehementes febres cum inflammationibus excitat. itaque eam commodius est ex toto ab osse diduci. plagam, si ex uulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. si manu facièda est, ea ferè commodissima est, quæ duabus transversis lineis litteræ. X. figuram accipit: ut deinde à singulis procedentibus lingulis cutis subsequatur. inter quæ si sanguis fertur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus est: occupandusque obiectis linamentis. et caput altius excitandum. neque id uicium ullum metum, nisi inter musculos, qui temporaria continent, affert: sed ibi quoque nihil tutius fit. In omni uero fisso, fracto uero osse protinus antiquiores medici ad ferramenta ueniebant: quibus id exciderent. sed multo melius est, ante emplastra experiri, quæ caluariæ causa componuntur: eorumque aliquid oportet ex aceto mollium per se super fissum, fractum uero os imponere. deinde super id aliquanto latius quam uulnus est, eodem medicamento illitum lintolū, et præterea succidam lanam aceto tinctam. tunc uulnus deligare, et quotidie

*Atramentum
quod aptat.*

*os findi altera
parte qua os fra-
ctum est.*

*uena rupta
osse illoso.*

quotidie resolvere, similiterq; curare usq; ad diem quintum. à sexto die etiam uapore aquæ calidæ per spongiam fouere. cætera ex eadem facere. quod si caruncula increscere cœperit, & febricula, aut soluta erit, aut lenior & cupiditas abi reuerterit, satisq; somni accedet: in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum adiecto cerato ex rosa factò, quo si alius carnem producat. nam per se reprimendi uim habet. hac ratione sepe rimæ callo quodam implentur, estq; ea, ossis uelut ciatrix. & latius fracta ossa, si quainter se non cohærebant, eodem callo glutinantur: estq; aliquanto melius uelamentum cerebro, quàm caro quæ ex ossis increscit. si uero sub prima curatione febris intenditur, breuesq; somni, & idem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet: neq; aliter: & in ceruicibus glandulæ oriuntur: magni dolores sunt: cibiq; super hæc fastidium increscit: tum demum ad manum, scalprumq; ueniendum est. duo uero sub ictu caluariæ pericula sunt, ne uel findatur, uel medium desinat: si fissum est, possunt oræ esse compressæ: uel quia altera super alteram excessit: uel etiam quia uehementer rursus se commiserunt. ex quo euenit ut humor ad membranam quidem descendat, exinam uero non habeat: ac sic eam irriter, & graues inflammationes moueat. ubi medium desedit, eandem cerebri membranam os urget. interdum etiam ex fractura quibusdā uelut aculeis pungentibus: his ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. ergo si ora alteri insedit, satis est id quod eminet plano scalp pro excidere. quo sublato iam rima hiat quantum curationi satis est. at si oræ inter se comprimuntur, à latere eius interposito digiti spacio, terebra foramen faciendum est: ab eoq; scalper duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem. C. litteræ, sicut uertex eius à foramine basis ad rimas in quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: & ita nihil latens in eo esse concutitur est: abundeq; exitus datur intus lædentibus. ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est. sed siue totum perfractum est, & ab alio ex toto recessit, siue circumpositæ caluariæ inheret, exigua parte ab eo quod naturaliter se habet, scalp pro diuidendum est. deinde in eo quod desedit, iuxta rimam quam fecimus, foramina addenda sunt. si in angusto noxa est, duo. si latius patet, tria, septaq; eorum excidenda: & tum scalp per utrinque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum faciat: imaq; pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. deinde si qua labent, & ex facili remoueri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt, maximeq; ea quæ acuta membranam infestant: si id ex facili fieri non po-

Aurelij Cor.

S

LIBER

est: subijcienda lamina est, quam custodem eius membranæ esse pro-
posui: & super eam quicquid spinosum est, & intus eminet, excide-
dum est, eadem lamina quicquid deorsum infedit, attollendum. hoc
genus curationis effiat, ut qua parte fracto ossa tamen inhaerent, soli-
dentur, qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamento
tempore excidant, spatiumq; inter hæc satis illi magnum ad extra-
hendam sanem relinquatur: plusq; in osse propugnaculi cerebrum
habeat, quam habiturum fuit eo ex quo. his factis ea membrana acri-
aceto respergenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibe-
atur: siue intus concretus cruor remanet, discutiat. tum idem me-
dicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollium ipsi mem-
branæ imponendum est. cæteraq; eodem modo facienda sunt, quæ ad
linetolum illitum, & lanam succidam pertinent. collocandusq; in loco
intepido: & curandum quotidie vulnus, his etiam æstate. quod si me-
brana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepi-
da si usq; eo tumebit, ut super ossa quoq; emineat: coercebit eam bene
tritâ lenticula, uel folia uitis contrita, & cum recenti uel butyro, uel
adipe anserino mixta, ceruixq; molliori debeat liquido cerato ex iri-
no facto. at si parum pura membrana uidebitur par modus eius em-
plastri, & nullis miscendus erit, idq; superinfundendum, eiusq; con-
tinendi causa unum, aut alterum linamentum injiciendum, & super
linetolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. ubi plus pura mem-
brana est, eadem ratione adijciendum emplastro ceratum, ut carnem
producat. quod ad abstinentiam uero & primos, ultioresq; cibos, po-
tionesq; pertinet. eadem quæ in uulneribus præcepi, seruanda sunt:
eo magis, quo periculosius hæc pars afficitur. quin etiam cum iâ nō
solum sustineri, sed aliis his quoq; apparebunt: tamen erunt uitanda
quæcunq; mandenda sunt. item fumus, & quicquid exatât sternuta-
mentum spem uero certam faciunt membrana mobilis ac sui coloris,
cero increscens rubicunda, facilis motus maxillæ, atq; ceruicis. mala
signa sunt. membrana immobilis nigra, uel liuida, uel aliter coloris
corrupti, dementia, acris uomitus, neruorum uel resolutio, uel disten-
tio: caro liuida, maxillarum rigor, atq; ceruicis. cæteraq; quæ ad so-
mnium, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent: eadem quæ
in cæteris uulneribus, uel salutaria, uel mortifera sunt: ubi bene res-
cedit, incipit ab ipsa membrana, uel si os eo loco duplex est, inde
quoq; caro increscere: eaq; id, quod inter ossa uacuum est, replet. non-
nunquam etiam super caluariam excrescit. quod si incidit, insper-
genda squama æris est, ut id reprimat, cohibeatq; ea carni superdā-
do quæ ad cicatricem perducant. omnibusq; ea locis commode induca-

Signa uitæ &
mortis. P

nar, excepta frontis ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est. ibi enim nix fieri potest, ut non per omnem ætatem sit exulceratio, quæ linteolo medicamentum habente contigenda sit: illa utiq; capite fracto seruanda sunt: ut donec iam ualida cicatrix erit soluenda, uideantur frequens balneum, maior uini modus.

De narium fractarum curatione. Cap. V.

N naribus uero & os, & cartilago frangi solet, et quidem modo aduersa, modo à latere: si aduersa fracta sunt, alterumue ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. si à latere os fractum est. is locus cauus est. si cartilago, in altera partem nares declinantur. quicquid in cartilagine inadit, excitandū leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinq; compressis. deinde in longitudinem implicata linamenta & molli pellicula anctā, circumfutaq; intus adijcienda sunt. aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo. aut grandis pinna gummi, uel fabrilis glutine illita, & molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilagine non sinat. sed si aduersa ea fracta est, æqualiter utraq; naris implenda est. si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua natus iacet, ab altera tenuius in id quod inseritur. extrinsecus autem circumdanda habena est mollis media illita mixtis inter se similia, & turis fuligine. eaq; ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est. id enim corpori quasi gluten inherescit: & cum induruit nares commodè continet sin quod intus inditum est, lædit: sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excitatæ nares eadem tantummodo habena continendæ sunt. deinde post quatuordecim dies id ipsum demendum est. resoluitur autem aqua calida: eaq; tum is locus quotidie fouendus est. sin os fractum est, id quoq; digitis in suam sedem reponendum est. atq; ubi aduersum, ut dictum est, utraq; naris implenda est. ubi à latere, ea inquam os impulsum est. imponendūq; ceratum, & paulo uehementius deligandum est: quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increfcit. à tertio die fouendum id aqua calida est: tantq; magis, quanto propius esse sanitati debet. quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda: imponendaq; extrinsecus eadem habena, & super eam ceratum, neq; ultra fascia adhibenda est. at si quod fragmentum undique resolutum cum cæteris non glutinabitur, intelligitur quidem ex humore, qui multus ex uulnere feretur: uolsella uero extrahetur. finis

isq; inflammationibus imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quæ leniter reprimunt. peius est ubi aut ossi, aut cartilagini fractæ cutis quoq; vulnus accessit. id admodum raro fit: si incidit, illa quidem nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. cuti vero super imponendum emplastrum aliquod ex his, quæ recentibus vulneribus accommodata sunt: sed insuper nullo vinculo deligandum est.

De aurium fracturarum curatione. Cap. VI.

In aure quoq; interdum rumpitur cartilago. quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum est. Sæpe enim suppurationem prohibet, & aurem confirmat. illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilagine ipsam glutinari, circa tamen carnem incrementum accrescere, solidariq; eum locum. itaq; si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinque sinitur. nunc autem de ea dico, quæ cute ita frangitur. in ea vero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis: & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est. deinde utendum est medicamento leniter supprimente, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat. tum imponendum linteolū cum emplastro sic, ut pingue omne vitetur: & à parte posteriore lana mollis auri subijcienda est: quæ, quod est inter hanc & caput, compleat. tum ea leniter deliganda est: & à tertio die vapore, ut in naribus posui, fouenda. atq; in his quoq; generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fractæ curatione, deq; quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. Cap. VII.

Ab his ad maxillam venturus indicanda quædam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadem dicenda sint. Omne igitur os modo rectum ut lignum in longitudinem finditur: modo fractum transversum: interdum obliquum, atq; id ipsum nonnunquam retusa habet capita: nonnunquam acuta. quod genus pessimum est: quia neq; facile committuntur, quæ nulli retuso inmittuntur, & carnem vulnerant: interdum nervum quoque, aut musculum: quin etiam aliquando plura fragmenta à fragmento fiunt. sed in alijs quidem ossibus ex toto sæpe fragmentum à fragmento recedit. Maxillæ vero semper aliqua parte, etiam uexata ossa inter se coherent. igitur in primis digitis duobus utrinque prementibus, & ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem compellenda sunt. deinde

inde si trasuersa maxilla fracta est, sub qua casu ferè dēs super proximum dentem excedit: ubi ea in suam sedem collocata est: duo proximi dentes, aut si hi labant, ultiores inter se seta deligandi sunt. id in alio genere fracturæ supernacuum est. cætera eadem faciendæ sunt. nam linteolum duplex madens uino, & oleo super iniiciendum cum eadem similia, & eadem turis fuligine est. deinde aut fasciæ, aut mollis habena media in longitudinem inasa, ut utrinq; mentum complectatur, & inde capita eius supra caput adducta ibi deligantur. illud quoq; ad omnia ossa pertinens dictum erit: fænum primum esse necessariam: deinde à die tertio humidum cibum, sublata inflammatione paulo plenior: eumq; qui carnem alat, per omne tempus uinum esse alienum. deinde tertio die resolui debere: foveriq; per spongiam uapore aquæ calidæ: eademq; quæ primo fuerunt super dari. item die quinto fieri, & donec inflammatio finiatur: quæ uel octauo die, uel septimo ferè resoluitur. ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. neq; id esse soluendum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæq; ossa conferuntur, transierint. ferè uero intra quartumdecimum & unum et uigesimalium diem sanescunt maxilla, malæ, iugulum, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta. inter uigesimalium & trigesimalium diem crura, brachiaq; inter septimū & uigesimalium & quadragesimum humeri, & foemina. sed in maxilla illud quoq; adiiciendum est, quod humidus cibus diu assumendus est. atq; etiam cum tempus processit, in lagano, similibusq; alijs perseuerandum, donec ex toto maxillam callus firmarit. item utique primis diebus habendum silentium.

De iuguli fracti curatione. Cap. VIII.

iugulum uero si transuersum fractum est, nonnunquam p
se rursus recte coit: & nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. nonnunquam uero, maximeq; ubi motum est, elabitur. ferèq; id quod à pectore, sub id quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. cuius ea ratio est, quod per se non mouetur: sed cum humeri motu consentit. itaq; eo subsistente sub id humerus agitur. raro uero admodum in priorem partem iugulum inclinatur: adeo ut magni professores nunquam se uidisse memorie mandarent. sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est. uerū ut dissimilis uterq; casus est, sic quædam dissimilia requirit. ubi ad scapulas iugulum tendit, simul dextra manu planè propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. ubi ad

Aurelij Cor.

f ij

LIBER

pectus conuersum est: ipsum quidem retro dandum: humerus autem in priorem partem adducendus est. ac si is inferior est, non id quod à pectore est, deprimendum est, quia immobile est: sed humerus ipse attollendus. si casu superior est, id quod à pectore est: implendum lana: & humerus ad pectus deligandus est. si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem uulnerant, præcidenda sunt. tunc reclusa ossa cōmittenda sunt. si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est in uino, & oleo tinctum si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemq; intus incerato, ne fascia diducatur. quæ iugulo composito circumdanda est sæpius, potius quàm ualentius. quod ipsum quoq; in omnibus ossibus fractis perpetuum est. à dextro uero iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram: à sinistro ad dextram: rursusq; sub ala sua fasciari debet. post hæc si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus. si in partem priorem, ad ceruicem deligandum est. supinusq; homo collocandus: cæteraq; eadem facienda, quæ supra comprehensa sunt. sunt uero plura ossa ferè immobilia uel dura, uel cartilaginosa, quæ uel franguntur: uel forantur: uel colliduntur: uel finduntur. ut malæ, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina costarum, os tali, calx, manus, planta. horum omnium eadem curatio est, si supra uulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. quo sanescente rimas quoq; ossis, aut si quod ferrumen est, callus implet. si cutis integra est, & os læsum esse ex dolore colligimus: nihil aliud, quàm quiescendum: imponendumq; ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

De costarum fracturarum curatione. Cap. IX.

Proprie tamen quædam de costa dicenda sunt: quia iuxta uuln scera est: grauioribusq; periculis is locus expositus est. hæc quoq; igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rara est, lædatur: interdum fit, ut eā totum is casus perruperit. si tota fracta nō est, nec sanguis expuitur: nec febricula sequitur: nec quicquam suppurat, nisi admodum rare, nec dolor magnus est: tactu tamen is locus leniter indolescit: abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, facere: & à media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. ab uno uero & uigesimo die quo utiq; os esse debet glutinatum, id agendum. cibis uberioribus est utendum, ut corpus quampleniissimū fiat: quo melius os uestiat. quod illo loco tenerū, adhuc iniuriæ sub tenui cute ex-

positum est. per omne autem tempus curationis uitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus uehementior corporis, fumus, puluis: et quicquid uel tussim, uel sternutamentum mouet. ne spiritum quidem magnopere continere expedit. at si tota costa perfracta est, casus asperior est. nam & graues inflammationes, & febris, & suppuratio, & saepe uitae periculum sequitur: & sanguis spuitur. ergo si uires patiuntur ab eo brachio, quod super eam costam est, sanguis mittendus est. si non patiuntur, alius tamen sine ullo acri ducenda est: diutiusque inedia pugnandum. panis uero ante septimum diem non assumendus: sed una sorbitione uiuendum: imponendumque ei loco ceratum ex lino factum: cui cocta quoque resina adiecta sit: aut Polyarchi malagma, aut panacis ex uino, & rosa, & oleo: superque imponenda lana succida, mollis, & duae fasciae a medijs orsa, minimaque astrictae. Multo uero magis omnia uitanda, quae supra posui, adeo ut ne spiritus quidem saepius monendus sit. quod si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, uel ex tryxagae, uel ex ruta, uel ex herba stychnae, uel ex cumino, & pipere. Grauioribus uero doloribus urgentibus cataplasma imponi quoque conueniet, uel ex lolio, uel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. & id quidem interdum superiacebit noctu uero idem aut ceratum, aut malagma, aut pannus: quia potest cataplasma decedere. ergo quotidie quaeque resoluatur, donec iam cerato, aut malagmate possimus esse contenti. & decem quidem diebus extenuabitur fame corpus. ab undecimo uero alii incipit ideoque etiam laxior quamprimum fasciae circumligabitur: fereque ea curatio ad quadagesimum diem perueniet: quae si modus erit suppurationis, plus malagma quam ceratum ad digerendum proficiet. si suppuratio uicerit neque per quae suprascripta sunt discuti potuerit, omnis mora uitanda erit, ne os infra uicietur. sed qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perueniat: idque effundendum si nusquam caput se ostendit: ubi maxime pus subit, sic intellegimus: creta amolia totum locum illinimus, & si acari patiemur. quo loco maxime humor in ea perseuerauit, ibi pus proximum erit: eaque uti debet. si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum: demittendum erit linamentum, aut aliquid ex peniallo. quod summum lino sit deuinctum ut facile educatur. reliqua eadem, quae in ceteris adustis facienda sunt. ubi purum erit ulcus, alii corpus debet, ne tabes perniosa futura id malum subsequatur. non minusquam etiam leuius ipso osse affecto & inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam mucos similis intus coit: mollescitque contra cicatris, in qua simili uestione utendum est.

LIBER

De spinæ curatione.

N spina quoq; est quod proprie notemus. nam si id quod ex uerebra excedit, aliquo modo fractum est: locus quidē concavus fit: punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. quo fit ut homo in interiorem partem subinde nitatur. hæc noscendæ rei causa sunt. medicamentis uero hisdem opus est: quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

*De humeris
et h. l. h. p. p.
et h. l. h. p. p.
et h. l. h. p. p.*

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fracturâ, uel emulсорum, communibus curationibus. Cap. X.

Imiles rursus ex magna parte casus curationes quæ sunt humeris, et femoribus: communia etiam quædam humeris, brachijs, femoribus, cruribus, digitis. siquidem ea minime periculose media franguntur. quò propior fractura capiti uel superiori uel inferiori est: eò prior est. nam et maiores dolores affert: et difficilius curatur. ea maxime tolerabilis est simplex, transversa. peior ubi fragmenta, atq; ubi obliqua. pessimum ubi eadem acuta. nonnunquã autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius excidunt: aliudq; super aliud effertur. idq; ante omnia cõsiderari debet. Et sunt notæ certæ. si suis sedibus mota, resima, punctiõisq; sensum representant, tactu inæqualia sunt. si uero non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit, ubi loco suo non sunt: membrum id altero latere breuius est: et musculi eius tument. ergo si hoc depressum est, protinus id membrum oportet extendere. nam nervi, musculiq; intenti per ossa contrahuntur: neq; in suum locum ueniunt: nisi illos per uim aliquis intendit. rursus si primis diebus id obmissum est, inflammatio oritur: sub qua et difficile, et periculose uis nervis adhibetur. nam distentio nervorum uel cæcer sequitur: uel certum, ut mitissime alatur, pus. itaq; si ante reposita ossa non sunt, postea reponenda sunt. intendere autem digitum, uel aliud quoq; membrum: si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest, cum alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. ualentius membrum duobus eget: qui in diuersa contendant. si firmiores nervi sunt, ut in uiris robustis, maximeq; eorum feminibus, et cruribus euenit: habenis quoq; uel linteis fascijs utrinq; capita articularum deliganda, et per plures in diuersa ducenda sunt. ubi paulo longius quàm naturaliter esse debet membrum uis fecit. tunc demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt: inditumq; ossi repositi est dolor sublatus. et membrum alteri parti æquatum inuoluendum duplicibus triplicis panni, et in uino, et oleo tinctis:

quos linteos esse commodius est. ferè uero his sex opus est. prima bre-
uissima adhibenda, quæ circa fracturam ter uoluta sursum uersum
feratur, & quasi in coelea serpat: satisq; est eam ter hoc quoq; modo
circuire. altera dimidio longiore, eaq; qua parte os eminet, ab ea si to-
tum æquale est, undelibet super fracturam debet incipere priori
aduersa: deorsumq; tendere, atq; iterû de fractura reuersa in superio-
re parte ultra priorem fasciam desinere. super has iniiciendum latio-
re linto ceratum est, quod eas contineat. ac si qua parte os eminet,
triplex ea pannus obijciendus eodem uino & oleo madens. hæc ter-
tia fascia comprehendenda sunt: quartaq; sic, ut semper insequens
priori aduersa sit: & tertia tantum inferiore parte tres in superio-
re faciant: quia satius est sæpius circuire, quàm adstringi. siquidem
id quod adstrictum est, alienatur: & cancro opportunû est: articulum
autem quamminime uincire opus est. sed si iuxta hunc os fractum est,
necesse est. deligatum uero membrum in diem tertium continendum
est. eaq; iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit: non
tamen laxa uisa sit: secundo laxior: tertio iam penè resoluta. ergo tñ
rursum id membrum deligandum: adijciendaq; prioribus quinta fa-
scia est: iterumq; quinto soluendum est: & sexta fasciis inuoluen-
dum sic, ut tertia & quinta infra ceteræ supra finiantur. quotiens-
cunq; autem soluitur membrum, calida aqua fouendum est. sed si iux-
ta articulum fractura est: diu instillandum uinum est, exigua par-
te olei adiecta, eademq; omnia facienda donec adeo inflammatio sol-
uatur: uel lenius quoq; quàm ex consuetudine id membrum fiat: quod
si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet. tum facillime ossa tra-
stantur. rursum ergo si parum commissæ sunt, committi debent. si qua
fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt. deinde eodem mo-
do membrum deligandum, ferulæq; super acomodandæ sunt: quæ fi-
scæ, circumpositæq; ossa in sua sede contineant: & in quam partem
fractura inclinat, ab ea latior, ualentiorq; ferula imponenda est.
easq; omnes citra articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant: nec
ultra astringi, quàm ut ossa contineant, & cum spatio laxentur: tertio
quoq; die paulum habenis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus do-
lor est, sic manere donec duæ partes eius temporis quod quoq; os cõ-
seruet, compleantur: postea lenius aqua calida fouere: quia primo di-
geri materiam opus est: tum euocari. ergo cerato quoq; liquido id ple-
niter est unguendum: perfricandaq; summa cutis est: laxiusq; id deli-
gandum est. tertio quoq; die soluendum sic, ut remota calida aqua ce-
tera eadem fiant. tantummodo singulæ fasciæ quotiens resolutæ fue-
rint subtrahantur.

Puluer

Cunctum

Resurgens

Lini

Ferulæ

LIBER ATQVO

De fracti humeri curatione.

Haec communia sunt: illa propria. siquidem humerus fractus non sic, ut membrum aliud intenditur. sed homo collo catur alto sedili: medicus autem humiliore aduersus: una fasciā brachium amplexa ex ceruice ipsius, qui laesus est, id sustineat. altera ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum. Tertia iuncto inno humero deorsum demittitur, ibi quoq; capitibus eius inter se iunctis: deinde ab occipito ipsius minister sub ea fasciā, quam secundo loco posui: correpto si dexter humerus ducendus est dextro: si sinister, sinistro brachio demissum inter femina eius, qui curatur, baculum tenet. medicus super eam fasciā de qua tertio loco dixi, planā inijciat dextram: si sinister, sinistram, si dexter humerus sumatur. simulq; alteram fasciā minister attollit: alteram premit medicus. quo fit ut leniter humerus extendatur. fasciis uero, si medium aut inun os fractum est, breuioribus opus est: si summum, longioribus. ut ab eo sub altera quoq; ala perpectus, et scapulas porrigantur. protinus uero brachium cum deligatur, sic inclinandum est, id quod afficit, ut ante fascias quoq; sic figurandum sit, ne postea suspensum aliter aliter cum deligabatur, humerum inclinet. brachioq; suspensio ipse quoq; humerus ad latus leniter deligandus est. per q; fit, ut minime moueatur: ideoq; ossa sic se habent, ut aliquis composuit. cum ad ferulas uentum est, extrinsecus esse earū longissimae debent, à lacerto breuior res: sed sub ala breuissimae. saepiusq; eae resoluendae sunt, ubi in uicinia cubiti humerus fractus est: ne ibi nerui rigescant. et inutile brachium efficiant. quotiens solutae sunt, fractura manu continenda: cubitus aqua calida fouendus, et molli cerato perficiendus: ferulae q; uel omnino non imponendae contra eminentia cubiti: uel aliquāto breuior res sunt.

De brachij fracti curatione.

T si brachium fractum est, in primis considerandum est alterum os, an utrunq; comminutum sit: non quo alia in eiusmodi casu curatio admouenda: sed primum ut ualens eius extendatur, si utrunq; os fractum est: quia necesse est minus neruos contrahi altero osse integro, eosq; intendente. deinde ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant: si neurum alteri auxilio est nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis, ferulisq; est. deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato: siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit: idq; inuolutum scutella commodissime excipitur: quae latitudine ipsi brachio perangu

his capitibus collo inijciuntur: atq; ita commode brachium ex ceruice suspensum est. idq; paulum supra cubiti alterius regione pendere oportet. quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id uinciēdo alienum est. fit enim brachium immobile. ac si nihil aliud quam dolor in occursum est, idem qui fuit eius usus est.

De crurum femorumq; fractorum curatione.

i N crure æque ad rem pertinet alterum saltem os integrum manere: commune uero ei femoriq; est. quod ubi deligatum est, in canalem conijciendum est. is canalis & inferiori parte foramina habet: per quæ si quis humor excesserit, descendat: & à planta moram, quæ simul & sustineat eam: et delabi non patiatur: & à lateribus cava, perq; loris datis mora quidem, crus, femurq; ut collocatum est, detineat. esse etiam is debet à planta si crus fractum est, circa poplitem. si femur, usq; ad coxam. si iuxta superius caput femoris sic, ut ipsa quoq; ei coxa sit. neq; tamen ignorari oportet si femur fractum est, fieri breuius: quia nunquam in antiquum statum reuertitur: summisq; digitis postea cruris eius insisti. sed multa tamen femori debilitas est: ubi fortunæ negligentia quoq; accessit.

De fracti digiti curatione.

Digittum satis est ad unum sirculum post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; confractos pertinentia.

b Is proprie ad singula membra pertinentibus, rursus illa communia sunt, primis diebus fames: deinde tum cū iā increcere callū oportet, liberalius alimentum. longa à uino abstinentia: fomentum aquæ calidæ. dū inflammatio est, liberale. cum ea desit, modicum. tum etiam longior ulterioribus et liquido cerato membris, et mollis tamen unctio. neq; protinus exercendū id membrum: sed ad antiquos usus reducendum est. grauius aliquanto est, cum ossis fractura carnis quoq; uulnus accessit: maximeq; si id musculi femoris, aut humeri senserunt. nam & inflammationes multo grauiiores, & propiores caneros habent. ac femur qdem si ossa inter se cesserunt, ferè præcidi necesse est. humerus uero quoq; in periculum uenit: sed facilius conseruatur. quibus periculis etiam magis id expositum: quod iuxta ipsos articulos ictum est. curiosius igitur agendum est: et musculus qdem per mediam plagam transuersus præcidendus. sanguis uero, si parū fluxit, mittendus. corpus in media extendendum: ac reliqua qdem

LIBER

membra lentius intendenda: & lenius in his ossa in suam sedem reponenda sunt. his uero neq; intendi nervos, neq; ossa tractari satis expedit. ipsiq; homini permittendum est, ut sic ea collocata habeat: quæ admodum minime lædunt. Omnibus autem his uulneribus imponendum primo linamentum est uino madens: cui rosæ paulum admodum adiectum sit. cætera eadem deliganda fasciis sunt, aliquanto quàm uulnus latioribus, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset. quanto facilius & alienari, & occupari cancro uulnus potest numero potius fasciarum id agendum est: ut laxæ quoq; æque contineant. quod in femore, humerog; sic fiet, si ossa forte recte concurrerint. sin aliter se habebunt, eatenus circumdari fascia debet, ut impositum medicamentum contineat. cætera eadem quæ supra scripsi: facienda sunt: præterquam quod neq; ferulis, neq; canalibus, inter quæ uulnus sanescere non potest. sed pluribus tantummodo, & latioribus fasciis opus est: ingerendumq; subinde in eas est calidum oleum, & unum: magisq; in primo, fame utendo uulnus calida aqua fouendum: frigiq; omni ratione uitandum: & transendum ad medicamenta, quæ puri mouendo sunt: maiorq; uulneri quàm ossi cura agenda. ergo quotidie soluendum, nutriendumq; est. inter quæ si quod paruulum fragmentum ossis eminet, id si reusum est, in suam sedem dandum: si acutū, ante acumen eius longius est præcidendum: si breuius limandum: et utrinq; scalpro limandum. tum ipsum recondendum est. ac si id minus facere non potest, uolsella, quali fabri utuntur, iniicienda est. recte se habenti capiti ab ea parte, qua summa est: ut ea parte qua abra est, eminens os in suam sedem compellat. si id maius est, membranulisq; anguntur, sinere oportet ea sub medicamentis resolui: idq; os, ubi iam nudatum est, abscondere: quod maturius scilicet faciendum est: potestq; ea ratione & os coire: & uulnus sanescere. illud suo tempore: hoc prout se habet. nonnunquam etiam in magno uulnere euenit ut fragmenta quædam uelut emoriantur: neq; cum cæteris coeant. quod hic quoq; ex modo fluentis humoris colligitur. quod magis necessarium est, sæpius ulcus resolvere, atq; nutrire. sequitur uero ut id os per se post aliquot dies excidat: cum tam misera antea conditio uulneris sit. tamen id interdum maius, diutiusq; facies. sæpe enim integra cutis, osse abruptitur: protinusq; prurigo, & dolor oritur. quæ soluere, si accidit, maturius oportet: & fouere aqua per æstatem frigida: per hyemem egelida: deinde ceratum myrteum imponere. interdum fractura quibusdam uelut aculeis carnem uexat: quo à prurigne, & punctiōibus cognito, aperire id melius, eosq; aculeos præcedere necesse habet. Reliqua uero curatio in utroque hoc casu eadem

est: quæ ubi ictus protinus intulit puro iam ulcere. abis hic quoque utendum est carnem producentibus: si brevius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quàm leuissimi generis inter ea demitti debet sic, ut capite paulum supra ulcus emineat: usq; quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. tum paxillus remouendus, vulnus sanandum est: cicatrix inducta fouenda frigida aqua est, in qua myrtus, hederà, aliæ ue similes uerbenæ sint: illinendumq; medicamentum, quod siccet: & magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur. si quando uero ossa non cõferbuerunt, quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt: in aperto deinde curatio est: possunt enim coire. si uetustas occupauit, membrum extendendum est, ut aliquid lædatur. ossa inter se manu diuidenda, ut concurrando exasperentur, ut siquid pingue est, eradatur: totumq; id quasi recens fiat. magna tamen cura habita, ne nervi, musculi ue lædantur. tum uiuo fouendum est, in quo malicorium decoctum sit: imponendumq; id ipsum oui albo mixtum. tertio die resoluendum, fouendūq; aqua, in qua uerbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. quinto die idem faciendum, ferulæq; circumdandæ. cætera & ante, & post eadẽ faciendâ, quæ suprascripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se ossa conferuere: eoq; & brevius membrum, & indecorum fit: & si capita acutiora sunt, assiduæ punctiones sentiuntur. ob quam causam frangi rursus ossa, & dirigi debent. id hoc modo fit. calida aqua multa membrum id fouetur: & ex cerato liquido perfriatur: intenditurq; & inter hæc medicus ptractans ossa, ut adhuc tenero callo manibus ea diducit: compellitq; id quod eminet in suam sedem. & si parum ualuit, ab ea parte in qua os se inclinât, inuolutam lanã regulã obijcit. atq; ita deligando assuescere iterum uetustæ sedi cogit. nonnumquam autem recte quidem ossa cœperunt. superincreuit uero nimius callus: ideoq; locus intumuit. quod ubi incidit, diu, leuiterq; id membrum perfriandum est ex oleo, & sale, & nitro: multumq; aqua calida salsa fouendum: & imponendum malagma quod digerat: astringensq; alligandum: oleribusq; et prætere auomitu utendum. per quæ cum carne callus quoq; extenuatur. confertq; aliqd de sinapi quod cūo fixa in alterum par membrum impositum, donec id paulum erodat, eoq; euocet materiam. ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem uitæ reuertendum est.

De luxatis ossibus. Cap. XI.

¶ C de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. mouetur autem ea sedibus suis duobus modis. nã modo quæ iuncta sunt

LIBER

Inter se dehiscunt: ut cum latum scapularum os ab humero recedit: & in brachio radius à cubito. & in crure tibia à sura: interdum à saltu: calcis os à talo: quod raro tamen fit. modo articuli suis sedibus excidunt. ante de prioribus dicam. quorum ubi aliquid inadit, protinus is locus cavius est: depressusq; digitus sinum inuenit. deinde grauis inflammatio oritur: atq; in talis præcipua. siquidē febres quoq; & cancri, & nervorum uel distentiones uel rigores, qui caput scapulis annectunt: mouere consuevit. quorum uitandorum causa facienda eadem sunt, quæ in ossibus mollibus læsis aliquid ubi inadit protinus his locis proposita sunt: ut dolor, tumorq; per ea tollantur. nam diducta ossa nunquam rursus inter se iunguntur. & ut aliquid decoctis eo loco sit, nihil usus admittitur. maxilla uero & uertebra, oēsque articuli cum ualidis nervis comprehendantur: excidunt aut ui expulsi, aut aliquo casu nervis, uel ruptis uel infirmatis: faciliusq; in pueris & adolescentulis quàm in robustioribus: hiq; elabuntur in priorem, & in exteriorem partem, quidam omnibus modis, quidam certis: suntq; quædam communia omnium signa: quædam propria sunt cuiusq; siquidem semper ea parte tumor est, in qua os prorumpit. ea sinus, à qua recessit. & hæc quidem in omnibus deprehenduntur, alia uero si in singulis. quæ simulatq; de quoq; dicam, proponenda erunt. sed ut excidere omnes articuli non possunt, sic non omnes reponuntur. caput enim nonnunquam compellitur: neq; in spina uertebra, neq; ea maxilla, quæ utraq; parte prolapsa anteq̃ reponeretur, inflammationem mouit. rursus qui nervorum uicio prolapsi sunt, compulsi quoq; in suas sedes iterum excidunt. at quibus in pueritia exciderunt, neq; reposita sunt: minusq; cæteri crescunt. omniumq; quæ loco suo nō sunt: caro ea increscit: magisq; in proximo membro, q̃ in ulteriore. ut puta si humerus loco suo nō est, maior in eo ipso fit, quàm in brachio: maior in hoc quàm in manus acie. tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior, aut minor usus eius mēbri relinquatur: quoq; in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur. quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendū est. si illa occupauit, dum conquiescat. tunc lacessendum est. ubi finita est, tentandum est in his membris quæ id patiuntur. multum autem eo cōfert & corporis, et nervorum habitus. nam si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur. sed & primo facilius excidit: & postea minus fideliter continetur. quæ contraria his sunt, melius continēt. sed id quod expulsū est, difficulter admittunt. oportet autem ipsam inflammationem leuare, super succida lana ex aceto imposita. à cibo si ualentioris articuli casus est, triduo: interdum

etiam quinq; diebus abstinere debet. bibere aquā calidā dū sitim finiat. curiosiusq; hæc facere his ossibus motis, quæ ualidis, plenisq; musculis continentur. si uero etiam febris accessit, multo magis deinde ex die quinto fouere aqua calida: remotaq; lana ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoq; adiecto, donec omnis inflammatio finiat. tunc in frictionem ei membro adhibere: cibis uti bonis: uti uino modice: iamq; ad usus quoq; suos id membrum promouere: quia motus ut in dolore pestifer, sic aliàs saluberrimus corpori est. hæc cōmunia sunt, nunc de singulis dicam.

De maxillæ luxatæ curatione. Cap. XII.

m Axilla in priorem partem propellitur: sed modo altera parte, modo utraq; si alteram in contrariam partem, modo utraq; ipsa mentumq; inclinatur: dentes paribus non respondent: sed sub his qui seant canini sunt. At si utraq; totum mentum in exteriorem partem promouetur: inferioresq; dentes longius quàm superiores excedunt: intentiq; super muscoli apparent: primo quoq; tempore homo in sedili collocandus est sic, ut minister à posteriore parte caput eius contineat uel sic, ut iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem, & caput eius scorteo puluino duro, eoq; caput per ministrum urgeatur, quo sit immobilius. tum medici digiti pollicis lintheolis, uel fascijs ne dilabantur inuoluti in os eius coniungendi: cæteri extrinsecus admouendi sunt. ubi uehementer maxilla apprehensa est, si una parte prociat: concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. tunc simul & caput apprehendendum, & excitato mēto maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est sic, ut omnia penè uno momento fiant. si in utraq; parte prolapsa est, eodem omnia facienda, sed æqualiter retro maxilla agenda est. reposito osse si cum dolore oculorum, & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. cum omnibus uero quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibus conueniat, tum his præcipue, adeo ut sermo quoq; frequenti motu oris per nervos lædat.

De capite luxato. Cap. XIII.

c Aput duobus processibus in duos sinus summæ uertebrae demissis super cervicem contineri in prima parte proposui. hi processus interdū in posteriore partē excidūt: quo fit ut nervus sub occipito extēdatur: mētū pectori agglutinatur, neq; bibere is,

LIBER

neq[ue] loqui possit: interdum sine uoluntate semen emittat, quibus celer-
time mors superuenit. ponendum autem hoc esse credidi, non quo ca-
ratio eius rei ulla sit, sed ut res inditijs cognosceretur: & non puta-
rens sibi medicum defuisse si qui sic aliquem perdidissent.

De spina luxata.

Cap. XIII.

Dem casus manet eos, quorum in spina uertebra exciderit.
id enim non potest fieri, nisi ex medulla quæ per medium,
& duabus membranulis, quæ per duos à lateribus procef-
sus feruntur: & nervis, qui continent ruptis. Excidunt autem & in po-
steriorem partem, & in priorem, & supra septum transversum, et
infra. si in utraq[ue] partem exciderit, à posteriore parte uel tumor,
uel sinus oritur. si super septum id incidit, manus resolvuntur: uoma-
tus, aut distentio neruorum insequitur: spiritus difficulter mouetur:
dolor urget: & aures obtusæ sunt. si sub septo, fœmina resolvuntur:
urina supprimitur: interdum etiam sine uoluntate prorupit. ex eius-
modi casibus ut tardius quam ex capitis, sic tamen intra triduum ho-
mo moritur. nam quod Hippocrates dixit uertebra in anteriorem
partem prolapsa, primum hominem collocandum esse, & extenden-
dum: tum calce aliquem super ipsum debere consistere: id intus im-
pellere: in his accipiendum est, quæ paulum exasserunt: non in his,
quæ toto loco motæ sunt. nonnunquam enim neruorum imbecillitas
efficit, ut quanuis non exciderit uertebra, paulum tamen in priorem
partem promineat: id non iugulat. sed ab interiore parte non contin-
git quidem posse: ab exteriori, si propulsum est, plerunq[ue] iterum re-
dit: nisi quod admodum rarum est: uis neruis restituta est.

De humero luxato.

Cap. XV.

Umerus autem modo in alam excidit. modo in partem prio-
rem. si in alam delapsus est, et uictus cubitus recedit ab
latere, rursum iuxta eiusdem partis aurē cum humero por-
rigi non potest: longiusq[ue] altero id brachium est. si in priorem partē
summum quidem brachium extenditur, minus tamen quam natura-
liter, difficiliusq[ue] in priorem partem q[uam] in posteriorem cubitus porrigi-
tur. Igitur si in alam humerus excidit, & uel puerile adhuc est cor-
pus, uel molle certe, & imbecillibus neruis intentum est, satis est collo-
care id in sedili: & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput
late scapularum ossibus leniter reducat alteri ut brachium exten-
dat, ipsum

dat, ipsum posteriore parte residentem renum sub ala eius coire: si-
mulq; & ille os & altera manus brachium eius ad latus impellere.
At si uastus corpus, nervi ue robustiores sunt, necessaria est spatula li-
gnea: & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, longitudine ab
ala ad digitos peruenit. in qua summa capitulum est rotundum &
leniter cavius, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri pos-
sit. in ea bina foramina tribus locis sunt inter se spacio distantibus,
inq; ea lora mollia coniunguntur. eaq; spatha fascia inuoluta quo mi-
nus tactu lædat ad alam à brachio dirigitur sic, ut caput eius sum-
mæ alæ subijciatur. deinde loris suis ad brachium deligatur: uno lo-
co paulum infra humeri caput, altero paulum supra cubitum, tertio
supra manum. cui rei protinus inter ualla tunc quoq; foraminum
aptata sunt. sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum
trahitur, ita alte ut consistere homo ipse non possit. simulq; in alteram
partem corpus demittitur: in alteram brachium intenditur. eoq; fit
ut capite ligni caput humeri impulsus in suam sedem modo cum so-
no, modo sine hoc compellatur. multas alias esse rationes scire facile
est uno Hippocrate lecto, sed non alia magis usu comprobata est. at
si in priorem partem humerus exadit, supinus homo collocandus est:
fasciaq; aut habena media ala circumdanda est: capitulaq; eius post ca-
put hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumq; ut
ille habenam, hic brachium extendat. deinde medicus caput quidem
hominis sinistra debet repellere: dextra uero cubitum cum humero
attollere: & os in suam sedem compellere. faciliusq; id in hoc casu,
quàm in priore reuertitur. reposito humero lana alæ subijcienda est.
si interiore parte os fuit, ut ei opponatur. si in priore parte, ut tamen
commodius deligatur: tum fascia primū sub ala obuoluta, caput eius
debet comprehendere: deinde profectus ad alteram alam: ab eaq;
ad scapulas: rursusq; ad eiusdem humeri caput tendere. sæpiusq; ad
eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. uinctus hac ratio-
ne humerus commodius continetur: si adductus ad latus sit, ad id
quoq; fascia deligatur.

De cubiti luxati curatione. Cap. XVI.

IN cubito autem tria coire: ossa humeri, & radius, & cubiti
ipsius ex his, quæ prima parte huius uoluminis posita sunt,
intelligi potuit. sed cubitus qui innexus humero est, ab hoc
exadit. radius qui adiunctus est, interdum trahitur: interdum subsi-
stet. in omnes uero quatuor partes excadere cubitus potest. sed si in

Aurelij Cor:

LIBER

priorem prolapsus est, extensum brachium est: neq; recurvatur. si in posteriorem, brachium curvum est, neq; extenditur: breuiusq; altero est. interdum febrem, vomitumq; bilis mouet. si in exteriorem, interioremue brachium porrectum est, sed paulum in eam partem à qua os recessit recurvatum, quicquid incidit, reponendi ratio una est. neq; in cubito tantum est: sed in omnibus quoq; membris longis, quæ per articulum longa testa iunguntur. utrunq; membrum in diuersas partes extendere donec spacium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendendi tamē alia atq; alia genera sunt, prout nervi ualēt: aut ossa huc, illucue sederunt. ac modo manibus solis utendum est: modo quædam alia adhibenda. ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus: interdum etiā habenis iniectis satis est. deinde rotundum aliquid à lacerti parte ponendum est. & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. at in alijs casibus cōmodissimum est eadem ratione brachium extendere: quæ fracto cubito supraposita est, & tum ossa reponere. reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. celerius tantum & sæpius id resoluendum est: multoq; magis aqua calida fouendum: diutius ex oleo, & nitro ac sale perfricandum. in cubito enim celerius quàm in ullo alio articulo, siue extra remansit, siue intus reuertit, callus circumdatur: usq; si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

De manu luxata. Cap. XVII.

Manus quoq; in omnis quatuor partes prolabitur: si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti nō possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium: id est aut ad pollicem, aut ad minimum digitum conuertitur. reponi non difficillime potest super durum locum & renitentem ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet sic, ut prona sit. si in posteriorem partem os excidit, supina: si in priorē, si in interiorem, exterioremue, in latus. ubi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. at his, quæ in priorem, posterioremue partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid: idq; supra prominens os manu urgendum est: per quod uis adiecta facilius in suam sedem compellit.

De palma. Cap. XVIII.

In palma quoq; ossa interdum suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. in latus enim

inoueri paribus offibus oppositis non possunt: signum id solum est, quod omnium commune est. tumor ab ea parte, in quam os uenit: si-
nus ab ea à qua recessit. sed sine intento digito, tantummodo bene pres-
sum os in suam sedem reuertitur.

De digitis. Cap. XIX.

T in digitis totidem ferè casus, eademq; signa sunt: quæ in
manibus. sed in his extendendis non æque ui opus est, cum
articuli breuiiores, & nerui minus ualidi sint. super mē-
sam tantummodo intendi debent, qui uel in priorem uel in postero-
rem partem exciderunt. tum iam palma compelli: atq; id quod in la-
tus elapsum est, digitis restitui.

De femore. Cap. XX.

Vm de his dixerim: de his quoq; quæ in cruribus sunt, ui-
deri possum dixisse. siquidem etiam in hoc casu quædam
similitudo est femori, & humero, & tibiæ, & cubito, pedi
et manui: quædam tamen separatim quoq; de his dicenda sunt. femur
in omnes quatuor partes promouetur, sæpius in interiorem, deinde
in exteriorem, raro admodum in priorem, aut posteriorem. si in in-
teriorem partem prolapsum est crus, longius altero, et uastius est. ex-
tra enim pes ultimus spectat. si in exteriorem, breuius, rariusq; fit,
et intus inclinatur. Calx ingressu terræ non contingit, sed plâta ma-
meliusq; id crus superius corpus quàm in priore casu fert, minusq;
baculo eget. si in priore crus extensum est, implicariq; non potest, al-
teri cruri ad calcem par est sed ima planta minus in priorem par-
tem inclinatur: dolorq; in hoc casu præcipuus est: & maxime uri-
na supprimitur. ubi cum dolore inflammatio quieuit, commode in-
grediuntur: totusq; eorum pes est. sed & si in posteriorem extendi
non potest crus, breuiusq; est, ubi consistit: calx quoque terram non
contingit. Magnum autem femori periculum est, ne uel difficulter re-
ponatur: uel repositum rursus excidat. quidam iterum semper exci-
dere contendunt. sed Hippocrates, & Diocles, & Philotimus, & Ni-
leus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum authores, ex toto se
restituisse memoriæ prodiderunt. neque tot genera machinamun-
torum quoque ad extendendum in hoc casu femur Hippocrates, An-
dreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoque
quidam repperissent, si id frustra esset. sed ut hæc falsa opinio est:
sic illud uerum est. cum ibi ualentissimi nerui, musculiq; sint,
si suum robur habent, nix admittere: si non habent, postea

non contineri. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi. si validius, melius adducunt, qui easdem habenas ad valida bacula deligunt: tumq; eorum fustium in eas partes oppositæ mire obiecerint: superioresq; ad se utraq; manus traxerint: etiamnum valentius intenditur membrum super scannū, cui ab utraq; parte axes sunt: ad quos habenæ illæ deligantur. qui ut in torcularibus conuersi, rūpere quoq; si quis perseverauerit: non solum extendere nervos, & musculos possunt. collocandus autem homo super id scannum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus sic, ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsus est: ea etiam inferior, à qua recessit. nervus extans si in priorem os venit, rotundum aliquid super inguen ponendum: subitoq; super id genu adducendum est eodem modo, eademq; de causa, qua idē in brachio fit: protinusq; si complicari femur potest, intus est. In cæteris uero casibus, ubi ossa per uim paulum inter se recesserunt, medicus debet id quod eminet retro cogere: minister contra inde coxā propellere. posito osse nihil aliud noui curatio requirit, quàm ut diutius his in lecto detineatur: ne si motum adhuc nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

De genu. Cap. XXI.

Enu uero & in exteriorem, & in interiorem, & in posteriorem partem excidere notissimum est: in priorem non prolabi pleriq; scripserunt. potestq; id uero proximum esse, cū inde opposita patella, ipsa quoq; caput tibiæ contineat. Meges tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memoriæ prodidit. in his casibus intendi nervi rationibus hisdem, quas in femore retuli possunt. & id quidem quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoq; eo crure, reconditur. cætera uero manibus simul tum ossa in diuersas partes compelluntur.

De talo. Cap. XXII.

Alus in omnes partes prolabitur. ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem conuertitur. ubi huic contrarius talus contrarium etiam signum extat. si in priorem partem erumpit à posteriore, latus nervus durus, & insanus est: minusq; is opus est. si in posteriorem lanx penè conditur, plaga maior fit. Reponitur autem his quoq; per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. & in hoc quoq; casu diutius in lectulo perseverandum


perseuerandum est: ne his talus qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis ferendo oneri cedat: rursusq; prorumpat. calciamen-
tis quoq; humilioribus primo tempore utendum, ne iunctura talum
ipsum lædat.


De planta. Cap. XXIII.

Plantæ ossa hisdē modis quibus in manu prodeunt, his, his-
demq; conduntur. fasciā tantūmodo calcem quoq; debet com-
prehendere: ne cum mediam plantam, immūq; eius uinciri
necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat:
ideoq; suppuret.

De digitis. Cap. XXIII.

In digitis nihil ultra fieri debet: q̄ quod in his, qui sunt in
manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius,
aut summus canaliculo aliquo contineri. hæc faciendā sunt
in his casibus ubi sine uulnere ossa exciderunt. hic quoq; & ingens
periculum est: & cogruius quo maius membrum est: quo ne ualidio-
ribus nervis, aut musculis continetur. ideoq; humeris, femoribusq; ma-
tus mortis est: ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis ta-
men, nonnullum periculum est. eoq; maior in utroq; timor est, quo
propius uulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse: præ-
ter digitos, & plantas, et manus dixit. atq; in his quoq; diligenter es-
se agendum, ne præcipitarent. Quidā brachia quoq; & crura repo-
suerunt: & ne cancri, distentionesq; neruorum orirentur, sub quibus
in eiusmodi casu fieret mors matura: sanguinem ex brachio mise-
runt. uerum ne digitus quidem, in quo minimum ut malum, sic etiā
periculum est, reponi debet ante inflammationem: aut postea cum iā
uetus res est. si quoq; reposito osse nerui distenduntur, rursus id protū-
nus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum uulnere loco
motum, neq; repositum est: sic iacere conuenit, ut maxime cubantem
innuat, tantum ne moueatur: ne ue depēdeat. in omniq; tali morbo ma-
gnū ex longa fame præsidium est. deinde ex curatione eadem quæ
proposita est ubi ossibus fractis uulnus accessit: si nudum os eminet,
impedimento semper futurum est. id quod excedit, abscidendum est:
imponendaq; super arida linamenta sunt, & medicamenta non pin-
guia, donec quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest, ueniat. nam &
debilitas sequitur: & tenuis cicatrix inducitur: quæ necesse est, facile
noxe postea pateat.





P

Hæbe salutiferum quod pangimus affere carmen:
Inuentumq; tuum prompto conuolare fauore.
Tuq; potens artis, reduces qui tradere uitæ
Nostri atq; in cælum manes reuocare sepultos.
Qui colis ægæu, qui pergamæ, quiq; epidaurum:
Qui quondam placida tectus sub pelle draconis

Tarpeias arces, atq; incluta templa petisti
Depellens tetros præsentî numine morbos
Huc ades: & quicquid cupido mihi sæpe rogatus
Firmasti, cunctum teneris expone papyris.
Membrorum series certo deducta tenore
Ut stet, & assimilis medicinae defluat ordo:
Principio celsa de corporis arce loquamur.
Capiti medendo.

BALSAMA si geminis instillans auribus addas,
Tum poteris alacrem capitis reparare vigorem.
Vel quæ septenis censentur gramina nodis
Utiliter necesse: uel corno ex arbore fertum,
Pulegium'ne potens una super aure locabis.
Aut illud mixto coctum clementer aceto
Cautè nare trahes: seu uisco lintea nexo
Induces fronti: seu trita gramina mentæ.
Spongia cum tepidis annexa liquoribus imbris
Profuit: aut hedera ex oleo decocta uetusto.
Profuit: aut cochleis frontem tractare minutis.
Si nocuit cerebro uiolentia solis aperto
Sæpe chelidonia ex acido perducta liquore
Sanauit: profunt & amica papauera somno.
Si prius in lento madefacta terantur oliuo.

Hemicraneo medendo.

PORRIO si capitis morbo tentetur acuto
Allia diuersam lana contexta per aurem
Inducta profunt: & eodem balsama pacto.
Allia uel ternis piperis terna addita granis
Trita lines: certam dabit hæc tibi cura salutem.

Porrigini depellendæ.

EST insensibilis morbus, sed noxius formæ
Cum caput immensa pexum porrigine ningit,
Q. Serenus.

Q. SERENI

Copia farris uti frendentibus edita saxis:
Hanc poterit malve radix decocta levare.
Aut tu fœniculum, nitrumq; & sulphura vivas
Contere. deinde caput permixtis ablue cunctis:
Furfuribusve novis durum miscebis acetum,
Ut varios crines tali des unguine puros.
Prodest & tarda demptus testudine sanguis:
Et prodest ædro demissus ab arbore succus.
Desinet interea glomerari farrea nubes:
Cessabitq; grauis crebra porriginis imber.

Capillo tingendo.

QVOS pudet ætatis longæ, quos sancta senectus
Offendit: cupiunt properos abscondere canos:
Et nigrum crinem suco simulare dolofo.
His prodest acri contrita cupressus aceto,
Vel frons lenis sci, uel tristia poma sabuci:
Lumbrici quoq; terrestres miscentur oliuo:
Et iuvenem præstant rediuvio flore capillum.
Præterea niveum poterit depellere crinem
Rhesina ex facili cera, viscoq; coacta:
Ad rutilam speciem nigros flavescere crines
Vngento aneris prædixit Tullius auctor.
Si prægnans artus captivi sorias edit,
Dicuntur foetus nigrantia lumina fingi.

Phthiriasi arcendæ.

NOXIA corporibus quedam de corpore nostro
Progeniunt natura uolens abrumpere somnos
Sensibus: & monitis uigiles intendere curas.
Sed quis non paueat pherecidis fata tragædi,
Qui nimio sudore fluens animalia tetra
Eduxit: turpi miserum quæ morte tulerunt.
Sylla quoq; infelix tali languore peresus
Corruit: & foedo se uidit ab agmine uinci.
Sæpius ergo decet mordax haurire sinapi:
Vel nitro, ac sale permixtis, acidoq; liquore
Laxatis, ut sint simul allia tangere corpus:
Aut lachrymis hederæ, aut succo perducere ædri.
Quin etiam furfur mixto medicatur aceto.
Vnda maris lendes capiti deducat iniquas:
Et quicquid crebri defendit silua capilli.

Prurigni,

Prurigni, papulis, & scabiei arcendis.

ILLOTVS sudor, uel copia nobilis esca
Sæpe graui scabie correptos asperat artus.
Ergo lutum prodest membris adhibere frictis:
Quod facit ex asino siccatus corporis humor.
Nec pudeat tractare finum quem bucula fudit.
Stercoris ex porco cinerem confundito lymphis:
Sic pauidum corpus dextra parcente foueto.
Proderit ex oleo pulvis, quem congerit alte
Dulcibus ex latebris patiens formica laborum.
Conuenit hinc tepido lita tradere corpora soli.
Feruantes papulas oleo curato liquenti:
Aut acido baccho miscbis farra lupini:
Atq; hinc in calido percurres membra lauacro.
Pruritus autem salso leuat humor aceti:
Sine mari lauidus sudor, cochleæq; minutæ:
Quarum contactu perimetur acerbæ libido.

Frenesi, ac capiti purgando.

EX uitio cerebri frenesis furiosa mouetur,
Amisissq; refert frendens amentia uires:
Sine calens febris iactatos exedit artus:
Sine ueri gustus, seu frigoris efficit aura.
Conuenit hic calidis pecudum pulmonibus apte
Tempora languentis medicæ redimere corona.
Illotis etiam lanis suffire memento:
Ceritum sæpe horrendi medicantur odores:
Atq; ideo insanos etiam curarier est par.
Purgatur cerebrum mansa radice pyretri.
Vngitur & succis, dederit quos parua sabucus,
Expressusq; hederae mandatur naribus humor.
Aut mixtum rutæ crebro instillatur acetum.
Non semper præsens dolor est sanabilis: ergo
Cura magis prodest uenturis obuia morbis.

Fluori capillorum, & maculis capitis tollendis.

DEFLUIT expulsus morbo latitante capillus
Si raro lauitur: seu uis epota ueneni est:
Seu salamandra potens, nullisq; obnoxia flammis
Eximium capitis tactu deiecit honorem.
Nonnunq; uariant maculae: paruisq; parumper
Orbis aspersum ducit noua uulnera tempus.

201 Q. SERENI
Viperæ pellis cineres his addito rebus,
Roboreasue pilas, ursino'ne ungitoseuo:
Vel testudineo mage permulcto cruore.
Frigori sedando.

SAEPE ita peruadit uis frigoris, ac tenet artus,
Vt uix quesito medicamine pulsa recedat.
Si ranam ex oleo decoxeris, abijce carnem:
Vnguine membra foue: parili ratione ualebit.
Vrticæ semen: percepta q; frigora uincet:
Et ceruina potest mulcere medulla rigorem.
Decoctum raphani semen cum melle uorabis:
Siue fel ursinum tepesfacta dilue lympa
Proderit hoc potu: seu cassis ostrea testis
Vsta dabit cinerem: qui pro sale sumptus in escis,
Decutiet gelidum tepesfacto uertice uirus.
Nonnullus liquidum summit, mulsuq; sinapiq;
Atq; palato agitat pariter, retinensq; mouensq;
Allia nonnulli mandunt: olei'ne liquore
Perfundunt calido cerebrum, nasiq; latebras.
Quidam lactuca credunt prodesse sapes.
Curandi modus hic & suauis, & utilis idem est.

Elephantiasis propellenda.
EST Elephas morbus tristi quoq; nomine dirus,
Non solum turpans infandis ora papillis,
Sed cita præcipitans funesto fata ueneno.
Huic erit aduersus ædri de cortice suus,
Mustellæq; cinis: uel fusus sanguis ab illa.
Nonnulli dixere serum, prodesse bibendo.
Mentastri folium potu, apposituq; salubre est.
Nec frustra bulbos, & sulphura iungis aceto,
Qui cupis horribiles ad pristina reddere uultus.
Prætere a nitrum debes cum melle iugatum
Spargere lacte bonis: uarias sic ungere frontes.
Cerusam, & chartam, quam gens ægyptia mittit
Thure simul misce atq; oleo, quod flore rosarum
Conditum est: line sic faciem, sic redde salutem.

Cutis, & faciei uitijs propellendis.
INUIDA si maculet faciem lentigo decoram,
Nec prodesse ualent naturæ dona benignæ,
Erucam, atq; acidum laticem simul illine malis.

Proderit

Proderit & bulbus mellis dulcedine uictus,
Crudæ uel dulcicido miscetur cepa liquori:
Sanguine uel leporis morbus delebitur oris.
Frons salicis cum flore suo contrita medetur.
Sæpiolæ cineres ex ossibus omnia tollunt.
Cygneos adipēs hilari misceto lyæo:
Omne malum propere maculoso ex ore fugabis.
Horrebit si linor atrox, aut nigra cicatrix,
Attrito sapone genas purgare memento.
Rugarum sulcos lentiscæ mastice tendes.
Si uero uitium est, quod ducat ab impete nomen
Hoc matutina poteris cohibere salina:
Seu folio platani, quod mansum mane domabis.
Fæda fluunt curni quæ purgamenta cameli
Vrentur, cineremq; dabunt: iungentur aceto
Mascula thura simul: diuinaq; cura ualebit.

Aurium uitijis succurrendis.

CVM sæuus teneras dolor alte sauciat aures,
Fraxinea in flammis fundit, quem tale a suum
Infilles: siue obscænos ex uirgine rores:
Aut suum ex folio dederit, quem populus alba.
Sæpe chelidoniæ rabidum sociatur acetum,
Adiunctoq; nitro procedit cura salubris.
Mentastri liquor expressus conducere fertur.
Infectum uiolis oleum bene consulit auri.
Annosa rubros si legeris arbore uermes
Ex oleo tere: sic tepidos infunde dolenti.
Si uero obstrusa sensus morietur in aure,
Lumbricos terræ, sæuumq; ex anseris rauco
Excoque: sic ueterem poteris depellere morbum.
Felq; bonis surdis etiam prodesse loquuntur:
Si iungas olidæ graue quod mînxere capellæ.
Si uero in auitas animal penetrauerit aures
Proderit admixto pauidi fel muris aceto.
At si lymphæ nocens peruaferit: anseris aptus
Immittetur adeps ceparum non sine succo.
Qui grauis est oculis sensum tamen auribus auget.
Vis & phœbigenæ diuinam discere curam:
Sitq; uel annosis confecta doloribus auris:
Allia tum septem numero, septemq; lupinos

Q. Serenus.

iiij

111 Q^{ue} SERENI .AMICIDEM
Creticam dabis in testam: tum delphica frondis
Addatur: mixto totum feruescat aceto:
Doctus eris tepidos illinc immittere rores.

Oculorum dolori mitigando.

SVMMA boni est, alacres homini contingere uisus.
Quos quasi custodes, defensoresq; pericli
Prospiciens summa natura locauit in arce:
Sic tamen ut nullos paterentur desuper ictus:
Atq; supercilio pauidi tegerentur opaco.
Sed dolor immeritum lumen si forte laessit,
Lana madens oleo noctu connectitur apte,
Viuentis'ue nepæ lumen gestatur amicum:
Ex folio caulis cineres, confracta; thura,
Et laticem bacchi factæ cum lacte capellæ
Desuper induces: atq; una nocte probabis.
Hyblæi mellis suci cum felle asprino
Subueniunt oculis dira caligine pressis.
Vettonicæ mansus si cæbit lumina sucus.
Si tenebras oculis obducit pigra senectus
Expressæ marathroguttæ cum melle liquenti
Detergere malum poterunt: uel uulturis atri
Fella, chelidoniæ fuerint quis gramina mixta:
Hæc etiam annosis poterunt succurrere morbis.
Fel quoq; de gallo molitum simplice lympa
Exacuet pueros dempta calligine uisus.
Siue columbarum finus admiscetur aceto:
Seu fel perdicis parili cum pondere mellis:
Vina chelidoniæ simili ratione iugantur,
Efficiuntq; suo præclaros unguine uisus.
Aspera quinetiam mulcent, et rupta reducunt.
Si genus est morbi miserum quod lumen adurit,
Hic calor infuso mitescit lacte canino:
Anguib; ereptos adipēs ærugine misce:
Hi poterunt ruptas oculorum ungere partes.
Si uero horrendum ducent glaucomata peplum:
Spiritus alterius prodest: qui grana cumini
Pallentis madens uisus exalat in ipsos.
Si tumor infestat, rufos et gliscit in orbes,
Turgentēs oculos uili circumline cœno.

Dentium

Dentium vitio, & oris fautori medendo.

HAUD facile est acrem dentis tolerare dolorem:
 Quo magis est æquum medicam pernoscere curam:
 Cum baccho uioles decoxeris, ore teneto.
 Mansus item prodest succis oleaster acerbis.
 Hinc obscedo fugit: linguae quoque; vulnera cedunt.
 Cum uino piper, & nitrum tepido inde dolenti.
 Sæpe chelidoniae succo, uel lacte capellæ
 Sanescunt dentes: aut tauri felle iuuantur.
 Aut acidi latices clauso uoluntur in ore
 Manditur apta rubus gingiuis, & bona labris
 Lentiscus, myrtusque; emendant oris odorem.
 Quod uero assumpsit nomen de dente fricando
 Ceruino ex cornu cinis est: aut ungula porcæ
 Torrida: uel cinis ex ouis, sed non sine uitro:
 Muricis aut tostis: uel bulbi extincta fauilla:
 Ambitiosa putas: sunt ista salubria cunctis.
 Exesos autem dentes si forte quereris,
 Vre firmum muris, patulisque; & hiantibus adde.
 Vel anerem dentis ceruini extinguere aceto
 Conuenit: atque cinis immittere partibus apte.
 Prodest & pulvis lumbrici corpore tosto.
 Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.
 Sæpe etiam gelida gingivas collue lymphæ:
 Dentibus ut firmum possis seruare uigorem.
 Si uero infandum proserpit ad intima uulnus,
 Permisato salem parili cum pondere thuris:
 Hinc tractato locum: miram experiere medellam.
 Aut tu sume pilam, quæ caudis hæret ouinis:
 Hæc siccata dabit molles, & fracta farinas.
 Huius & attritu tetrum mulcebitur ulcus.

Vna faucibus, & quæ mollienda sunt medendis.

EGRESCVNT teneræ fauces, cum frigoris atri
 Vis subijt: uel cum uentis agitatilis ær
 Vertitur: atque ipsas flatus grauis inscit undas:
 Vel rabidus clamor fracto cum forte sonore
 Planum radit iter: sic est Hortensius olim
 Absumptus: causis etenim confectus agendis
 Obtinuit: cum uox domino uiuente periret:
 Et nondum extincti moreretur lingua disertæ.

Ergo omni studio quæres inhibere dolorem:
 Simplicibus lymphis confunditur aerium mel:
 Additur excussus nivea simula gine fursur:
 Decocta hæc clauso simul exercentur in ore.
 Præterea fauces extrinsecus ungere prodest
 Vrsino & tauri seuo, cærisq; remissis:
 Omnia quæ geminis æquabis lancibus ante.
 Discæ etiam miram ex humili medicamine curam:
 Astiaco melli iungas agreste papauer,
 Decoctumq; simul mandes, mansumq; uorabis.
 Crinitæ porri radices quinq; coquantur:
 Hinc aqua non feruens uoluitur fauce sonora:
 Nec tamen in stomachum descendat gutta patentem.
 Si uero afflictam langor deiecerit unam,
 Tunc horas aliquot pronus recubare memento:
 Aut illam pulvis tosti releuabit aneti,
 Aut cinis ex cochlea: uel torrida brassica flammis.
 Verum angina sibi mistum sale poscit acetum.
 Quod prodest clauso uersatum agitare palato.

De rigore ceruicis.

AT SI ceruices, duratq; colla rigebunt,
 Mira loquar: geminus mulcebitur unguine poples:
 Hinc longos pariter nervos nudiana sequetur:
 Anseris aut pingui torpentia colla fouebis:
 Illitur & ualido multum lens cocta in aceto
 Aut capræ finus & bubuli, aut ceruina medula
 Hoc etiam immotos flectes medicamine nervos.
 Quos autem uocant colles attingere dextra
 Debebis, qua Gallus erit pressante peremptus.

Tussi, & coleribus medendis.

NOXIA si penitus colerum scire uenena
 Perspicias, cocta lactucæ fronde leuabis.
 Proderit & caules assumere sæpe madentes.
 Interdum fauces tussi quatiuntur atroci:
 Allia tum sumes & cocta, & melle peruncta:
 Semina uel raphani permixto dulcia melle:
 Aut si fraxinea semen de fronde renellis:
 Interiora uora, uetitus contingere dente.
 Onum melle teres, domitum feruentibus undis,
 Marrubium uel potens: hæc faucibus optima sumes,

Frenabisq;

Frenabisq; grauem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho.

QVI stomachum regem totius corporis esse

Contendunt, uera niti ratione uidentur.

Huius enim ualidus firmat tenor omnia membra:

At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.

Quin etiam nisi cura iuuat, uitare cerebrum

Fertur, & integros illinc auertere sensus.

Lactucæ semen nigræ, quod lignea pila

Triuerit: admixto ieiunus sumito melle.

Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit uno:

Aut tritum semen raphani, mulsūq; iuuabit:

Sine duæ partes absinthii, ac tertia rutæ

Decoctis potantur aquis, siliquæq; madentes:

Semina uel marathri foetæ cum lacte capellæ:

Pulegium quoq; decoctum curabit amice:

Et potu, & fots stomacho conduit anetum:

Seu cochleas undis calefactas, ac propè iunctas

Suppositis torrens prunis: uinoq; garoq;

Perfusas cape: sed prodest magis esse marinas.

At male digestis si crapula seniet escis,

Ex pipere, & calida florem de rore marino

Ebibe: seu salibus piper adde, & tenue cuminum:

Quæ coctis tanges epulis, ac rapta uorabis:

Aut cubitum pergens suam cape tristis aneti.

Ventriculum Mergi sale iacto contere nalde

Tosto pane super piperis quæ puluere multo

Miscentur: capies diuinum munus in istis.

Grana peregrini piperis diffindito quinq;

Niliaco melli: quæ mane inserta capeffes.

Proderit hoc stomacho, uictas & conquoquet escas:

Felli uomitu, uel phthisi arcendis.

LVTEA si crescant, præcunctis noxia fella:

Allia parua nouem, piperis tot permole grana:

Quæ cyatho diluta gari mandesq; bibesq;:

Hæc iterum septena capis post deniq; quina.

Præterea caulem, frondet si parua sabucus,

Decocto sale permiscet: ac iungis oliuo:

Tunc capis, ac tali auxilio fella horrida purgas.

Profunt & pelagi latices, quos pondere iusto

Dulcibus associas lymphis, nulliq; liquenti:
 Et niueus prodest ex ubere succus asellæ:
 Si tepido uino infundas, ac mella, piperq;
 At uomitum radix narossi pota mouebit.
 Si uero phthisis annoso sedet improba morbo,
 Inuitas uino cochleas hausisse iuuabit.
 Proderit & ueteris seni pila sumpta suilli:
 Quæ capulas quoq; producit medicina salubris.
 Mammis sanandis, uel stringendis.

VBERA fecundo multum lactantia succo
 Sæpe sibi noxæ nimium manando fuerunt.
 Fecit igitur ualida duri reprimuntur aceti.
 Post partum tumidas iniuste assurgere mammas
 Interdum aspicias: harum mala commemoratur
 Murinus finus ex pluuio sedare liquore.
 Sin autem clausas penitus dolor angit acerbis,
 Lumbricis terræ turgentes unge corymbos.
 Si castigatas studium est præstare papillas,
 Ex hederæ fertis ambas redimere memento:
 Protinus, & raptas flammis mandare coronas:
 Anseris aut seuum pariter cum lacte tepente:
 Aut ouum illinito tulerit quod garrula perdix.
 Præterea pluuio decocta papauera rore
 Hærescant multis post absoluenda diebus.
 Vis & phæbigenæ cœlestia sumere dona,
 Vbera cum tetris laniata doloribus horrent:
 Nanis ramentum, & quæ nomine præssion herba est:
 Et quæ uulgari sermone insana uocatur:
 Græcus ὀκνύμων propria scit dicere lingua:
 Necnon & calami radix, lapathi; legumen
 Mixta dabunt miras experto crede medelas.

Reiectioni cibi, aut sanguinis abstinendæ.

SI stomachus nondum conactas expuit escas,
 Sed magis atq; magis uitium reuomendo ualescit:
 Allia cedemus, crebrumq; trahemus odorem.
 Sin etiam rutilus fertur de pectore sanguis,
 Sorbitum mentæ, rhabbanus uel æcta iuuabit.
 Sæpe lapis teritur: specularum nomine dicunt:
 Et mixtis hauritur aquis: sistitq; cruorem.
 Vritur interdum raptus de subere cortex:

Et cinis ex calido prodest epota lyæo.
 Quorum cinis, aut coclearum, aut deniq; pellis.
 Aut cinis è salicum ramis prodesse putatur:
 Aut platani pilulas acri infundemus aceto:
 Nullus erit sanguis, quem non abus iste moretur.

Iecoris, & lateris uitij medendis.

SI mollis iecoris fibras dolor hauriet acer,
 Protinus ex mulsâ potanda eleliphacos herba est:
 Sumitur & semen: quod fraxinus alta profudit:
 Vulturis atq; iecur: uel ius perdis apricæ.
 Præterea simili dragma pix dura, piperq;
 Franzuntur: sic in mollito puluere iuncta
 Egclidis miscentur aquis: recreantq; bibentem.
 Abscynthi quoq; decocti potabitur humor.
 Si latus immeritum morbo tentatur acuto,
 Accensum extingues lapidem stridentibus undis:
 Hinc bibis: aut aceris radicem tundis, & unâ
 Cum uino capis: hoc præsens medicamen habetur.
 Quid referam multis composita philonia rebus:
 Quid loquar antidotum? uanus quis ista requirat?
 At nos pauperibus præcepta feramus amica.
 Necnon & iecoris quaeretur fibra lupini:
 Iungenturq; simul costum, poliumq; piperq;
 Quæ diluta mero dantur potanda lyæo.
 Est & uis morbi, quod telum commemoratur:
 Cum subito dolor insanus furit incitus ictu:
 Persicus huic potum è nucleo dabit interiore:
 Quæ mihi cura satis casu monstrante probata est.
 spleni curando.

QUANDO lyen tumido circumligat ilia uinclo,
 Et plenum splenis demonstrant membra rigorem,
 Mollibus ex hederâ tornantur pocula lignis:
 Hinc trahet assuetos æger quoscunq; liquores:
 Aut uiridis costorum olerum potabitur unda.
 Proderit exucto stumialis hirudo cruore:
 Sine miricâ potens seu ros cum pane marinus:
 Aut hederæ succus potu, apposituq; inuabit.
 Necnon intactam ferro, quam uideris alnum,
 Huic liber eripitur, ferro sine decoquiturq;
 Donec uictarum pars tertia subsit aquarum.

Q. SERENI

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.
 Nonnulli memorant consumi posse lienem,
 Ervum si semper ieiuno sumpserit ore.
 Arida ficus item feruente domatur aceto.
 Et trita illinitur: uel splen apponitur hædi.
 Marrubium in uino potum prodesse loquuntur.
 Præterea piper, ac nepete cum flore, & anetum,
 Capparis, atq; Apium, buglossaq; iungitur una:
 Horum decoctos latices potare salubre est.
 Puleium, abrotanum nitida cum mastice coctum,
 Ac thymbræ speciem, quam commemorant cephaloten:
 Prædixit spleni deus idem posse mederi.
 Dulcia Plautus ait grandiminus apta lien:
 Splen tumidus nocet: & risum tamen addit ineptum:
 Ut mihi sardois uideatur proximus herbis:
 Irrita quæ miseris permiscant gaudia satis.
 Diatur exectus faciles auferre cachinos,
 Perpetuoq; æuo frontem præstare seueram.

Præcordijs sanandis.

LANGVIDA si duro turgent præcordia morbo,
 Misceatur mulsæ farris sextarius unus:
 Necnon & lini tunsum, siliquæq; legumen:
 Hæc decocta simul, nondumq; tepentia nectis:
 Aut quæ poma cydon creteis misit ab oris
 Cocta lines: durum ut possis mollire tumorem.
 Ocula præterea, bulbiue linuntur amari.
 Proderit & lymphis corpus mersare marinis.
 Quin etiam catulum lactantem apponere membris
 Conuenit: atq; malum transcurrere fertur in illum:
 Cui tamen extincto manus debetur humandi.
 Ne iunctus uitium ducit de coniuge coniunx.
 Quod superest styra di iunges ramenta carinæ.
 Quodq; decem ex rebus decattartyma rite uocatur.
 Mastice addentur cum puluere mollia farræ:
 Talibus auxilijs præcordia tutæ resident.

Lumbis, & renibus sanandis.

CVM seuit penitus hærens iniuria lumbis,
 Igne lapis candens datur exultantibus undis:
 Hoc poteris potu tristem superare dolorem.
 Aut pice cum molli nitrum, sulphurq; & acetum

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.
Proderit hanc ægris crebro perducere membris.
Aut caput asparagi cum uino sume uetusto:
Sed manus appone: modus conducit uterque.
Aut adipi mixtum lumbis inducto sulphur.
Sæpe chelidonium cum suco palladis addes,
Farrâq; quæ tremulis profunde sudantia flammis:
Fertur amygdalinæ succus nucis esse bibendus:
Pinisitur, & tepidis sorbebitur addita lymphis.
Aut tres ex uino cochleas feruescere coes:
Cumq; suis domibus franges, piperis quoq; grana
Ter quinq; adicies: potiq; inuaberis illo.
Furfur item parat fuerit cum feruidus unda,
Post oleo madidus succis immittitur aptis:
Quæ uix passuris urentia iungto membris.
Prodest ceruinæ medicatis natura medullæ.
Nec nocuit cicris cocti potasse liquorem:
Aut mistam teneris mandisse lilis facta maluis:
Conteritumq; simul cum mastice confer anetum.
Quodq; decem rebus componi ex nomine clarum est:
His continge locum. deus hæc mihi certa probauit.

Ventris dolori mitigando.

SI DOLOR insanus tota desceit in aluo,
Heministibus in lymphæ ualidam quoque rutam,
Aut apium: donec pars duplex desit aquarum.
Potus erit medicus non detrectante palato.
Præterea niuei sterilis testa uritur oui,
Quæ postquam in tetram fuerit conuersa farinam,
Ex calidis potatur aquis: & pota medetur.
Nec non iungenda est utero noua uirga miricæ
Illesâ hæc ferro, terrâq; intacta geratur:
Aut medio uentris prodest aspergere terram:
Quam signauerunt uestigia pressa rotarum.
Proderit & puluis facili sub ærdine raptus.
Quin etiam & lymphis coctum potare cuminum
Conueniet, quod iam nobis documenta probarunt.
Menta quoque hoc pacto medicos dabit hausta sapes.
Cœliacos autem recreabis pane salubri,
Quem madido farre efficies, ac mollibus ouis:
Quorum testa fero prius euanesceat aceto.

Q. SERENI

Refert & teretes bulbos mollire terendo:
Cumq; his leni clarum potare fluentum.

Hydropisi depellendæ.

CORRVPTI iecoris uitio, uel splenis acervo
Crescit hydrops: aut cum siccata febre medullæ,
Atq; auidæ fauces gelidum traxere liquorem.
Tum lymphæ intercus uitio gliscente tumescit,
Secernens miseram proprio de uiscere pellem.
Conueniet teneræ radix decocta sabuci
In geminis calidi cyathis potanda lyæi.
Fraxineum semen cum bacchi rore bibendum est.
Aut calido filicis radicem mollit iaccho,
Qui subito raptos uentos, sucosq; renellit.
Nec non appposito curantur dropacæ membra:
Vnguine quo frangit uirus langoris aquosi.
Nec non in tepidis conuolues corpus arenis.
Apposituq; leues Nepetæ, gustiq; innabunt.
Sæpe & scyllino pelluntur noxia baccho.
Helleboro bene purgatur lymphaticus error.
Aut huius uice quod fert semen lenta genista
Miscetur: mulsis coctusq; educitur undis.
Est qui præualidum nitro sale miscet acetum:
Atq; olei succo refriat turgentia membra.

Ventri molliendo.

SAEPE cibi specie, uitio uel corporis ipso
Potibus, aut duris restricta morabitur aluus.
Vincetur talis mora gramine mercuriali,
Cuius aquam cocti minimo cum melle bibemus.
Prunæq; conueniunt quæ mittit clara Damascus.
Multos præterea medici componere sucos
Assuerunt: preciosa tamen cum ueneris emptum
Falleris: frustra q; immensa nomismata fundes.
Quin age, & in tenui certam cognosce salutem.
Aut igitur tectum lana supponis alumen:
Aut edis in patinis teneræ decocta sabuci:
Vel salsum mulsam capræ cum lacte capeffis.
Crede tamen potum meliorem lactis equini:
Dicitur & ualidos asinæ lac uincere sucos.
Syluestris fici lachrymam prodesse loquuntur:
Quodq; satis melius uerbis dicamus Horati.

» Mitulus & uiles pellent obstantia conchæ:
 » Sed choceleas prius urtica, aut fursure pasci
 » Purior hinc gustus noxa sine mouerit alium.
 Sæpe thalassomeli iunctum cumulauius hymbri.
 Hæc purgant parili fuerint si pondere mixta.
 Solutioni uentris, & dysenteriae compescendæ.

T A M uarij casus mortalia sæcla fatigant,
 Ut sint diuersis obnoxia corpora morbis.
 Sæpe etenim nimio cursu fluit impetus alui:
 Frenat commixto cum feruet brassica uino:
 Aut cerasi uictum longo iam tempore ponum.
 Suauis amineæ uitis cum pane medetur:
 Mel bene permixtum calido potatur aceto.
 Vile quidem facili facto, tamen utile opinor,
 Si lentent medici data purgatoria dextra,
 Adiecto piperis medicatur puluere calda.
 Sin autem longo decurrent intima fluxu,
 Atq; immane malum multo iam tempore gliscit,
 Torridus ex uino cortex potabitur oui.
 Ramentum niuei credunt prodesse Elephantii.
 Arbore pyramæa cortex direpta medetur
 Axe sub atrito pix nigro mixta lyæo,
 Immensum poterit potu retinere fluorem:
 Nummis aut iussu cedrum cum mastice mîscet:
 Mollitamq; picem, & rasum de nauibus unguen
 Languida quo fidens medicamine membra fouebis.
 Proderit & pueris quos dentis origo fatigat
 Castaneas coxisse nuces, & sorba uetusta,
 Atq; apium, caulesq; rubus quos fundit acuta:
 Potio quæ fluidam consumpta morabitur aluum.

Lumbricis, & tineis purgandis.

Q U I D non aduersum miseris mortalibus addis
 Natura? interno cum uiscere tinea serpens,
 Et lumbricus edax uiuant inimica creentq;.
 Quod genus assiduo laniat præcordia morsu.
 Sæpe etiam scandens oppletis faucibus hæret:
 Obsessaq; uias uitæ concludit hanelæ.
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus:
 Vel nepetæ tritum ex uino, uel lacte capellæ:
 Necnon & suauis medici potatus aceti.

Q. SERENI

Prodest prætereacum baccho persicat frondis:
Democritus memorat mentæ conducere potum.
Sumitur abrotanum, necnon & uile melanthum:
Allia per sese sanant: aut ius coriandri.
Quin & marrubium decoctum, haustumq; iuuabit,
Puleium ue potens, & agreste iugatur anetum.
Synthesis hæc prodest unda mollita calenti.

Colo sedando.

CVM COLVS inuisum morbi genus intima carpit
Mande galeritam uolucrem, quam nomine dicunt:
Aut pauidi leporis madefacta coagula pota:
Sine apio tritas nepetas cum mastice iunges.
Necnon & species ambas redolentis aneti,
Quarum decoctos patiens haurito liquores.

Vesicæ, & calculo purgando: & urinae prouocandæ.

SI CUI uesicæ tardus cunctabitur humor
Hæc mora rumpetur uino peruncta uetusto.
Prodest & paruos acidos potare sabuci.
Aut hederæ suauis: aut lachrymosi trita synapi.
Necnon resinas ex oricia terebintho
In speciem eruiiæ paruos glomerabis in orbes:
Quos ternos tepida mixtos hausisse medella est.
Quondam etiam nimio præceps urina fluento
Irrigat exuias, obscenoq; inficit hymbri.
Ergo cinis nepetæ suauis uel proderit haustus:
Et uino tritus datur, aut cum lacte capellæ
Tum leporis cerebrum ex uino potare decebit.
Si dolor internam uesicæ concoquit aluum
Subueniet radix & frons epota cypressi:
Puleium ue potens domitum feruentibus undis.
Si uero in lapides densus conuertitur humor
Qui retinet cursus, gemitumq; dolore frequentat,
Saxifragam, seu sarxeiphagon: suaurere credunt.
Præterea semen myrti syluestris iaccho,
Atq; oleo mixtum bibitur: nec desit acetum:
Vinaq; sumantur fricto condita cumino.
Sine palumborum capitur fimus aëriorum
Dulcicidis sparsus suauis, trituq; solutus.
Necnon obscænis capræ potabitur humor:
Obruit hic morbum, labefactus saxa remittit.

De conceptione,

De conceptione, & partu.

IRRITA coniugij sterilis si munera languent,
Nec sobolis spes, multos iam uana per annos
Fœmineo fiat uitio res: nec ne filebo.

Hoc poterit magni quartus monstrare Lucreti.
Sed natura tamen medicamine uicta potenti
Sæpe dedit foetus studio curante paratos.
Antigatur leporis consumit fœmina uuluum:
Aut ouis in stabulis fractas cum ruminat herbas
Pendentem spumam molli deducit ab ore,
Atq; illam meminit iuxto potare falerno:
Mercurialis item capitur communiter herba:
Sic cubitum noctu coniunx festinat uterq;
Ast ubi iam certum spondet prægnatio foetum,
Ut facili uigeat seruata puerpera partu,
Dictamnium bibit: & cochleæ manduntur edules.
At si per menses minus octo moratus in aluo
Irrumpit thalamos: & nexus soluit inertes,
Pulei bene purgati tunc conuenit humber,
Cuius opem ueram casus mihi sæpe probarunt.
Quin etiam stercus supponunt uulturis atri:
Sentiat ut minime partus qui proximus urget.
Oua etiam rutæ, & fragili miscentur anetho:
Quæ diluta simul uino, atq; exhausta medentur.

Profluuio cuiusq; sanguinis, & matrici.

SI modicus pleno manat de corpore sanguis
Subuenit: at nimius cum uita funditur ipsa.
Quapropter multo naris completa cruore
Cum fluit, attritus cimex conducit odore:
Lana oleo madefit, sed nondum lota rosato:
Hæc datur in naves, uel claudit densius aures.
Contritis prodest cochleis obducere frontem:
Aut galli cerebro, uel sanguine mitte columbæ.
Quod nisi supprimitur, sanguis potandus & ipse est.
Præterea pharys caput emetire papyris:
Detrahe quod superest, aliò genitalia necte.
Fœmineas prodest illinc uincire mamillas.
Menstruus immenso si profluit impete sanguis,
Succida lana malos remoratur subdita cursus.
Mortua quin etiam producit corpora partu.

Q. Serenus.

x

Q. SERENI

Sed quæcunq; fluit uis immoderata cruoris,
 Subernus cortex calidis potatur in undis,
 Ante minutatim studio uincente terendus.
 Sed si forte cruor clausa cunctabitur aluo,
 Puleij calido purgatur foemina potu.
 Aut molles nepetæ, aut rutæ quæcunq; bibentur.
 At si puniceos fundit uesica liquores,
 Marrubium ex passo tritum perfunditur undis:
 Hi poterunt haustus rutilum purgare liquorem.
 Reliquias partus dictami detrahit herba.
 Quod si foeminei properabit sanguinis hymber,
 Est qui frustra molæ percussu decutit uno:
 Quorum aliquod lanis tectum ad præcordia neffit
 Hæc simul inætantans sibi debere cruorem,
 Ut lapis ille uicæ solitos iam destitit orbes.

Pilis qbuscunq; internecadis, quæ oculos impediunt.

NOBILIS hirsutas horret lasciuia setas,
 Et gaudet raptò nudari flore pilorum:
 Sed bona nonnunquam uellendi causa uidetur,
 Corpora cum releuat ratio manifesta salutis.
 Nanq; oculos infesta pilorum tela laceffunt:
 Quodq; illis dederat nullum natura tuendis
 Inde inimica seges proprios desecuit in orbes.
 Ergo locum crinis uulsi continge cruore,
 Quem dat auis tremulis simulat quæ pellibus alas:
 Sanguine uel Ricini, quem nigro de cane uelles.
 Præterea quasunq; uoles auertere setas,
 Atq; in perpetuum rediuiua obcludere tela,
 Corporibus uulsi saniem perducito ranæ.
 Sed quæ parua situ est, & rauco garrula questu,
 Necnon quæ stagnis cessantibus hæsit Hirudo
 Sumitur, & uiuens samia torretur in olla:
 Hæc acidis ungit permixta liquoribus artus,
 A uulsaq; uetat rursus percreescere syluam.
 Omnibus obscænis nudendis.

DICENDVM & quæ sit membris medicina pudendis.
 Languidus antiquo purgatur penis iaccho:
 Ac super illinitur fœcundæ felle capellæ:
 Mane nouo myrti frondes commandere prodest.

Qui

Qui dolet, atq; illas in vulnus despuat ipsum.
 Fece etiam vini genitalia lauta leuantur:
 Et tumidos testes nereia lymphæ cohercet.
 Vel bulbi ex mulso, uel cera immista cupresso:
 Aut faba cum tepidis baccho decocta fluentis
 Ramicis immensum fertur cohibere tumorem.
 Far madidum lymphis: medicat cum fronde cupressi:
 Vnde etiam potu frons hæc memoratur amica.
 Sin autem existit durum tibi glandibus inguen,
 Proderit induci coelheas cum melle minutas.
 Obscenos si ponè locos nona vulnèra carpent,
 Horrentum mansa curantur fronde ruborum.
 Aut si iam ueteri succedit fistula morbo,
 Mustellæ anere immisso purgabitur ulcus.
 Sanguine tum riani, quem bos gestauerit ante
 Herba chelidonia fertur cum melle mederi:
 Herbaq; cum seuo folijs de mille uocata.
 Scies, & articulari morbo.

S A E P I V S occultus uicta coxendicæ morbus,
 Perfurit, & gressus diro languore moratur:
 Populus alba dabit medicos de cortice potus;
 Necnon & teneræ gracili de fronde genistæ.
 Arreptos caules, acidoq; liquore madentes
 Sumere conueniet, rubiæ quoq; ducere potum:
 Aut ex irino cochleas haurire lyæo.
 Si uero articulos tabes inimica per omnes
 Hæserit: ex figi betas ac melle ligabis
 Vel pelagralices, simul & baccheia dona
 Sumere curabis: nimio sed parato uino.
 Ennius ipse pater dum pocula siccant iniqua,
 Hoc uitio tales fertur meruisse dolores.
 Furunculo medendo.

C V M sanguis nimius puri commistus atroci
 Aestuat: & papulas alte sustollit acutas,
 Resinam misceas, & saxi ordea fracta
 Conspersa hæc tepidis apponere conuenit undis:
 Vis & hyoscyami cææ, seuoq; iugatum
 Nectere: non minus hæc poterit medicina innare,
 Prætereaq; finum ex gallo, quem legeris albo,
 Imbribus ex acidis fidens appone dolenti.

Q. SERENI

Auribus aut pecudum molles expromito sordes:
Vnguine quo fosis dabitur medicina papillis.

Carboni medendo.

HORRENDVS magis est, perimit qui corpora carbo
Vrit hic inclusus, uitalia rumpit acerbis.

Hunc ueteres quondam uarijs pepulere medelis

Tertia nanq; titi, simul & centesima lini

Charta docet ferro talem candente dolorem.

Exectum: aut potora parum semine pulsam.

Ni fieret dicens uix septem posse diebus

Vitam produci, tanta est uolentia morbi.

Dulcicidum, laticemq; cumini semine iunges:

Atq; finum pariter paphiae compone columbae:

Hinc line duratas partes: & clausa uenena.

Præterea triti referant adoperta lupini.

Nonnullus calcem uiuam dissoluit aceto:

Fumantemq; niuem papulis apponit acerbis.

Est qui gallinae perducit stercore corpus:

Alia uel piperi parce commixta linuntur

Pythagoræ cognata leui condita cumino

Proderit, & madida fermentum polline turgens.

Pani, uomica, & strumæ depellendis.

SVNT alij, quos dura mouet natura tumores

Non minus horrendi, sed non ita perniciosi:

Vomica qualis erit: uel eidem proxima quædam.

Simplice resina miscentur hordea tinsa:

Et mulsos amnes: & purgamenta columbae:

His bene decoctis languentia membra fouentur.

Mollis odorato fæba iungatur coriandro

Proderit appositum: mollitq; aperitq; tumorem.

Aut de phasgano radix decocta palustri:

Quæ salis admixto tondetur condimento.

Proderit & mansum, quod traxeris arbore uiscum.

Gramen Hyoscyami ceræ, seuq; uetusto

Concilia: mixtisq; locos perduce dolentes.

Exercere etiam corpus medicina potens est.

Onum defundis in fictile, deinde putamen

Marrubij suco implebis, post melle liquenti:

Omnia consociata tepenti prospera potu

sumuntur, referantq; malum, purgantq; leuantq;.

Igni

Igni sacro medendo.

EST etiam morbi species, quæ dicitur ignis:
Languida quo multo torrentur membra calore.
Vel tu uicino seuum bouis igne remittis,
Mollitumq; lines: dederis uel fotibus oua:
Sed non cocta dabis: sic torrida membra fouebis.
Lumbricus terræ mixto inducetur aceto:
Aut parili noua Ruta modo: sed iungis oliuum:
Ouaq; cum betis profunt super illita tritis.
Allia dant anerem sociandum oleoq; garoq;
Vnguine quo gliscens deponet flamma furorem.
Sæpe chelidonie pars candida iungitur oui,
Quæ medico potu, sed uili trita capeffes:
Admiscere mumor lymphas, amnemq; falerni.
Podagræ depellendæ.

QUAEDAM sunt rabidæ medicamina summa podagræ
Cui ter tricenæ species epidaurius ipse
Dixit inesse deus: requiem tamen huic dare morbo
Fas erit: Et tristem saltem mulcere dolorem.
Ergo age, Et arreptam salicis frondemq; librumq;
Cum uino tere: sic contractos perline nervos:
At cum prima mali sese ostentabit origo,
Fervida non timidus tolera cauteria plantis:
Seminecis'ue hira reſerato pectore calces
Infere: sic diræ reprimes primordia pestis:
Aut si corruptus perſederit altius humor:
Trita cupressus ibi baccho iungetur acerbo,
Panibus Et teneris cohibebunt addita questus.
Parna sabucus item est hircino collita ſeuo:
Triticæq; acido manantes amne farinæ:
Aut nitidum rana decoctum uiscus oliuo:
Siue chelidonie ſuauis ſale mixtus aceto.
Sunt quibus appoſita ſtatatur hirudine ſanguis:
Non audita mihi ſit ſas, ſed lecta referre.
Hoc quidam rabidus morbo per tempora miſſis
Vicino plantas frumenti preſſit acervo:
Euaſitq; grauem caſu medicante dolorem.

Vulneribus ferro, aut uerberibus factis.

NATURAE uitæ medicas obicimus artes:
Nunc Et fortunæ iaculis obſiſtere par eſt.

Q. Serenus.

x in

Q. SERENI

Si cui forte lapis teneros uolauerit artus,
Necte adipēs uituli, simul & tritam chamaecisson.
Nec pudeat luteae steracis producere porce.
Sim autem seuo est laceratum uerbere corpus,
Tum lexura cinis ceras dissoluit, & oua:
Admixtoq; oleo uibices comprimit atras.
Si uero infrenus manat de uulnere sanguis,
Purpura torretur conchili perlita succo:
Huius & atra cinis currentem detinet undam
Verrucae quoq; defectae frenare cruorem
Dicitur ambustus tyrio de uellere puluis.
Præterea nimios referati uulneris amnes
Feniculi cinis astringit, uel fimbria porri:
Sine finus manni cum testis uritur oni,
Et reprimit fluidos miro medicamine cursus.
Vulneribus quibuscunq; casibus actis.

CVM magna humanae sint pondera conditionis:
Tam multae innumeri species mihi uulneris adsunt.
Vt nequeam proprijs cunctis adscribere curas.
Iisdem igitur monitis casus sanabimus omnes
Sic tamen, ut nullus medicinam eluserit error.
Ergo modus quicunq; obtingit uulneris atri,
Contritus cum melle dabit medicamina bulbus:
Herbaq; quae folijs nomen de mille recepit.
Apposita prodest adipi permixta uetusto
Succida cum tepido nectetur lana lyæo:
Ambustus uel cinis complebit uulneris ora.
Concludit uero, uel frons, uel ramus ab ulmo.
Vt succis hederæ pulchrescit foeda cicatrix.

Ab homine, uel simia morsis.

SIVE homo, seu similis turpissima bestia nobis
Vulnera dente dedit: uirus simul intulit atrum
Betonicam ex puro prodest assumere baccho.
Necnon & raphani cortex decocta medetur:
Si trita admorsis fuerit circumlita membris.

Serpentū morsibus, & uenenis pellendis.

CVSPIDE non quisquā, longe neq; cæde larissæ
Fulmine non gladij, uolucris nec felle sagittæ,
Quam cita uipereo potis est affligere ictu.
Quare aptam dicamus opem, succosq; medentes.

Cui

Cui nocuit serpens, fertur caput illius apte
 Vulneribus iungi: sanat quæ sauciat ipsa
 Vt lavisæa curatus Telephus hasta.
 Proderit et caulem cum uino haurire sabuci:
 Aut coctum raphani librum, tritumq; ligare:
 Sive etiam excelsa folium de mole cupressi
 Mandabit lactens caprifici suavis opellam:
 Aut tithymalus atrox vulnus contrita perungit.
 Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,
 Ex illo radix tepido potatur in amni.
 Ceruino ex foetu commixta coagula uino
 Sumuntur: quæ res membris agit atra uenena.
 Aut ferulæ radix potatur in hymbre lyæi
 Betonicæ uel leues, gallinæ aut iura uetustæ.
 Si uero horrendum vulnus fera iecerit aspis,
 Vrinam credunt propriam conducere potu.
 Varronis fuit ista senis sententia: necnon
 (Plinius ut memorat) sumpti iuuat humber aceti.
 Dicendum et quæ sit præcorx medicina timenti:
 Cautio namq; potest diros peruertere morsus.
 Si iecur exectum tardo de uulture portes
 Erucis, uel si totos perduxeris artus,
 Quas prius attritas uehementi spargis aceto:
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis:
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.
 Toxica præterea qua sint pellenda medela
 Expediam: sanguis poterit prodesse caninus:
 Qui facili potu antidotos imitatur honestos.
 Vis et mirificos cautus prædiscere odores:
 Aænsis quibus arcetur teterrima serpens,
 Aut styracem torres: aut duri uulturis alam:
 Vel nepetam: aut frondem rigidæ, stirpemq; miricæ.

Ichibus Scorpj, et morsibus Muris cecj, uel Aranei:

SVNT minimæ species: sed diræ uulnere pestes:
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallant:
 Scorpj ut grauis est, et araneus hæc mala semper
 Captant securos multa iam nocte sopores,
 Et documenta dedit nobis prostratus orion,
 Magna quod exiguis perimantur membra uenenis.

x iiij

Q. SERENI

At qui vulnus atrox incussit scorpius ardens
 Continuo capitur: tunc digna cæde retusus,
 Vulneribusq; actus fertur reuocare uenenum:
 Aut calidis pelagi lymphis loca læsa fouentur:
 Sine meri potu dissoluitur improba pestis.
 Ad cunctos autem morsus, ictusq; minorum:
 Caseus aptus erit pauidæ de lacte capellæ:
 Cunq; hoc assumi debet origanus herba:
 Hæc duo mirificas curabunt icta medelis.
 Necnon feniculo calidum annectatur anethum
 Aut uinum sulphur siata cum fecæ lyæi:
 Exiguo piperis cerebrum conspergito galli:
 Quo lita sanescunt depulso membra dolore.
 Sin autem muris nocuit uolentia cæci,
 Quæ sola signauit uoluentis orbita plastris,
 Illine: mira datur uili de puluere cura.

subitaneo dolori, febri, atq; ostocopo.

NON nunq̃ existit subiti noua causa doloris:
 Cuius origo latet, ueris reprimenda medellis.
 Nanq; chelidonium mixto sale nectere prodest:
 Velleræq; infuso recalentia sulphure sanant.
 Ostocopon lento conducit melle perungi.
 Sin autem calidæ depascent corpora febres,
 Tunc apij suauis leni sociatur oliuo:
 Membra lines: fortisq; ferus mulcabitur ignis.
 Nec spernendus adeps, dederit quem bestia Melus.
 Semineis cerui lachrymam miscere liquori
 Conuenit: atq; artus illinc mulcere calentes:
 Febribus at longis galli des iura uetusti.

Ad Typum quartanæ.

NEC tu crede leuem dilato tempore febrem:
 Quæ spacium sibi dat magis, ut cessando calescat
 Lentato quæ crassatur quartana calore:
 Ni medietas adhibere manus discamus et herbas,
 Allia non pudeat terno cum amice trita,
 Et diluta mero medijs haurire diebus.
 Aut facilem icoris murini ducere fibram.
 Quatuor et duri iungantur scrupula bacchi:
 Mira est absinthii cum simplice potio lymphe.
 Summa tribus digitis apprehensum semen anethi,

Tantundem

Tantumdem marathri, mulsu nec desit aceto,
In cuius cyatho prædicta salubriter hauris.
Iliæ quinetiam spartum suppone tumentis.
Aut leporis trepidi diluta coagula trade.
Prodest & potus sed mulsus doridis humor.
Quidam etiam miranda ferunt ueniente calore
Iurantes ludum ueneris, munusq; petendum.
Sed prius est oleo partus feruescere ranæ
In triuijs, illoq; artus perducere suco.

Ad Typum tertianæ.

EST etiam alternis febris rediuiua diebus:
Tempora discernens quasi iustæ pondera libræ:
Ut possis igitur talem prohibere furorem,
Tu uolues cera sine caudis grana cumini,
Puniceaq; indes pelli, colloq; ligabis.
Pulei ramus lanæ uelatus amictu
Tempore suspecto medicos præbebit odores.
Præterea amex potatur tritus in ouo,
Horridus attractu, sed gustu commodus apte.

Ad Typum quotidianæ.

AT qui continuis non cessat adire diebus,
Sed tantum certas morbus discriminat horas,
Tritæum metuit granum (si credere dignum est)
Quod latitans fracto fuerit sub pane repertum.
Nec non ossa inuane septis inuenta domorum:
Conuenit hæc tereti pendentia subdere collo.
Multaq; præterea uerborum monstra silebo:
Nam febrem uario de pelli atrimine posse
Vana superstitio credit, tremulæq; parentes.

Hemitritæo depellendo.

MORTI ferum magis est, qd̄ græcis hemitritæum
Vulgatur uerbis: hoc nostra dicere lingua
Non potuere ulli: puto nec uoluere parentes.
Inscribis chartæ quod dicitur abra ca bra
Sæpius, & subter repetis, sed detrahe sumam:
Et magis atq; magis desint elementa figuris:
Singula quæ semper rapies, & cætera figes,
Donec in angustum redigatur littera conum.
His lino nexis collum redimire memento.
Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.

Corallum uero, si collonectere uelles:
 Ne dubites illo ueros miscere smaragdos.
 Talia languentis conducent uincula collo:
 Letalesq; abiget miranda potentia morbos.
 Fracturis, et luxis sanandis.

INFANDVM dictu cunctis procul absit amicus:
 Sed fortuna potens omen conuertat in hostes.
 Vis indigna nouo si sparserit ossa fragore,
 Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis:
 Linthea deinde, superq; inductasnectere lanas:
 Sæpius et suatos conspargere pinguis oliui:
 Bis septem credunt coalescere cuncta diebus:
 Aut ueteri baccho capræ finis inde petulcæ:
 Hoc aperit clausum, trahit hærens, sanat apertum.
 Sin uero caput infestus colli serit ictus,
 Ex oleo necti uestis debet arachnes:
 Nesciet hæc illinc, nisi cum sanarit, abire.
 Quod si luxa suo decedent membra tenore,
 Vrere foemineos crines, ac iungere serum
 Congruet, ac tali medicamine mota ligare.
 Aut maluam ex pingui tritam apposuisse innabit:
 Aut si conclusum serauit tibia uulnus:
 Stercus ouis placida iunges, adipisq; uetustos:
 Pandere quæ poterunt uulcus, patuloq; mederi.

Neruis incisis, et dolentibus, atq; contractis.

HAVD quisquam credet dissectos uulnere nervos
 Ad solitum rursus reuocari posse uigorem:
 Sed prodest tetræ lumbricos indere tritos:
 Quis uetus, et rancens sociari axungia debet.
 Si uero oculus nervos dolor urit inertes,
 Vulturis excisos adipem, rntamq; remitte:
 Aut ceram, et tali recreabis languida fotu.
 Conuenit et pelagi calidis persudier undis.
 Carica cum betis lento uel melle iugatur:
 Aut baccho madescenta ceres cum fronde cupressi:
 Quo poteris potu recreare rigentia membra.
 Sin autem subito replicantur corpora morbo,
 Contractos reuocat nervos atro sumpta columbæ.

Aegris somno asciscendo.

NON solum miseros teterrima febris adurit:

Sed super optato pergit uiduare sopore:
 Ne prosit placidi coelestia munera somni.
 Charta igitur, varijs quam pinxit littera uerbis
 Vritur, inde cinis calido potatur in amni.
 Prodest puleium capiti substernere saepe.
 Proderit & mixtam lymphis potare capressum
 Palladijs itidem succis, quos flore rosarum
 Iungis, & immisces madidum, tritumq; papauer:
 Quo lita frons facilem præbebit nocte quietem.
 Necnon mandragoræ gustu sopor additur altus.
 Dilue prætere a glomeratam quam gerit intus
 Lanam aries inter geminae coxendicis umbras:
 Inde soporati ducentur gutture potus.

Lethargæ expellendæ.

DIXI mus hanc sortem miseris mortalibus esse,
 Vt sint saepe mala inter se contraria morbi,
 Deniq; nonnunq; somno sic membra grauantur,
 Vt coniungantur letho sopor altus acerbo.
 Ergo leui flamma torrentur cornua capræ:
 Quo nidore grauem depellent lumina somnum.
 Aut ueneris labrum, quæ dicitur herba bibetur:
 Quæ teritur prius: & uino confusa liquefit.
 Conueniunt acidis euphorbia mixta fluentis:
 Gramina uel rutæ, gemina si nare trahuntur.
 Quidam dira inbent septeno amice trito
 Vt uitentur aquæ, cyathusq; bibatur earum:
 Hæc potiora putant, quam dulci morte perire.

Comitiali morbo medendo.

EST subiti species morbi, cui nomen ab illo est,
 Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.
 Sæpe etenim membris atro languore caducis:
 Consilium populi labes horrenda diremit.
 Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ
 Conceptum, talis quem sæpe ruina profundit.
 Prodest cum ueteri baccho fel uulturis attri,
 Sed cochlear plenum gustu tibi sufficiat uno:
 Aut cruor ex prognæ mixtus cum polline thuris:
 Aut apium elixum: aut conditum melle fel agni:
 Marrubium uel pari confusum pondere mellis:

Q. SERENI

Cui tu terna dabis gustu cochlearia in uno.
 Aptus mustelæ cinis est, & hirundinis una.
 Præterea pluvias hominis quas calva supina
 Excepit proiecta sinu, consumere prodest:
 Aut lapis ex nido uagi quem congescit hirundo
 Vellitur: ex nexu fonet, attollitq; iacentem.
 Pellitur (ut fama est) gustu quoq; langor anethi.

Regio morbo pellendo.

REGIVS est uero signatus nomine morbus:
 Molliter hic quoniam celsa curatur in aula:
 Huic rubia ex mulsâ fertur conducere lymphâ.
 Allia trita dabis uino madefacta calenti.
 Vellera cum uino suffiri sulphure prodest.

Detibus, uel strigis inquietatis infantibus.

NVDVM hoïem primû mundi natura profudit:
 Insuper excruciat, niueis cum dentibus armat.
 Collo igitur molli dentes neſtentur equini,
 Qui primi fuerint pullo crescente aduati.
 Aut teneris cerebrum ginguis illine porci:
 Aut leporis niueo bibitur cum lacte caprino.
 Præterea si forte premit stryx atra puellor,
 Viroſa immulgens exertis ubera labris,
 Allia præcepit Titini ſententia neſti:
 Qui ueteri claras expreſſit more togatas.
 Combusturis igne, uel frigore factis.

SVNT diuerſa quidem mala frigoris, atq; caloris:
 Sed tamen amborum ſimili nocet ulcere uirus.
 Illa quoq; uſta putas, quæ ſunt niue laſa rigente.
 Conuerſa in cinerem platani pila curat uirumq;
 At uero ambuſtum flammis qui candidus oui
 ſuavis ineſt: penna inductus ſanare ualebit.
 Aut tu ſuacoſæ cinerem perducto lanæ:
 Aut uinam ex oleo ueteri composito calam:
 Ordea uel franges, atq; cui candida iunges:
 Adſit adeps porcæ: mira eſt hæc forma medelæ.
 Iunge chelidonijs, ac ſic line uulnera ſuavis:
 Quodq; recens uſſit glacies, axungia ſimplex
 Mulat: & ex ſacili grata eſt medicamine cura.

Venenis prohibendis.

VT tutus ſias inſiſtæ fraude noueræ,

Vel quicumq; tuo arpetur linidus auctu,
 Non expectatis eat obuia cura uenenis.
 Ante cibos igitur inglandis foetus edatur.
 Profunt electri uariantia pocula uirus.
 Prætereæ coctæ querno cum cortice lymphæ
 Conueniunt potu: demersa'ne ficus oliuo
 Sæpe etiam raphanum prædixit numen edendum.
 Antidotus uero multis mithridatia fertur
 Consociata modis: sed Magnus scrinia regis
 Cum raperet uictor, uilem deprehendit in illis
 Synthesin, & uulgata satis medicamina risit.
 Bis denu rutæ folium, salis & breue granum,
 Inglandesq; duas, terno cum corpore ficus
 Hæc oriente die parco conspersa lyæo
 Sumebat, metuens, dederat quod pocula matri.
 Venenis datis.

SI nequit infandum præuerrere cautio uirus,
 Proximus ille gradus data pocula pellere cura.
 Lac asinæ, placidæq; bouis prodesse loquuntur.
 Betoniam ex paruo sumunt pleriq; lyæo
 Quod si hederae succos, quæ truncos implicat altos
 In stilles paruus, poterunt haud ulla nocere
 Pocula, quæ quisquam seuis uitiauerit herbis.
 Si quis Hyoscyamum gustarit lacte capellæ
 Exhausto rabidos poterit mulcere furores.
 Vulneribus, & rei dubiæ curandis.

VVLNERA tabescunt spacio uitata dierum:
 Curaq; nil prodest, nec ducitur ulla cicatrix:
 Sed tamen herbarum tam mira potentia pollet,
 Vlceris annosi sinus ut coalescere possit:
 Marrubium si tu recoquas, illoq; liquore
 Vultus atrox foueas, cineres uel hirundinis alte
 Inducas: leporis'ue aspersa coagula uino:
 Aut hederam baccho decoctam, & semen anethi:
 Aut cineres alni tardo cum melle ligentur.
 Lumbrici terræ poterunt conducere uultus:
 Aut facilis lapathi coma latior ulcera purgat:
 Et comixtus adeps, sed nonnullo sale tactus.
 Pineæ prætereæ uino cum sulphure cortex:
 Et pice cum spissa iam perdita membra reponit.

Q. SERENI

Et pice cum spissa iam perdita membra reponit.
Verrucis tollendis.

INTERDUM existit turpi verruca papilla
Hinc quondam fabio uerum cognomen adhæsit:
Qui solus patre cunctando restituit rem.
Id poterit nitium sanguis curare lacertæ:
Aut urina canis cum terra inducta madenti:
Aut herbe succus, quæ fertur nomine lichen.
Est tithymalus item tali satis apta medella,
Si rupta immensos fundit verruca cruores,
Purpureo triti cinere de uellere profunt,
Quod fuerit uero conchyli sanguine tinctum.

Hæmorrhoidis medendis.

EXCRVCIANT turpes anum si forte papillæ,
Agrestis prodest radix super addita porri:
Ne uiolet, sana, in iuglandis fragmine clausum.
Sal niueum sumes, bethicum quem nomine dicunt,
Dulcia cumq; nigra iunges fuligine mella,
Apponesq; super: pellit medicina dolorem.

Sequuntur. XXVI. uersus, qui in alijs impressis
codicibus desiderantur.

Paralysi depellendæ. primo die ita agendum.

HVNC quicumq; cupis citius depellere murbum,
Protinus antidotum studio tu perface mirum:
Salicet ut ualeas languenti ferre medelam.
Castoreas siliquas bis sex perquirere cura:
Tristis item digitis lympham metire duobus.
Deniq; tunc capies phyalam, quæ iustior extat:
Aut equidem flammæ. sed prunas subijce sollers.
Proderit interea tepidum potantibus illud:
Ieiunis sed enim potius præbere memento.

Secunda ita medendum est.

CVNQVE secunda dies orbi perucnerit omni
Haud alijs rebus prudens adiungere cures.
Castoris, atq; nouem siliquas appendito statim:
Atq; duos semis digitos metire memento.
In calicæ atq; probo lympham miscere duobus
Qui patitur tepidum languens hinc sorbeat ipse.

Tertia die ita curandum est.

GRATIOR atq; dies ternus cum uenerit imo,
Rursus in egroto constanter fer medicamen,
Castoreas siliquas iterum quæ pondere sint sex:
Hinc etenim binos digitos metire memento
De lymphâ liquida sed enim subiungere cura
Et simili debes tepidum præbere modo tunc.

Ita peragendum est à quarta die usq; ad sextam,
Et à septima usq; ad nonam, à decima usq; ad
duodecimam, Et mirifice prodest.

Quid quarta die, Et reliquis peragendum sit.

QUARTVS Et ille dies consentit. nec ne priori
Quintus Et est similis percellens namq; secundo.
Sextus itemq; simul concordat deniq; tercio:
Septimus usq; nonum percurritur ordine primo:
Sic decimas currens consenditur ad duodenum.


* a b c d e f g h i k l m n o
p q r s t u x.


Omnes sunt quaterniones, præter t. duernionem:

VENETIIS IN AEDIBVS ALDI, ET AN-
DREAE ASVLANI SOCERI MENSE
MARTIO. M. D. XXVIII.

5818148







20th Aug